分 佈：四川。

Lobrathium hongkongense (Berhhauer) 香港隻線隱翅蟲 (Zheng, 1988:186)
捕 食 性。
分 佈：香港。

Lobrathium rotundiceps (Koch) 圓隻線隱翅蟲 (Zheng, 1988:186)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Lobrathium sibynium Zheng 矛雙線隱翅蟲 (Zheng, 1988:186)
Lobrathium sibynium Zheng, 1988:186.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Lobrathium tortile Zheng 扭隻線隱翅蟲 (Zheng, 1988:187)
Lobrathium tortile Zheng, 1988:187.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Neobisnius chengkouensis Zheng 城口棋線隱翅蟲 (Zheng, 1994:213)
Neobisnius chengkouensis Zheng, 1994:213.
捕 食 性。
分 佈：四川(城口)。

Neobisnius formosae Cameron 臺灣橫線隱翅蟲 (Zheng, 1994:213)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川。

Neobisnius nigripes Bernhauer 黑足橫線隱翅蟲 (Zheng, 1994:213)
捕 食 性。
分 佈：福建、四川。

Neobisnius praelongus (Gemminger et Harold) 長窄橫線隱翅蟲 (Zheng, 1994:213)
捕 食 性。
分 佈：四川；菲律賓、馬來半島、新加坡、印度、印尼。

Neobisnius pumilus (Sharp) 黃足棋線隱翅蟲 (Zheng, 1994:213)
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本。

Nudobius formosanus Shibata 臺灣并線隱翅蟲 (Zheng, 1994:472)
Nudobius formosanus Shibata

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Nudobius lentus (Grevenhorst) 紅鞘并線隱翅蟲 (Zheng, 1994:472)
Nudobius lentus (Grevenhorst)
捕 食：樹皮下小蠹坑道內。
分 佈：黑龍江(漠河、中興安嶺)。

Nudobius nigriventris Zheng 黑腹并線隱翅蟲 (Zheng, 1994:471)
Nudobius nigriventris Zheng, 1994:471-472.
捕 食 性。
分 佈：四川(大巴山)。

Oligota oviformis (Casey) 小黑隱翅蟲 (Chiu et Lo, 1985:5; Lo, 1986:31-39; Lo et Chao, 1973:177; Lo et Ho, 1970:193; Lo et Wu, 1989:182; Lo et al., 1984:342; Lo et al., 1990:166-178; Wen et Lee, 1981:134; Wen et al., 1993:303)
捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donn. 擬紅蟎
Panonychus citri (McGreger) 橘全爪蟎(柑橘)
Tetranychus cinnabarinus Boisduval 朱砂葉蟎
Tetranychus cordylinicolus Lo 葉蟎
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj. 瓜葉蟎
Tetranychus hydrangeae Prit. et Bak. 綉球葉蟎
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎(草莓)
Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉蟎
Tetranychsu trancatus Etr. 截形葉蟎
Tetranhchus urticae (Koch) 二點葉蟎(草莓)。
分 佈：臺灣。

Oligota sp. 食蟎隱翅蟲 (Huang et Gao, 1996:142; Lin et al., 1991:90)
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎。
分 佈：福建。

Oxyporus (Pseudoxyporus) angusticeps Bernhauer 肩斑僞巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **formosanus** Adachi 阿里山巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Oxyporus (s. str.) **fungalis** Zheng 蕈巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:328)
Oxyporus (s. str.) *fungalis* Zheng, 1992:328.
捕 食 性。

分 佈：四川。

Oxyporus (s. str.) **germanus** Sharp 仙台巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **itoi** Hayahsi 伊藤巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **loloshanus** Hayashi 洛洛山巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (Pseudoxyporus) longipes Sharp 長足偽巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **maculiventris** Sharp 腹斑巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **nigerrimus** Hayashi 黑巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **nigricollis** Zheng 黑胸巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:327)
Oxyporus (s. str.) *nigricollis* Zheng, 1992:327.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Oxyporus (s. str.) **shibatai** Hayashi 柴田巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **taiwanus** Hayashi 臺灣巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Oxyporus (s. str.) **trisulcatus** Bernhauer 三溝巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:326)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oxyporus (s. str.) **wanglangus** Zheng 王朗巨須隱翅蟲 (Zheng, 1992:328)

Oxyporus (s. str.) *wanglangus* Zheng, 1992:328.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Oxytelus piceus (Li, 1991:73)

捕 食 性。

分 佈：遼寧。

Paederus fuscipes Curtis 青翅蟻形隱翅蟲 (Gao, 1996, 12(3):139; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; Gu, 1988:174; Gu et al., 1989:13-15; He et al., 1991:104; Li et Wang, 1984:230; Li et al., 1990:62; Lin et Gu, 1987:63-69; 1988:6-8; 15-21; Lu et Zhu, 1984:21; Luo et Zhuo, 1986:75; Luo et al., 1989:12-19; 1993:39-44; Shen et Pang, 1989:156-163; Song, 1984:83; Sun et al., 1980(4):24; Sun et al., 1982:39; Tao, 1993, 15(1):40; Tao et al., 1993, 15(4):167; Wang et al., 1989:85; Xie et al., 1999, 21(2):84; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1987[ed.] 2:10; Zhang, 1989, 8(1):24-28; Zhang et al., 1997, 13(2):65-68; Zhao et Jiang, 1992:34-39; Zhong, 1983:158; Zhou, 1986:155; Zhou, 1989, 16(1):7-11; Zhou, 1997:656; Zhu, 1984:106-109; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:118)

Paederus fuscipes Curtis, 1823-1840:

別 名：*毒隱翅蟲*。

捕 食：稻薊馬

Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(成蟲、若蟲)

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨(成蟲、若蟲)

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(成蟲、若蟲)

蚜蟲

Ephestia elutella (Hübner) 煙粉斑螟

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(幼蟲)

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(幼蟲)

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲)

Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(幼蟲)

Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲)

Oulema oryzae (Kuwayama) 稻負泥蟲(幼蟲)

Podontia tutea Olivier 漆跳甲

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅，廣布于古北及東洋兩大區。

Paederus idae Lewis 黃足蟻形隱翅蟲 (He et al., 1991:104; Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(卵、幼蟲)。

分 佈：臺灣、江西、廣東。

Paederus nigricornis Bernhauer 黑角毒隱翅蟲 (Zhou, 1997:655)

Paederus nigricornis Bernhauer, 1911:

捕 食 性。
分 佈：湖北；印度、尼泊爾。

Paederus parllebus Weise 青光褐胸蟻形隱翅蟲 (He et al., 1991:104)
捕 食：小型昆蟲。
分 佈：安徽。

Paederus temulus Erichson 黑足蟻型隱翅蟲 (He et al., 1991:104; Li et al.,1990:63; Lu et Zhu, 1984:22; Sun et al., 1980(4):23; Ye et Wang, 1987:11; Zhang, 1987[ed.] 2:10; Zong et al., 1984:249)
捕 食：稻薊馬
稻葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨 (成蟲、若蟲)
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨(成蟲、若蟲)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(成蟲、若蟲)
蚜蟲
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(卵、幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(卵、幼蟲)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(卵、幼蟲)
小鱗翅目(幼蟲)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、北京。

Paederus tibetnus Cameron 西藏毒隱翅蟲 (Zhou, 1997:655)
Paederus tibetnus Cameron, 1928:
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Paederus sp. 褐翅蟻形隱翅蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Philonthus aeneipenris (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Philonthus aeneus Rossi 銅色隱翅蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Philonthus dohertyi Cam. 五點亮黑;隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：蚜蟲
稻飛蝨

部分地下害蟲卵。
分 佈：江蘇。

Philonthus kueuensis Schub 五點短胸隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：稻葉蟬
蚜蟲。
分 佈：江蘇。

Philonthus longicornis Stephens 五點黑角隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：蚜蟲
稻葉蟬、稻飛蝨。
分 佈：江蘇。

Philonthus macies Sharp 四點小頭隱翅蟲 (He et al., 1991:104; Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：蚜蟲
稻飛蝨。
分 佈：湖南、江蘇。

Philonthus minutus Boheman 五點黃足隱翅蟲 (He et al., 1991:104; Lu et Zhu, 1984:23; Lu et al., 1986:63)
別 名：*黃足小頭隱翅蟲*。
捕 食：葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Bravicoryne brassicae (Linnaeus) 菜蚜(甘藍蚜)
Lipophis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae 桃蚜
地下害蟲卵。
分 佈：湖南、江蘇、北京。

Philonthus rectangulus Sharp 五點方首隱翅蟲 (Li, 1991:73; Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：蚜蟲
稻葉蟬、稻飛蝨。
分 佈：江蘇、遼寧。

Philonthus rubricollis Motschuskly 六點褐胸隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：蚜蟲
稻葉蟬、稻飛蝨。
分 佈：江蘇。

Philonthus sordidus Gravenhorst 污隱翅蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Philonthus spinipes Sharp 大赤翅隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：幼齡蠐螬等地下害蟲。
分 佈：江蘇。

Philonthus varius Cyllenhal 小黑隱翅蟲 (He et al., 1991:104; Zhang, 1987[ed.] 2:10)
別 名：*小黑小頭隱翅蟲*。
捕 食：稻葉蟬(若蟲)。
分 佈：江西。

Pinophilus variipes Fauv. 角細黃足隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:23)
捕 食：蚜蟲
薊馬。
分 佈：江蘇。

Platyprosopus bilineatus Faiv. 寬頸赤翅隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:24)
捕 食：蚜蟲等小型昆蟲。
分 佈：江蘇。

Platystethus operosus (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Rugileus rufescens Sharp 細頸隱翅蟲 (Lu et Zhu, 1984:23)
捕 食：蚜蟲等小型昆蟲。
分 佈：江蘇。

Scopaeus currax (Li, 1991:73)
捕 食 性。
分 佈：遼寧。

Scopaeus laevigatus Fauvel 光滑隱翅蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Staphylinus parvulus Sharp 青色黃紋隱翅蟲 (He et al., 1991:104)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：上海。

Stenus alienus Sharp 二星突眼隱翅蟲 (He et al., 1991:104; Li, 1991:73)
捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨。
分 佈：湖南、遼寧。

Stenus cicindela Sharp 斑足突眼隱蟲 (He et al., 1991:105; Lu et Xiong, 1983:224-227; Lu et Zhu, 1984:21; Lu et al., 1986:63; Shen, 1986:80)

捕 食：稻薊馬
稻蚜
稻葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(成蟲、若蟲)
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨(成蟲、若蟲)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(成蟲、若蟲)
長綠飛蝨
Bracivoryne brassicae (Linnaeus) 菜蚜(甘藍蚜)
Lipophis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae 桃蚜
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(幼蟲)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲)。

分 佈：福建、湖南、雲南、江蘇、河南、北京。

Stenus cicindelloides 類虎甲突眼隱翅蟲 (He et al., 1991:105; Lei, 1992:294-296)

別 名：*黑膝瘛片隱翅蟲*。

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 蘿蔔蚜。

分 佈：臺灣、湖北。

Stenus dissimilis Sharp 異突目隱翅蟲 (He et al., 1991:105; Lu et Zhu, 1984:21; Zhang, 1987[ed.] 2:10)

別 名：*黃足突眼隱翅蟲*。

捕 食：稻葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨(若蟲)
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨(若蟲)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(若蟲)
蚜蟲
Oulema oryzae (Kuwayama) 稻負泥蟲(幼蟲)
其他小型昆蟲。

分 佈：福建、江西、江蘇。

Stenus eumenus Kies 突目隱翅蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Stenus rogeri Kraatz 小黑突目隱翅蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Stenus im. verecaudus (Li, 1991:73)

捕 食 性。

分 佈：遼寧。

Stenus macies Sharp 黑脛突眼隱翅蟲 (He et al., 1991:105; Lu et Zhu, 1984:21)

捕 食：稻薊馬

稻葉蟬(若蟲)、稻稻蝨(若蟲)

稻蚜

Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(卵)

Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(卵)

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(卵)

分 佈：福建、湖南、雲南、江蘇。

Stenus tenuipes Sharp 二點突眼隱翅蟲 (He et al., 1991:105; Lu et Zhu, 1984:21)

捕 食：稻葉蟬、稻飛蝨

蚜蟲。

分 佈：湖南、江蘇。

Stenus verecundus Sharp 黑足突眼隱翅蟲 (He et al., 1991:105; Lu et Zhu, 1984:21; Shen, 1986:80)

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨(若蟲)

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨(若蟲)

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨(若蟲)

稻葉蟬

蚜蟲

稻薊馬

Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(卵)。

分 佈：福建、江蘇。

Trichophya rudis Cameron 粗點毛角隱翅蟲 (Zheng, 1987:99)

捕 食 性。

分 佈：四川(臥龍、峨嵋山)。

Trichophya tenuis Zheng 細點毛角隱翅蟲 (Zheng, 1987:97)

Trichophya tenuis Zheng, 1987:97.

捕 食 性。

分 佈：四川(臥龍、峨嵋山)。

Velleius setosus Sharp 梳角隱翅蟲 (Zhou, 1997:656)

Velleius setosus Sharp, 1889:

捕 食 性。

分 佈：湖北；日本。

Histeridae 閻甲科

Carcinops quattuordecimstratus Stephens 黑矮閻蟲 (Gu, 1988:174; Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食：寄居于昆布，捕食倉庫害蟲(幼蟲、蛹)、蟎類。

分 佈：江西、廣東。

Dendrophillus xavieri Mars. 沙氏閻甲 (ASZI, 1986, 1:434; Hun., 1992:366; Zhang, 1987[ed.] 2:10)

別 名：*寬卵閻蟲*。

捕 食：倉庫害蟲(幼蟲、蛹)、蟎類與小型昆蟲，喜潮濕場所，在樹下、黑蟻巢與糧倉等處。

分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、浙江、河北、西北、東北；日本、英國、美國

Hister japonicus Marseul 日本閻甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Hister jekeli Marseul 三溝閻甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Hister niponicus Lewis 黑龜閻甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食：鞘翅目、鱗翅目等幼蟲。

分 佈：江西。

Hister simplicisternus Lewis 閻甲 (Zhang, 1987[ed.] 2:10)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Hololepta sp. 閻魔甲 (Xu, 1985:24)

捕 食：黃斑星天牛(幼蟲)。

分 佈：陝西等地。

Plaesius javanus Erichs 爪哇閻魔甲 (Chen,1957:7; Lo, 1997:58)

捕 食：*Odoiporus longicollis* Olivier 香蕉假莖象甲
Cosmopolites sordidus Germer 香蕉球莖象甲。

分 佈：臺灣；爪哇、斐齊群島。

Saprinus semistriatus (Scribe) 半紋腐閻甲 (Li, 1996:133)

Saprinus semistriatus (Scribe)

寄 主：

分 佈：新疆。

Lycidae 紅螢科

(Ma, 1997:662-664)

Benibotarus sanguinipennis Nakane et Ohbayashi 赤翅棘紅螢 (Jeng et al., 2002:180)

Benibotarus sanguinipennis Nakane et Ohbayashi, 1958:80.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本。

Benibotarus shirozui Nakane 紅絨棘紅螢 (Jeng et al., 2002:180)

Benibotarus shirozui Nakane, 1968:218.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(苗栗)。

Benibotarus spinicoxis (Kiesenwetter) 棘紅螢 (Jeng et al., 2002:180)

Eros spinicoxis Kiesenwetter, 1874:254.

Benibotarus spinicoxis (Kiesenwetter); Kleine, 1942:40.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本。

Bulenides purpureus Pic 猩紅三格紅螢 (Jeng et al., 2002:184)

Bulenides purpureus Pic, 1922:74.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺南)。

Calochromus formosanus Nakane 蓬萊麗紅螢 (Jeng et al., 2002:175)

Calochromus formosanus Nakane, 1969:13.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(松崗)。

Calochromus guerinii MacLeay 黃美紅螢 (Ma, 1997:663)

Calochromus guerinii MacLeay, 1872:

捕 食 性。

分 佈：四川、湖北；英國、澳洲。

Calochromus longipinnis Waterhouse 長美紅螢 (Ma, 1997:662)

Calochromus longipinnis Waterhouse, 1877:

捕 食 性。

分 佈：四川；馬來西亞、印度。

Calochromus ruber Waterhouse 赤美紅螢 (Ma, 1997:663)

Calochromus ruber Waterhouse, 1877:

捕 食 性。
分 佈：四川；新加坡、印度。

Calochromus shirozui Nakane 紅絨麗紅螢 (Jeng et al., 2002:175)
Calochromus shirozui Nakane, 1969:15.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(松崗)。

Calochromus subparallelus Pic 細身麗紅螢 (Jeng et al., 2002:175)
Calochromus subparallelus Pic, 1925:17.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Calochromus sungkangensis Nakane 鋸角麗紅螢 (Jeng et al., 2002:175)
Calochromus sungkangensis Nakane, 1969:12.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(松崗)。

Cautires bulenoides Kasantsev 粗脈奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:182)
Cautires bulenoides Kasantsev, 2000:81.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(桃園拉拉山)。

Cautires chui Kasantsev et Yang 朱氏奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:182; Kasantsev et Yang, 1999:240)
Cautires chui Kasantsev et Yang, 1998:240-242.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南投東埔)。

Cautires diversicollis (Pic) 黑胸奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:182)
Cladophorus fainanensis var. *diversicollis* Pic, 1925:8.
Cladophorus fainanensis var. *inlimbatus* Pic, 1925:18.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cautires fainanensis (Pic) 長枝奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:183)
Cladophorus fainanensis Pic, 1925:8.
Cladophorus singularicollis Pic, 1925:18.
Cautires fainanensis (Pic); Kleine, 1926:102.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(臺南)。

Cautires hsui Kasantsev et Yang 許氏奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:183; Kasantsev et Yang, 1999:240)
Cautires hsui Kasantsev et Yang, 1998:240.
捕 食 性。

分 佈：臺灣(新竹五峰)。

Cautires ilanensis Kasantsev et Yang 宜蘭奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:183; Kasantsev et Yang, 1999:242)

Cautires ilanensis Kasantsev et Yang, 1999:242.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Cautires jengi Kasantsev 橙紅胸紅螢 (Jeng et al., 2002:183)

Cautires jengi Kasantsev, 2000:82.

Cautires yangi Kasantsev, 2000:82.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(臺東霧鹿)。

Cautires katoi Nakane 加藤奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:183)

Cautires katoi Nakane, 1969:11.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄扇平)。

Cautires klapperrichi Bocák et Boeáková 暗紅奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:183)

Cautires klapperrichi Bocák et Boeaková, 1987:184.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(嘉義奮起湖)。

Cautires taiwanensis Jeng et Yang 臺灣奇胸紅螢 (Jeng et al., 2002:183)

Cladophoruss certus Kleine, 1926:103.

Cautires taiwanensis Jeng et Yang, in Jeng et al., 2002:183. **nom. nov.**

捕 食 性。

分 佈：臺灣(大林)。

Conderis shirozui Nakane 紋紅螢 (Jeng et al., 2002:184)

Conderis shirozui Nakane, 1968:222.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(松崗)。

Dictyoptera formosana Nakane 紅楯脈紅螢 (Jeng et al., 2002:181)

Dictyoptera formosana Nakane, 1968:217.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山)。

Dictyoptera gorhami Kôno 褐楯脈紅螢 (Jeng et al., 2002:181)

Eros erythropterus Gorham, 1883:400.

Dictyopterus gorhami Kôno, 1932:57.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本(Oyayama)。

Dihammatus atricolor Pic 黑身姬紅螢 (Jeng et al., 2002:176)

Dihammatus atricolor Pic, 1921:1.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Dihammatus parvus Nakane 姬紅螢 (Jeng et al., 2002:176)

Dihammatus parvus Nakane, 1971:151.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(八仙山)

Dilophotes atricollis Pic 黑胸細紅螢 (Jeng et al., 2002:174)

Dilophotes atricollis Pic, 1926:68.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(甲仙)；印度。

Dilophotes libnetoides Nakane 暗褐細紅螢 (Jeng et al., 2002:174)

Dilophotes libnetoides Nakane, 1971:138.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(南投武界)。

Eropterus aritai (Satô et Ohbayashi) 八重山斜條紅螢 (Jeng et al., 2002:180)

Aplatopterus aritai Satô et Ohbayashi, 1968:66.

Eropterus aritai (Satô et Ohbayashi); Nakane, 1968:104.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本(Yayeyama Is.)

Eropterus flavipennis (Nakane) 黃翅斜條紅螢 (Jeng et al., 2002:180)

Asioplateros flavipennis Nakane, 1969:9.

Eropterus flavipennis (Nakane); Nakane, 1968:99.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山)。

Eropterus okkurai Matsuda 黃肩斜條紅螢 (Jeng et al., 2002:180)

Eropterus okkurai Matsuda, 1992:94.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(高雄藤枝石山)。

Eropterus taiwanus Matsuda 臺灣斜條紅螢 (Jeng et al., 2002:180)

Eropterus taiwanus Matsuda, 1992:92.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(梅峰)。

Libnetis leei Kasantsev et Yang (Jeng et al., 2002:175; Kasantsev et Yang, 1999:243)

Libnetis leei Kasantsev et Yang, 1998:243.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(武陵)。

Libnetis opacus Pic 暗黑眼紅螢 (Jeng et al., 2002:175)
Libnetis opacus Pic, 1921:14.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；越南、寮國。

Libnetis sinica Kasantsev et Yang (Kasantsev et Yang, 1999:243)
=*Libnetis tenebrans* (Kleine, 1950), Bocáková, 1997:175.
=*Plateros tenebrans* Kleine, 1950:22. Praeoc. By *Plateros tenebrans* Kleine, 1926:53.
Libnetis sinica Kasantsev et Yang, 1999:243. N. nom.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國；菲律賓。

Libnetis sauteri Kasantsev 紹德眼紅螢 (Jeng et al., 2002:175)
Libnetis sauteri Kasantsev, 1993:72.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(甲仙)。

Lipernes perspectus Waterhouse 桃紅短須紅螢 (Ma, 1997:663)
Lipernes perspectus Waterhouse, 1879:
捕 食 性。
分 佈：福建、四川、江蘇、湖北。

Lycostomus atrimembris Pic (Jeng et al., 2002:172; Kasantsev et Yang, 1999:240)
Lycostomus atrimembris Pic, 1926:31.
Lycostomus jeanvoinei Pic, 1927:4.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；越南。

Lycostomus crassus Kleine 長節吻紅螢 (Jeng et al., 2002:172)
Lycostomus crassus Kleine, 1926:97.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lycostomus formosanus Pic 蓬萊吻紅螢 (Jeng et al., 2002:173)
Lycostomus formosanus Pic, 1937:147.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；琉球(Yayeyama Is.)。

Lycostomus placidus Waterhouse 赭喙紅螢 (Jeng et al., 2002:173; Kasantsev et Yang, 1999:240; Ma, 1997:662)
Lycostomus placidus Waterhouse, 1879:7.
捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、香港、四川。

Lycostomus similes (Hope) 相似吻紅螢 (Jeng et al., 2002:173)

Lycus similes Hope, *in* Gary[ed.], 1831:26
Lycostomus similes (Hope); Waterhouse, 1879:10.
Lycus triangularis Hope, *in* Gray [ed.], 1831:26.
Lycus suturalis Redtenbacher, 1848:508.
Lycus geminus Walker, 1858:281.
Lycus cinnabarinus Camd., 1861:355.
Lycus coccineus Motschulsky, 1861:136
Lycus patruelis Bourgeois, 1883:626.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；菲律賓、泰國、印度、斯里蘭卡。

Lyponia (Ponyalis) dolosa Kleine 長角窄胸紅螢 (Jeng et al., 2002:179)

Lyponia dolosa Kleine, 1924:173.
Lyponia (*Ponyalis*) *dolosa* Kleine, 1999:91.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(鳳山、大林)；錫金。

Lyponia (Ponyalis) gestroi (Pic) 卡氏窄胸紅螢 (Jeng et al., 2002:179)

Ponyalis gestroi Pic, 1912:2.
Lyponia formosana Kleine, 1924:174.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；琉球(Yayeyama Is.)。

Lyponia (s. str.) **kleinei** Nakane 黑胸窄胸紅螢 (Jeng et al., 2002:179)

Lyponia kleinei Nakane, 1967:286.
Lyponia (s. str.) *kleinei* Nakane; Bocák, 1999:85.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(屏東崁頭)。

Lyponia osawai Nakane 赤方紅螢 (Ma, 1997:664)

Lyponia osawai Nakane, 1969:
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北；日本。

Lyponia (s. str.) **palpalis** Nakane 邊褐窄胸紅螢 (Jeng et al., 2002:179)

Lyponia palpalis Nakane, 1971:140.
Lyponia (s. str.) *palpalis* Nakane; Bocák, 1999:84.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(霧社)。

Macrolycus alishanus Nakane 高山碩紅螢 (Jeng et al., 2002:173)

Macrolycus alishanus Nakane, 1967:72.
捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山)。

Macrolycus crasssicornis Nakane 粗角碩紅螢 (Jeng et al., 2002:173)

Macrolycus crasssicornis Nakane, 1967:72.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(松崗)。

Macrolycus dominator Kleine 碩紅螢 (Jeng et al., 2002:173)

Macrolycus dominator Kleine, 1925:327.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(鳳山、嘉義)；球球(Yayeyama Is.)。

Macrolycus erythropterus Nakane 赤翅碩紅螢 (Jeng et al., 2002:174)

Macrolycus erythropterus Nakane, 1967:72.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(松崗)。

Macrolycus flabellatus (Motschulsky) 扇角碩紅螢 (Jeng et al., 2002:174)

Lygistopterus flabellatus Motschulsky, 1860:114.

Celetes pectinifer Kiesenwetter, 1874:251.

Cerceros pectinicornis Kraatz, 1879:127.

Macrolycus flabellatus (Motschulsky); Bourgeois, 1902:89.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、蒙古、東西伯利亞。

Macrolycus laetus Nakane 深山碩紅螢 (Jeng et al., 2002:174)

Macrolycus laetus Nakane, 1967:72.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(松崗)。

Macrolycus taiwanus Nakane 臺灣碩紅螢 (Jeng et al., 2002:174)

Macrolycus taiwanus Nakane, 1967:72.

捕 食 性。

分 佈：臺灣(松崗)。

Melaneros chinensis (Waterhouse) (Kasantsev et Yang, 1999:242)

Plateros chinensis Waterhouse, 1879:29.

Melaneros chinensis, Bocáková, 1997:177.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Melaneros purus (Kleine) (Kasantsev et Yang, 1999:243)

Plateros purus Kleine, 1926:99.

=*Plateros koreanus* Kleine, 1936:263.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；朝鮮。

Melaneros sherpa Kasantsev et Yang (Kasantsev et Yang, 1999:243)

=*Plateros demissus* Kasantsev, 1991:153. Praeoc by *Plateros dimissus* Kleine, 1926.
Melaneros sherpa Kasantsev et Yang, 1999:243. N. nom.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Metanoeus formosanus Pic 蓬萊微網彎螢 (Jeng et al., 2002:184)

Metaneus[sic]*formosanus* Pic, 1926:67.
Metanoeus formosanus Pic; Bocák et Bocáková, 1987:282.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(大林)。

Parapyropterus nigrostriatus Kleine 條黑焰紅螢 (Jeng et al., 2002:181)

Parapyropterus nigrostriatus Kleine, 1926:104.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(鳳山)。

Paratelius juvencus (Kleine) (Kasantsev et Yang, 1999:246)

Scarelus juvencus Kleine, 1932:158.
=*Paratelius junius* Kasantsev, 1997:184-186.
Paratelius juvencus (Kleine), Kasantsev et Yang, 1999:246.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；北婆羅洲。

Plateros alishanus Nakane 高山短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:178)

Plateros alishanus Nakane, 1969:473.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(阿里山)。

Plateros apicicornis (Pic) 淡端短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:176)

Diitoneces apicicornis Pic, 1925:19.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros brevelineatus Pic 灰條短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:176)

Plateros brevelineatus Pic, 1922:73.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros brevenotatus Pic 短胸溝紅螢 (Jeng et al., 2002:177)

Plateros brevenotatus Pic, 1921:6.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros chinensis Waterhouse 中華闊紅螢 (Jeng et al., 2002:177; Yang et Jiang, 1992:263)

Plateros chinensis Waterhouse, 1879:7.
Plateros sycophanta fairmaire, 1888:352.
Ditoneces formosanus Pic, 1921:7.
Plateros flavomarginatus Kleine, 1936:264.
別 名：*中華短溝紅螢*。
捕 食 性。
分 佈：臺灣、香港、四川、浙江；越南、泰國。

Plateros coccinipennis Nakane 赤翅短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:177)

Plateros coccinipennis Nakane, 1971:142.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(翠峰)。

Plateros kanoi (Nakane) 鹿野短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:176)

Ditoneces kanoi Nakane, 1969:471.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(武陵桃山)。

Plateros kleineanus Nakane 克林短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:177)

Dihammatus atricolor Pic, 1921:1.
Plateros kleineanus Nakane, 1971, 150.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros laeticeps (Pic) 毛角短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:176)

Ditoneces laeticeps Pic, 1921:4.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros leechi Nakane 利曲短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:178)

Plateros leechi Nakane, 1971:145.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(松崗)。

Plateros maculatithorax (Pic) 紋胸短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:176)

Ditoneces maculatithorax Pic, 1921:4.
Ditoneces griseostriatus Kleine, 1926:101.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros picianus Nakane 猩紅短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:177)

Microdetoneces rubripennis Pic, 1921:5.
Plateros picianus Nakane, 1971:146.

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros planatus obconiceps Pic 缺刻短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:178)
Plateros planatus Waterhouse, 1879:27.
Ditoneces incisicollis Pic, 1921:5.
Plateros planatus obconiceps Pic, 1925:19.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Plateros purus Kleine 樸素短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:178)
Plateros purus Kleine, 1926:99.
Plateros koreanus Kleine, 1936:263.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本。

Plateros sauteri (Pic) 紹德短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:177)
Ditoneces maculatithorax var. *sauteri* Pic, 1925:19.
Plateros sauteri (Pic); Bocá et Bocáková, 1987:277.
Plateros gressitti Nakane, 1971:147.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(大林)。

Plateros shibatai Nakane 奄美短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:177)
Plateros shibatai Nakane, 1961:13.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本(Amami-Ôshima)。

Plateros tuberculatus Pic 瘤突闊紅螢 (Yang et Jiang, 1992:263)
捕 食 性。
分 佈：貴州、上海。

Plateros viduus Nakane 黃邊短溝紅螢 (Jeng et al., 2002:179)
Plateros viduus Nakane, 1971:149.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(武界)。

Platycis kanoi Nakane 鹿野絲角紅螢 (Jeng et al., 2002:181)
Platycis kanoi Nakane, 1967:285.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(南投合望)。

Platycis taiwanus Kôno 臺灣絲角紅螢 (Jeng et al., 2002:181)
Platycis taiwanus Kôno, 1932:59.

捕 食 性。
分 佈：臺灣(阿里山)。

Procautires socius Kleine 肩條紅螢 (Jeng et al., 2002:184)
Procautires socius Kleine, 1926:104.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(鳳山)。

Propyropterus kanoi Nakane 鹿野裂紅螢 (Jeng et al., 2002:182)
Propyropterus kanoi Nakane, 1968:222.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(阿里山)。

Propyropterus pygidialis Nakane 彎腹裂紅螢 (Jeng et al., 2002:182)
Propyropterus pygidialis Nakane, 1968:219.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(高雄苓雅)。

Scarelus longicornis Waterhouse (Kasantsev et Yang, 1999:243)
Scarelus longicornis Waterhouse, 1878:116.
=*Scarelus sumatrensis* Pic, 1912:4-5.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；爪哇。

Scarelus luchti Kasantsev et Yang (Kasantsev et Yang, 1999:245)
Scarelus longicornis sensu Kasantsev, 1992:101.
Scarelus luchti Kasantsev et Yang, 1999:245. N. nom.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；爪哇。

Scarelus maxwelli Kasantsev et Yang (Kasantsev et Yang, 1999:245)
Scarelus umbrosus sensu Kasantsev, 1992:102-103.
Scarelus maxwelli Kasantsev et Yang, 1999:245.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；馬來西亞。

Scarelus umbrosus Kleine (Kasantsev et Yang, 1999:245)
Scarelus umbrosus Kleine, 1932:117.
=*Scarelus riedeli* Bocák et Bocáková, 1995:9.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；馬來西亞。

Xylobanus leechi Nakane 利曲木紅螢 (Jeng et al., 2002:182)
Xylobanus leechi Nakane, 1971:153.
捕 食 性。

分 佈：臺灣(阿里山)。

Xylobanus nigrimembris Pic 軟黑木紅螢 (Jeng et al., 2002:182)

Xylobanus nigrimembris Pic, 1922:16.
捕 食 性。
分 佈：臺灣(大林)。

Lampyridae 螢科

(Lai et Yang, 1996:327)

Curtos costipennis (Gorham) 黃脈翅螢 (Lai et al., 1998:210)

Luciola costipennis Gorham, 1880:102.
Curtos costipennis, Chûjô et Satô, 1970:22.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本(Is. Okinawa, Yayeyama)。

Curtos impolitus (Olivier) 姬脈翅螢 (Lai et al., 1998:211)

Luciola impolita Olivier, 1913:271.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Curtos mundulus (Olivier) 黃肩脈翅螢 (Lai et al., 1998:211)

Luciola mundula Olivier, 1913:271.
Curtos mundulus, Jeng et al., 1998:338.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Curtos sauteri Olivier 紹德氏脈翅螢 (Lai et al., 1998:211)

Curtos sauteri Olivier, 1913:272.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cyphonocerus sanguineus Pic 赤翅雙櫛角螢 (Lai et al., 1998:214)

Cyphonocerus sanguineus Pic, 1991:143.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、大陸；越南。

Cyphonocerus taiwanus Nakane 臺灣雙櫛角螢 (Lai et al., 1998:214)

Cyphonocerus taiwanus Nakane, 1967:8.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Diaphanes citrinus Olivier 橙螢 (Lai et al., 1998:211)

Diaphanes citrinus Olivier, 1911:147.

捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國大陸。

Diaphanes exsanguis Olivier 雪螢 (Lai et al., 1998:211)
Diaphanes exsanguis Olivier, 1909:248.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、貴州。

Diaphanes formosus Olivier 寶島短角螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:211)
Diaphanes formosus Olivier, 1910:286.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Diaphanes lampyroides (Olivier) 鋸角雪螢 (Lai et al., 1998:212)
Pyrocoelia lampyroides Olivier, 1891:598.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；寮國、緬甸。

Drilaster atricollis Nakane 高山弩螢 (Lai et al., 1998:207)
Drilaster atricollis Nakane, 1977:90.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Drilaster flavicollis Nakane 黃胸弩螢 (Lai et al., 1998:207)
Drilaster flavicollis Nakane, 1977:96.
分 佈：臺灣。

Drilaster flavipennis Nakane 黃鞘弩螢 (Lai et al., 1998:207)
Drilaster flavipennis Nakane, 1977:90.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本(Is. Yunaguni)。

Drilaster kimotoi Nakane 黑弩螢 (Lai et al., 1998:208)
Drilaster kimotoi Nakane, 1977:93.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Drilaster olivieri (Pic) 奧氏弩螢 (Lai et al., 1998:208)
Ototreta olivieri Pic, 1911:36.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Drilaster parvus Nakane 姬弩螢 (Lai et al., 1998:208)
Drilaster parvus Nakane, 1977:94.

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Drilaster purpureicollis (Pic) 紅弩螢 (Lai et al., 1998:208)
Ototreta purpureicollis Pic, 1911:36.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Drilaster rollei (Pic) 洛氏弩螢 (Lai et al., 1998:208)
Ototreta rollei Pic, 1911:36.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Drilaster takahashii Nakane 高橋氏弩螢 (Lai et al., 1998:208)
Drilaster takahashii Nakane, 1977:89.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lamprigera yunnana Fairmaire 雲南扁螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:213)
Lamprigera yunnana Fairmaire, 1897:216.
=*Lamprigera yunnanensis*, McDermott, 1966:77.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、華南。

Lucidina accensa Gorham 卵翅鋸角螢 (Lai et al., 1998:213)
Lucidina accensa Gorham, 1883:408.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本。

Lucidina biplagiata (Motschulsky) 紅紋黑螢 (Lai et al., 1998:213; Zhang, 1987[ed.] 2:11)
Lychnuris biplagiata Motschulsky, 1866:167.
捕 食：蝸牛、蛞蝓、蚯蚓
地老虎
分 佈：臺灣、江西、朝鮮、日本、庫頁島。

Lucidina roseonotata Pic 赤腹鋸角螢 (Lai et al., 1998:213)
Lucidina roseonotata Pic, 1917:5.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Luciola anceyi Olivier 大端黑螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:209)
Luciola anceyi Olivier, 1883:330.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、中國大陸；越南、緬甸。

Luciola cerata Olivier 黑翅螢 (Lai et al., 1998:209)

Luciola cerata Olivier, 1911:147.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Luciola chinensis Linnaeus 中華黃螢 (Hun., 1992:367; Lai et al., 1998:209; Zhang, 1987[ed.] 2:11)

別 名：*中華熠螢*。

捕 食：蝸牛、蛞蝓、蚯蚓
地老虎。

分 佈：臺灣、江西、湖南、浙江、江蘇。

Luciola ficta Olivier 黃緣螢 (Lai et al., 1998:209)

Luciola ficta Olivier, 1909:249.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、香港、貴州。

Luciola filiformis Olivier 紋胸黑翅螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:209)

Luciola filiformis Olivier, 1913:271.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本(Is. Ishigaki, Iriomote)。

Luciola formosana Pic 寶島熠螢 (Lai et al., 1998:209)

Luciola formosana Pic, 1913:271.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Luciola gorhami Ristsema 端黑螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:210)

Luciola gorhami Ristsema, 1883:4.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；印度、印尼。

Luciola japonica (Thunberg) 黃熠螢 (Lai et al., 1998:209)

Lampyris japonica Thunberg, 1784:79.

Luciola japonica Fabricius, 1878:162.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本。

Luciola kagiana Matsumura 紅胸黑翅螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:210)

Luciola kagiana Matsumura, 1928:63.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Luciola lateralis Motschulsky 寬條胸螢 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)

捕 食：蝸牛、蛞蝓、蚯蚓
地老虎。
分 佈：江西。

Luciola ovalis Hope 黃帶熠螢 (Lai et al., 1998:210)
Luciola ovalis Hope, 1831:26.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；越南、緬甸。

Luciola parvula Kiesenwetter 暗紋胸螢 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)
捕 食：蝸牛、蛞蝓、蚯蚓
地老虎。
分 佈：江西。

Luciola substriata Gorham 條背螢 (Lai et al., 1998:210)
Luciola substriata Gorham, 1990:100.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；緬甸、印度。

Luciola sp. 螢 (Takahashi, 1941:)
捕 食：*Achatina fulica* Bowdich 非洲大蝸牛
Bradybaena similis Ferus 扁蝸。
分 佈：臺灣(臺北)。

Lychnuris analis Fabricius 大陸窗螢 (Lai et al., 1998:212)
Lychnuris analis Fabricius, 1801:100.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、金門、大陸。

Lychnuris formosana (Olivier) 紅胸窗螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:212)
Pyrocoelia formosana Olivier, 1911:146.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lychnuris praetexta (Olivier) 山窗螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:212)
Pyrocoelia praetexta Olivier, 1911:66.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Lychnuris sanguiniventer (Olivier) 赤腹窗螢 (Lai et al., 1998:212)
Pyrocoelia sanguiniventer Olivier, 1911:145.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pristolycus kanoi Nakane 鹿野氏黑脈螢 (Lai et al., 1998:213)

Pristolycus kanoi Nakane, 1967:289.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Pyrocoelia amplissima Oliver 黃胸黑鋸齒螢 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Pyrocoelia analis (Fabricius) 臺灣窗螢 (Chiu, 1965:19; Chiu et Chou, 1978:369; Ho et al., 2002(1):43-51; Lo, 1997:59)

捕 食：*Achatina fulica* Bowdich 非洲大蝸牛。

分 佈：臺灣。

Pyrocoelia anylissima E-elav 凹背鋸角螢 (Hun., 1992:366)

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、浙江。

Pyrocoelia foochowensis Gorh. 螢 (Takano et 柳原, 1939:)

捕 食：*Eulota toyenmongaiensis* Rolle 蝸牛。

分 佈：臺灣、福建。

Pyrocoelia tsushimana Matsumura 褐翅鋸角螢 (Zhang, 1987[ed.] 2:11)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Stenocladius bicoloripes Pic 雙色垂鬚螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:208)

Stenocladius bicoloripes Pic, 1918:3.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Vesta chevrolati Laporte 黑腹櫛角螢 (Lai et al., 1998:214)

Vesta chevrolati Laporte, 1833:133.

捕 食 性。

分 佈：臺灣；印尼。

Vesta formosana Pic 寶島櫛角螢 (Lai et al., 1998:214)

Vesta formosana Pic, 1944:2.

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Vesta impressicollis Fairmaire 赤腹櫛角螢 (Chang et al., 2000:59; Lai et al., 1998:214)

Vesta impressicollis Fairmaire, 1891:15.

捕 食 性。
分 佈：臺灣、大陸。

Vesta rufiventris (Motschulsky) 卵翅櫛角螢 (Lai et al., 1998:214)
Cratolampis rufiventris Motschulskly, 1854:43.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、大陸。

Drilidae 稚螢科

Idgia denota Farm. 黑尾小黃稚螢 (Hun., 1992:367; Yang et Jiang, 1992:262)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、浙江、江蘇。

Lucidina vitalisi Pic 維神光螢 (Yang et Jiang, 1992:262)
捕 食 性。
分 佈：貴州、四川、浙江。

Luciola chinensis L. 中華黃螢 (Yang et Jiang, 1992:262)
捕 食 性。
分 佈：貴州、浙江、湖北。

Luciola costipennis Gorh. 翼脊黃螢 (Yang et Jiang, 1992:262)
捕 食 性。
分 佈：貴州、上海。

Luciola ovalis Hope 卵黃螢 (Yang et Jiang, 1992:262)
捕 食 性。
分 佈：廣西、貴州。

Pyrocoelia amflicisima Olivier 阿佛火腹螢 (Yang et Jiang, 1992:262)
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Pyrocoelia anylissima Olivier 阿利火腹螢 (Yang et Jiang, 1992:262)
捕 食 性。
分 佈：江西、貴州、浙江。

Pyrocoelia praetexta (Olivier) 蓋火腹螢 (Yang et Jiang, 1992:263)
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Pyrocoelia signaticollis Olivier 封勁火腹螢 (Yang et Jiang, 1992:263)

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川、浙江、江蘇。

Cantharidae 花螢科

(Wang. 1997:657-661)

Athemus (s. str.) **maculithorax** Wang et Yang 斑胸異花螢 (Wang, 1997:658; Wang et Yang, 1992: 264-265)

Athemus (s. str.) *maculithorax* Wang et Yang, 1992:264-265.

捕 食 性。

分 佈：四川、湖北。

Athemus (s. str.) **testaceipes** Pic 褐異花螢 (Wang et Yang, 1992:266)

捕 食 性。

分 佈：四川、浙江、北京。

Cantharis curtata Kies 赤胸花螢 (Zheng, 1982[ed.]:191)

捕 食：*Mimastra cyanura* Hope 黃葉蟲(桑)。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江、江蘇。

Podabrus magnus Wang et Yang 大雙齒花螢 (Wang et Yang, 1990:239)

Podabrus magnus Wang et Yang, 1990:239.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(正鑲白旗、呼倫貝爾盟海拉爾、烏拉山)。

Prothemus biforatus Wang 雙孔圓胸花螢 (Wang, 1997:657)

Prothemus biforatus Wang, 1997:657.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Prothemus chinensis Wittmer 中國圓胸花螢 (Wang, 1997:657; Wang et Yang, 1992:266)

Prothemus chinensis Wittmer, 1987:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、四川、浙江、湖北、陝西、甘肅。

Prothemus neimongolanus Wang et Yang 內蒙圓胸花螢 (Wang et Yang, 1990:240)

Prothemus neimongolanus Wang et Yang, 1990:240.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(太仆寺旗、正鑲白旗)。

Themus coelestis (Gorham) 藍黃褐花螢 (Hun., 1992:367)

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Themus (s. str.) **coriaceipennis** (Fairmaire) 褐翅麗花螢 (Wang, 1997:658)
Themus (s. str.) *coriaceipennis* (Fairmaire, 1889:)
捕 食 性。
分 佈：廣西、四川、湖北、陝西、河北、甘肅。

Themus (s. str.) **imperialis** (Gorham) 黑斑黃背花螢 (Hun., 1992:367; Wang, 1997:659)
Themus imperialis (Gorham, 1889:)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、湖北、甘肅；越南。

Themus (Telephorops) impressipennis Fairm. 紫赤褐花螢 (Hun., 1992:367)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：湖南。

Themus (s. str.) **kuatunensis** Wittmer 挂墩麗花螢 (Wang, 1997:659)
Themus (s. str.) *kuatunensis* Wittmer, 1983:
捕 食 性。
分 佈：福建、四川、湖北、河北。

Themus (Haplosthemus) rugosocyaneus (Fairmaire) 皺藍麗花螢 (Wang, 1997:660)
Themus rugosocyaneus (Fairmaire, 1889:)
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川、湖北；越南。

Themus (Haplothemus) talianus (Pic) 黑脛麗花螢 (Wang et Yang, 1992:266)
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、西藏、湖北；越南。

Themus (s. str.) **violetipennis** Wang et Yang 紫翅麗花螢 (Wang, 1997:660; Wang et Yang, 1992: 265-266)
Themus (s. str.) *violetipennis* Wang et Yang, 1992:265-266.
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江、安徽、湖北。

Cleridae 郭公蟲科

Cladiscus sp. 紅頭筒郭公 (Zhang, 1987[ed.] 2:12)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Opilo luteonotatus Pic 褐紋郭公蟲 (Hun., 1992:368)
捕 食 性。
分 佈：江西、湖南、浙江。

Ophilo sp. 褐郭公 (Zhang, 1987[ed.] 2:12)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Orthrius abruptepunctatus Schenklang 斷行筒郭公 (Xie, 1992:261)

捕 食 性。

分 佈：湖南、雲南、四川。

Orthrius pieli Pic 皮氏郭公蟲 (Hun., 1992:368; Xie, 1992:261)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、浙江。

Stenocallimerus sinensis Yang et Chang 華瘦葉郭公 (Xie, 1992:261)

捕 食 性。

分 佈：廣西、貴州。

Stigmatium mutillaecolor White 截斑郭公蟲 (Hun., 1992:368)

捕 食 性。

分 佈：湖南、浙江、江蘇；越南。

Thanasinus lewisi Jacobson 擬蟻郭公蟲 (Xu, 1985:25)

捕 食：天牛(成蟲、幼蟲)。

分 佈：廣東、湖北等地。

Thanasinus nigricollis Lewis 黑胸擬蟻郭公 (Zhang, 1987[ed.] 2:12)

捕 食：小蠹。

分 佈：江西。

Thanasinus sp. 擬蟻郭公 (Zhang, 1987[ed.] 2:12)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Thaneroclerus buquel Lef. 暗褐郭公蟲 (Gu, 1988:174)

捕 食：寄居于生地、蜈蚣、金鎖匙、良羌、冬花、烏藥花、淮山、郁金、蘆根、玉竹、黨參、菊花、獨活、紅豆、騰力子、烏蛇、當歸、胡黃蓮、檳榔、砂仁海螺掩、大楓子、大海子、山甲片、麻黃、夏枯草、台烏、白加皮、木棉花捕食其它害蟲。

分 佈：廣東。

Tillus notatus Klug 赤基郭公 (Lin et al., 1990:65-69; Yan et Lo, 1991:433-438; Zhang, 1987[ed.] 2:12)

別 名：*斑郭公蟲*。

捕 食：*Sitophilus zeamais* 玉米象
Rhhyzopertha dominica 穀蠹
Lasioderma serricorne 煙甲蟲
Sitotroga cerealella 麥蛾
Cadra cautella 粉斑螟
Carpophilus obsoletus 米露尾蟲。
分 佈：臺灣、江西。

Trichodes sinae Chevrolat 中華食蜂郭公蟲 (Hun., 1992:368)
別 名：*黑斑紅毛郭公*。
捕 食：寄生于蜜蜂巢，或在蛀材甲蟲坑道內捕食幼蟲。
分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、北京、東北。

Trichodes sp. 小毛郭公 (Zhang, 1987[ed,] 2:12)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Corynetidae 隱跗郭公甲科

Necrobia ruficollis (Fabricius) 赤頸郭公甲 (ASZI, 1986, 1:434)
捕 食：昆蟲(幼蟲)
蠅類(蛹)
幼蟲食乾肉、生皮、骨骼、乾魚、動物性藥材。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、浙江；世界各地。

Necrobia rufipes (De Geer) 赤足郭公甲 (ASZI, 1986, 1:435; Wang, 1989:122)
捕 食：寄蠅蛹
乾酪蠅(幼蟲)
本種(幼蟲)爲害乾魚、鹹肉、生皮、畜骨、動物性藥材、乾果類。
分 佈：福建、廣東、廣西、浙江、山東、山西、甘肅、新疆；世界各地。

Dermestidae 皮蠹科

Thaumaglossa sp. 皮蠹 (Yan et al., 1981(3):30)
Thaumaglossa sp. Yan et al., 1981(3):30.
捕 食：*Hierodula patellifora* Serville 廣腹螳螂(卵鞘內取食卵粒)
Paratenodera sinensis Saussure 中華大刀螂(卵鞘內取食卵粒)。
分 佈：北京。

Cucujidae 扁甲科

Cryptolestes ferrugineus (Stephens) 銹赤扁穀盜 (ASZI, 1986, 1:453; Hun., 1992:371; Wang, 1989:122; Zhang,

1987[ed.] 2:14)
捕 食：生活在樹皮下與黃蜂巢內，亦為害糧食，寄蠅蛹、捕食倉庫害蟲。
分 佈：世界性。

Cryptolestes pusillus (Schöenherr) 長角扁穀盜 (ASZI, 1986, 1:453; Hun., 1992:370)
捕 食：在樹皮下發現，攻擊小蠹幼蟲與卵，并取食貯糧粉屑等。
分 佈：世界性。

Cryptolestes turcicus (Grouvellel) 土耳其扁穀盜 (ASZI, 1986, 1:453; Hun., 11992:371; Liu et al., 1990:199; 1991: 77)
別 名：*小角胸粉扁蟲*。
捕 食：*Cryphalus exignus* 桑梢小蠹(卵)
幼蟲喜食種子胚芽，在野外生活在樹皮下，攻擊小蠹(幼蟲、卵)，或食穀類、麵粉、乾果等。
分 佈：江蘇、全國各地；世界廣佈。

Ostomatidae 穀盜科

Tenebroides mauritanicus Linnaeus 大穀盜 (Zhang, 1987[ed.] 2:14)
寄 主：各種貯糧、糧食加工品、當歸等中藥材；成蟲捕食米象、穀蛾等幼蟲。
分 佈：江西。

Colydiidae 堅甲科

Dastarcus helophoroides Fairm. 木蜂絨堅甲 (Chao, 1982:94)
寄 主：*Xylocopa appendiculata* Smith 木蜂。
分 佈：

Dastarcus longulus Sharp 花絨堅甲 (Choa, 1982:94; Lo, 1997:61; Xiao, 1985(20):29; Xu, 1985:23)
寄 主：光肩星天牛(幼蟲)
Anoplophora macularis 斑星天牛(幼蟲)
桑天牛(幼蟲)
雲斑天牛(幼蟲)
雙條合歡天牛(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅。

Dastarcus sp. 絨堅甲 (Zhang, 1987.(2):16)
寄 主：天牛等昆蟲體內
分 佈：江西。

Cybocephalidae 方頭甲科

(Yu, 1997:665-668)

Cybocephalus dissectus Yu 深裂方頭甲 (Yu, 1997:667)

Cybocephalus dissectus Yu, 1994:

捕 食 性。

分 佈：廣東、廣西、四川、湖北。

Cybocephalus gibbulus Erichson 黃胸小黑出尾蟲 (Chiu et Lo, 1985:3; Wu et Tao,:149-150)

別 名：*黃胸小黑菌蟲*。

捕 食：*Chrysomphalus anoidum* (Linnaeus) 褐圓蚧

Aspidiotus deutructor Signoret 淡圓蚧(椰子)。

分 佈：臺灣。

Cybocephalus guilinensis Yu 桂林方頭甲 (Yu, 1995:278)

Cybocephalus guilinensis Yu, 1995:278-280.

捕 食 性。

分 佈：廣西(桂林)。

Cybocephalus intermetius Yu 三峽方頭甲 (Yu, 1997:666)

Cybocephalus intermetius Yu, 1997:666.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Cybocephalus nanlingensis Tian et Yu 南嶺方頭甲 (Tian et Yu, 1994, 16(3):121)

Cybocephalus nanlingensis Tian et Yu, 1994:121-122.

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Cybocephalus nipponicus Endrody-Younga 日本方頭甲 (Gao, 1989:137; He et al., 1996(4):34; Huang et Gao, 1996:162; Huang et al., 1988, 15(1):15-21; Huang et al., 1991:13; Huang et al., 1993:190; Li et al.,1990:63; Lin et al., 1994:91-94; Pan et al., 1987:186; Ren et al., 1991:157; Su et al., 1986:37; Tian et Yu, 1994, 16(3):120; Wang et al., 1984, 11(1):23-28; Yu, 1997:665; Yu et Gong, 1993, 15(4):179-182)

Cybocephalus nipponicus Endrody-Yonge, 1971:

捕 食：*Aulacaspis rosae* (Bouché) 薔薇白輪蚧(刺梨 *Rosa roxburghii* Tratt)

Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧(廣東)

Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧

Pseudaulacaspis cockerelli Cooley 考氏白盾蚧(白蘭)

Pseudaulacaspis pentagona (Targoni-Tozzetti) 桑白蚧

Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧

蠟蚧

盾蚧

粉蚧

粉蝨

蟎類。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、香港、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北陝西、河北、北京、甘肅、遼寧；日本、印度、斯里蘭卡、馬里亞納群島、密克羅尼西亞群島。

Cybocephalus sublucidus (Plavilshtshikov) 光亮方頭甲 (Tian et Yu, 1994, 16(3):120; Yu et Gong, 1993, 15(4):179-182)

Cybocephalus sublucidus (Plavilshtshikov, 1935:)

捕 食 性。

分 佈：新疆(喀喇昆侖山)。

Cybocephalus taiwanensis Tian et Pang 臺灣方頭甲 (Tian et Pang, 1994:401-403)

Cybocephalus taiwanensis Tian et Pang, 1994:402-403.

捕 食 性。

分 佈：臺灣

Cybocephalus tricarinatus Yu 三脊方頭甲 (Yu, 1995:277)

Cybocephalus tricarinatus Yu, 1995:277-278.

捕 食 性。

分 佈：河北 。

Cybocephalus sp. 小黑方頭甲 (Wen et Lee, 1981:134)

捕 食：*Tetranychus cinnabarinus* Boisduval 朱砂葉蟎(木瓜)。

分 佈：臺灣。

Endomychidae 偽瓢蟲科

Saula japonica Gorham 黃色偽瓢蟲 (Lo et Ho, 1970:193; Wen et Lee, 1981:134; Wen et al., 1993:303)

捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donn. 擬紅蟎
Panonychus citri (McGreger) 橘全爪蟎
Tetranychus cinnaborinus Boisduval 朱砂葉蟎
Tetranychus cordylinicolus Lo 葉蟎
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj. 瓜葉蟎
Tetranychus hydrangeae Prit. et Bak. 葉蟎
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎
Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉蟎
Tetranychus truncatus Etr. 截形葉蟎

分 佈：臺灣。

Coccinellidae 瓢蟲科

(He et al., 1995, 21(6):19-22; Li, 1997:698-713; Shi, 1980[ed.]:113-116; Yan et Mei, 1996, 22(5):24-25; Yue, 1989:141-149; 202-211)

Aasges prior Barovaskij 鋸毛腹瓢蟲 (Jing, 1987:226; 1992:547)

Aasges prior Barovaskij, 1926:
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅、內蒙古。

Adalia bipunctata (Linnaeus) 二星瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:470; ASZI et al., 1978:153; He et al., 1991:106; Huang et Pang, :224; Jing, 1988:282; 1992:552; Liu, 1963:36; 1965:36; Pang et Mao, 1980(2):39; Zhang, 1987[ed.] 2:16)
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758:)
捕 食：桃粉蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Aphis laburini Kaltenback 槐蚜
Toxoptera graminum Rondani 麥二叉蚜
稻蚜
Icerya purchasi Maskell 吹綿蚧
矢尖蚧
梨圓蚧
黑點蚧。
分 佈：福建、江西、廣東、雲南、西藏、四川、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、青海、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧；亞洲、歐洲、非洲、南美洲。

Adonia variegata (Goeze) 多異瓢蟲 (ASZI et al., 1978:146; Bai, 1994, 10(3):130; Fan et Zhao, 1988:187-190; Fan et al., 1993:191-192; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; Jing, 1988:281; 1992:552; Li, 1981:298; Liu, 1963: 34; 1965: 34; Nan et al., 1987:125; Wang et al., 1989:96; Wang et al., 1991:79-81; Yan, 1988:83-84; Zong et al., 1986:118)
Adonia variegata (Goeze, 1777:)
捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
Aphis laburni Kaltenback 槐蚜
Macrosiphum avenae 麥長管蚜
Schizphis graminum 麥二叉蚜
豆蚜
玉米蚜
苜蓿蚜
蘋果蚜
蚜蟲類
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲。
分 佈：福建、雲南、西藏、四川、湖北、河南、山東、山西、河北、北京、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；古北區、印度、非洲中部。

Afissula spatulata Cao et Xiao 匙管崎齒瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:110)
Afissula spatulata Cao et Xiao, 1984:110.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Aiolocaria hexaspilota (Hope) 六斑異瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:469; ASZI et al., 1978:151; Huang et Pang, 1991:225; Hun.,

1992:413; Jing, 1988:286; 1992:565; Li, 1993, 19(5):51; Li et Wang, 1984:230; Liu, 1963:58; 1965: 58; Pang et Mao, 1980(2):37; Peng et al., 1997, 19(3):117; Yang, 1983:137-141; Yu et Wang, 1999;150; Yunn., 1987:606; Zeng, 1995,11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:16)

Coccinella hexaspilota Hope, 1831:
=*Leis mirabilis* Motschulsky, 1860:
Aiolocaria hexaspilota; Crotch, 1874:
=*Ithone degenerata* Semenov, 1889:

別 名：*奇變瓢蟲*。
捕 食：梨木蝨
蚜蟲類
Chrysomela adamsi 榿木葉甲(卵、幼蟲、蛹)
Chrysomela liginigpunctata Scopoli 柳十星葉甲
Chrysomela popali Linnaeus 白楊葉甲
Gastrolina depressa pallipes Chen 核桃扁葉甲 (卵、幼蟲)
Podontia lutea Olivier 漆跳甲
蚧蟲
蟎類。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、海南、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、陝西、山東、河北、北京、甘肅、內蒙古、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞)、緬甸、印度、尼泊爾、錫金、克什米爾。

Aiolocaria mirabilis (Motschulsky) 六斑奇變瓢蟲 (Li, 1997:705)
Aiolocaria mirabilis (Motschulsky, 1860:)
寄 主：蚜蟲。
分 佈：四川、湖北；日本、西伯利亞。

Anisolemnia dilatata Fabricius 十斑大瓢蟲 (Huang, 1990[ed.]:195; Su et al., 1986:36)
捕 食：*Aphis bambusae* Fullaway 竹紅蚜(竹)。
分 佈：廣東。

Anisosticta kobensis Lewis 展緣異點瓢蟲 (Zhang, 1987[ed.] 2:16)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：江西。

Alloneda dodecaspilota (Hope) 十二斑奇瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:345; Jina, 1985:426; 1988:284; Peng et al., 1997, 19(3):118; Yunn., 1987:606)
Coccinella dodecaspilota Hope, 1831:
Alloneda dodecastigma; Iablokoff-Khnzorian, 1979:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：海南、雲南、西藏(墨脫)；越南、緬甸、錫金、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡。

Alloneda novemmaculata Cao et Pu 九斑奇瓢蟲 (Cao et Pu, 1985:273)
Alloneda novemmaculata Cao et Pu, 1985:273.
捕 食：甘蔗、竹子、玉米、果樹上的蚜蟲。
分 佈：廣西。

Alloneda osawai Sasaji 十斑奇瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):118)
Alloneda osawai Sasaji, 1986:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南。

Amida tricolor (Harold) 三色花瓢蟲 (Jing, 1986:270)
捕 食 性。
分 佈：廣西；日本。

Amida tricolor formosana Kurisaki 臺灣三色花瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:76)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Anatis ocellata (Linnaeus) 灰眼斑瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:470; ASZI et al., 1978:153; Liu, 1963:49; 1965:49; Pang et Mao, 1980(2):38)
捕 食：松蚜。
分 佈：北京、東北。

Anisolemnia dilatata (Fabricius) 十斑大瓢蟲 (Liu, 1963:56; 1965:56)
捕 食：竹蚜
甘蔗綿蚜。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川；印度、印尼。

Anisolemnia pearsoni Crotch 萍斑大瓢蟲 (Liu, 1963:57; 1965:57)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南；印度。

Anisosticta kobensis Lewis 展緣異點瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:463; Dai et al., 1987:(封)3; He et al., 1991:106; Pang et Mao, 1980((2):37; Wang et al., 1989:96; Zhao et Shen, 1988:138)
=*Anisosticta novemedecim puctata*, Liu, 1963: (*nec* Linnaeus)
捕 食：稻蚜
三棱草蚜蟲
Ostrinia furnacalis (Guenée) 亞洲玉米螟。
分 佈：江西、湖南、江蘇、河南、山東、河北、北京、遼寧、黑龍江；日本。

Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus) 十九星瓢蟲 (Liu, 1963:34; 1965:34)
捕 食：蚜蟲
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲。
分 佈：河北、北京；西伯利亞、歐洲、北美洲。

Anisolemnia dilatata (Fabricius) 十斑大瓢蟲 (ASZI et al., 1978:151)
捕 食：竹蚜

甘蔗綿蚜
蚜蟲。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川；印尼、印度。

Anisolemnia pearsoni Crotch 苹斑大瓢蟲 (Hun., 1992:413)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南、湖南；印度。

Anisosticta kobensis Lewis 展緣異點瓢蟲 (ASZI et al., 1978:145; Hun., 1992:409)
捕 食：三稜草蚜蟲。
分 佈：湖南、江蘇、陝西、北京；日本。

Anisosticta terminassianae Beilawski 隆緣異點瓢蟲 (ASZI et al., 1978:145; Huang et Pang, 1991:225; Pang et Mao, 1980(2):37)
捕 食：三稜草蚜蟲。
分 佈：福建、北京；蘇聯。

Arawana isensis (Kamiya) 等壯唇瓢蟲 (Jing, 1992:568)
Arawana isensis (Kamiya, 1966:)
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；日本。

Asemiadalia heydeni (Wse.) 淡唇突角瓢蟲 (Jing, 1988:281)
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)；克什米爾、阿富汗、蘇聯、德國。

Asemiadalia lixionensis Jing 理縣突角瓢蟲 (Jing, 1992:550)
Asemiadalia lixionensis Jing
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Asemiadalia potanini (Weise) 黑斑突角瓢蟲 (Jing, 1988:282; 1992:550)
Asemiadalia potanini (Weise, 1889:)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南、西藏(波密)、四川、湖北、陝西、甘肅。

Asemiadalia spiculimaculata Jing 矛斑突角瓢蟲 (Jing, 1992:550)
Asemiadalia spiculimaculata Jing
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、陝西。

Aspidimerus decemmaculatus Pang et Mao 十斑隱脛瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:56)
Aspidimerus decemmaculatus Pang et Mao, 1979:56.

捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Aspidimerus esakii Sasaji 四斑隱脛瓢蟲 (Ma et al., 1995:225; Pang et Mao, 1979:54)
Aspidimerus esakii Sasaji, 1968:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、廣西、浙江。

Aspidimerus matsumurai Sasaji 雙斑隱脛瓢蟲 (ASZI et al., 1978:141; Pang et Mao, 1979:53; Xiao et Li, 1992:373; Yunn., 1987:623)
Aspidimerus matsumurai Sasaji, 1968:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、雲南、湖北。

Aspidimerus ruficrus Gorham 紅褐隱脛瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:460; Pang et Mao, 1979:55; Yunn., 1987:624)
Aspidimerus ruficrus Gorham, 1895:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南、四川；緬甸。

Aspidimerus sexmaculatus Pang et Mao 六斑隱脛瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:55)
Aspidimerus sexmaculatus Pang et Mao, 1979:55.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Axinoscymnus beneficus Kamiya 無花果斧瓢蟲 (Peng et al., 1997, `9(3):105; Peng et al., 1999:94)
Axinoscymnus beneficus Kamiya, 1963:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、廣東；日本。

Axinoscymnus cardilobus Ren et Pang 心葉斧瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):105)
Axinoscymnus cardilobus Ren et Pang, 1992:
捕 食 性。
分 佈：海南、廣東。

Ballia dianae Mulsant (Liu, 1963:62; 1965:62)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南；印度。

Ballia eucharis ab. **mayeti** Mulsant 米斑瓢蟲 (Liu, 1963:62; 1965:62)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南；印度。

Ballia korschefskyi Mader 泡斑瓢蟲 (Liu, 1963:63; 1965:63)

捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南。

Ballia obscurosignata Liu 隱斑瓢蟲 (ASZI et al., 1978:152; Hu et al., 1978:279-289; Liu, 1962:263; 1963:63; 1965:63)
Ballia obscurosignata Liu, 1962:263.
捕 食：松蚜。
分 佈：福建、廣東、廣西、浙江、江蘇、山東、河北、北京、遼寧。

Ballia zephirinae Mulsant 墨斑瓢蟲 (Liu, 1963:61; 1965:61)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南；印度、日本。

Bothrocalvia albolineata (Schoenherr) 細紋裸瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:474; ASZI et al., 1978:156; He et al., 1991:106; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, 1991:225; Jing, 1992:542; Li, et al.,:92; Pang et Mao, 1980(2):39; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:40; Tang et al., 1995(4):168; Yu et Pang, 1992:14; Yunn., 1987:614; Zhang, 1987[ed.] 2:16)
Bothrocalvia albolineata (Schoenherr, 1808:)
Calvia albolineata Schönberr, Liu, 1963:
捕 食：麥蚜
菜蚜
松蚜
稻蚜
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松圓突蚧。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；日本、印度。

Bothrocalvia circinatella Jing 小圓紋裸瓢蟲 (Jing, 1992:542)
Bothrocalvia circinatella Jing, 1992:542-543.
寄 主：
分 佈：四川。

Bothrocalvia lewisi (Crotch) 紋裸瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:474; Huang et Pang, 1991:225; Li et al., 1990:91; Pang et Mao, 1980(2):39; Yunn., 1987:614)
Calvia lewisi Crotch
捕 食：蚜蟲。
分 佈：福建、廣西、雲南；緬甸。

Bothrocalvia pupillata (Szartz) 十眼裸瓢蟲 (Li et al., 1990:91)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：廣東、廣西、雲南。

Brumoides hainanensis Miyatake 海南縱條瓢蟲 (He et al., 1991:110; Huang et Pang, 1991:223; Li et al., 1990:75;

Brumoides hainanensis Miyatake, 1970:
捕 食：*Nilaparvata luges* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
蚜蟲。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。

Brumoides lineatus (Weise) 寬紋縱條瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:223; Li et al., 1990:75; Pang et Mao, 1979: 72; Peng et al., 1997, 19(3):114; Yu et Pang, 1992:17)
Brumus lineatus Weise, 1885:
=*Brimoides lineatus* var. *ruficollis* Weise, 1885 :
Brumoides lineatus, Miyatake, 1970:
捕 食：豆蚜
高梁蚜
甘蔗粉蚧。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、西沙群島、廣西；泰國、緬甸、印度、孟加拉、斯里蘭卡。

Brumoides maai Miyatake 紋縱條瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:223; Li et al., 1990:76; Pang et Mao, 1979:73)
Brumoides maai Miyatke, 1970:
捕 食 性。
分 佈：福建、廣西。

Callicaria superba (Mulsant) 日本麗瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:470; ASZI et al., 1978:150; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, 1991:225; Li, 1997:704; Pang et Mao, 1980(2):37; Yunn., 1987:606)
Callicaria superba (Mulsant, 1850:)
=*Callicaria superba japonica* Sicard
別 名：*黑腹大瓢蟲*。
捕 食：女貞綿蚜
梨粉蚜
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
蚧蟲。
分 佈：臺灣、福建、雲南、西藏、四川、陝西；日本、印度。

Callicaria superba japonica Sicard 日本麗瓢蟲 (Li, 1981:398)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：西藏、四川；日本。

Callineda sedecimnotata (Fabricius) 纖麗瓢蟲 (ASZI et al., 1978:152; Liu, 1963:64; 1965:64; Sun et al., 1982:40)
捕 食：*Formosaphis micheliae* Takahashi 白蘭臺灣蚜。
分 佈：廣東、雲南；菲律賓、印尼。

Calvia albolineata (Schönherr) 細紋裸瓢蟲 (Li, 1997:702; Liu, 1963:45; 1965:45; Ma et al., 1995:227)
Calvia albolineata (Schönherr)

捕 食：松蚜
棉蚜
麥長管蚜
禾谷縊管蚜
桃蚜
蘿蔔蚜
菜蚜
蚜蟲。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江。

Calvia championorum Booth 三紋裸瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:114)
Calvia championorum Booth, 1997:
棲 息：松樹及鐵杉。
捕 食：球蚜。
分 佈：臺灣、雲南、四川、陝西、甘肅；印度。

Calvia (Anicocalvia) chinensis (Mulsant) 華裸瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:473; He et al., 1991:106; Huang et Pang, 1991:225; Jing, 1992:553; Li, 1997:701; Li et al., 1990:93; Pang et Mao, 1980(2):39; Sun et al., 1984:111; Tang et al., 1995(4):168; Wang, 1981(3):40-43; Xiao et Li, 1992:381; Yu et Pang, 1992:14; Yunn., 1987:614; Zhang, 1987[ed.] 2:16)
Sospita chinensis Mulsant, 1850: Liu, 1963:
Calvia (*Anisocalvia*) *chinensis*; Iablokoff-Khnzorian, 1982:
別 名：*中華裸瓢蟲，華鹿瓢蟲*。
捕 食：華山松上的蚜蟲
稻蚜
麥長管蚜
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西。

Calvia decemguttata (Linnaeus) 十星裸瓢蟲 (Jing, 1992:553)
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767:)
捕 食 性。
分 佈：四川；日本、蘇聯、歐洲。

Calvia duodecimmaculata (Gebler) 十二星裸瓢蟲 (Jing, 1985:426; 1988:283; 1992:553)
Calvia duodecimmaculata (Gebler, 1832:)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：西藏、四川、陝西、河北；日本、蘇聯、印度、斯里蘭卡、北美。

Calvia hauseri (Mader) 枝斑裸瓢蟲 (Li, 1997:701; Jing, 1992:554; Liu, 1963:46; 1965:46; Pang et Mao, 1980(2):39; Yunn., 1987:614)
Calvia hauseri (Mader, 1930:)
捕 食：玉米蚜。

分 佈：雲南、四川、湖北、陝西。

Calvia lewisii (Cretch) 寬紋裸瓢蟲 (Liu, 1963:46; 1965:46)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：福建、雲南；緬甸。

Calvia muiri (Timberlake) 黃斑裸瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:225; Jing, 1992:554; Li, 1997:701; Li et al.,1990:93; Pang et Mao, 1980(2):39; Xiao et Li, 1992:381; Yu et Wang, 1999:112; Yunn.1987:614; Zhang, 1987[ed.] 2:16)
Calvia muiri (Timberlake, 1943:)
別 名：*四斑裸瓢蟲*。
捕 食：麥蚜
菜蚜
棉蚜
竹蚜
蚜蟲
滇楊、核桃上的蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、河南、陝西、河北；日本。

Calvia quatuordecimguttata (Linnseus) 十四星裸瓢蟲 (Jing, 1985:426; 1988:283; 1992:555; Wang et al., 1989:96)
Calvia quatuordecimguttata (Linnseus, 1758:)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：湖南、西藏、四川、湖北、陝西、吉林；日本、蘇聯、歐洲、北美。

Calvia (Anisocalvia) quindecimguttata (Fabricius) 十五星裸瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:473; ASZI et al., 1978:167; He et al., 1991: 106; Huang et Pang, 1991:225; Jing, 1992:554; Li, 1997:702; Li et al., 1990:92; Liu, 1963:45; 1965:45; Ma et al., 1995:227; Pang et Mao, 1980(2):39; Xiao et Li, 1992:381; Yunn., 1987:614)
Calvia quinquedecimguttata (Fabricius, 1777:)
捕 食：雲南松、旱冬瓜、櫟樹上的蚜蟲
稻田麥長管蚜
甘蔗綿蚜
蚜蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、北京、新疆；日本、蘇聯(西伯利亞)、印度、歐洲。

Calvia shirozui (Miyatake) 臺灣裸瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:116)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Calvia sicardi (Mader) 鏈紋裸瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:473; Hun., 1992:410; Jing, 1992:554; Liu, 1963:47; 1965:47; Pang et Mao, 1980(2):39; Xiao et Li, 1992:381; Yunn., 1987:614)
Calvia sicardi (Mader, 1930:)

捕 食：蚜蟲。
分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、四川、陝西。

Calvia trilochana Kapur 三紋裸瓢蟲 (Jing, 1992:555)
Calvia trilochana Kapur, 1963:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；錫金。

Chilocorus alishanus Sasaji 阿里山唇瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:89; Ren et al., 1991:157)
Chilocorus alishanus Sasaji, 1968:
捕 食：*Unaspis yanonensis* (Kuwana) 矢尖蚧
盾蚧。
分 佈：臺灣、貴州、雲南。

Chilocorus bijugus Mulsant 二雙斑唇瓢蟲 (Hu et al., 1994, 10(1):41-42; Jiao, 1997, 19(2):59-61; Jing, 1992:566; Kuang et al., 1989:51-56; Pang et Mao, 1979:90; Ren et al., 1990:71-73; Ren et al., 1991:157; Ren et al., 1993:287-290; Xiao et Li, 1992:376; Yunn., 1987:604)
Chilocorus bijugus Mulsant, 1853:
=*Chilocorus renipustulatus*, Liu, 1963:
捕 食：*Eriosoma lanigerum* 蘋果綿蚜
Aspidiotus theae Tang 茶圓盾蚧
Aulacaspis rosae (Bouché) 薔薇白輪盾蚧
Chloropulvinaria aurantii (Cockerell) 橘綠綿蠟蚧
Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧
Ericerus pela 白蠟蟲
Insulaspis camelliae (Hoke) 茶長蠣蚧
Parlatoria pergandii Comstock 糠片蚧
Parlatoria zizyphus Lucas 黑點蚧
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti 桑盾蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧。
分 佈：貴州、雲南(麗江)、西藏、四川、湖北；印度。

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus) 雙斑唇瓢蟲 (ASZI et al., 1978:158; 1965:76; Pang et Mao, 1979:88)
Coccinella bipustulatus Linnaeus
捕 食：*Aphis laburni* Kaltenback 槐蚜
Eriosoma lanigerum 蚧
Icerya purchasi Maskell 吹綿蚧
桃球蚧
Ceroplastes sinensis Del Guercio 中國蠟蚧
Eulecanium corni Bouché 合歡蚧
Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧
Chionaspis salicis Linnaeus 楊柳蚧
Fiorinia fioriniae Targioni 松單蜕蚧

Lepidosaphes beckii (Newman) 紫牡蠣蚧
Lepidosaphes gloverii (Packard) 長牡蠣蚧。
分 佈：新疆；古北區。

Chilocorus chalybeatus Gorham 閃藍紅點唇瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:223; Hun., 1992:411; Li, 1994:231-233; Pang et Mao, 1979:84; Ren et al., 1991:157; Xiao et Li, 1992:376; Zhang, 1987[ed.] 2:18; Zou et Zhou, 1993:174-176)
Chilocorus chalybeatus Gorham, 1892:
捕 食：橘蚜
Ceroplastes rubens Maskell 紅蠟蚧
Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧
Aspitiotus destructor Signoret 椰圓蚧
Aulacaspis sassfras Chen 檫木白輪蚧
Kuwanaspis pseudoleucaspis (Kuwana) 毛竹擬白須盾蚧
Pseudaulacaspis cockerelli (Cooley) 考氏白盾蚧(獼猴桃)
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧
盾蚧科。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江。

Chilocorus chinensis Miyatake 中華唇瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:223; Li, et al., 1990:78; Pang et Mao, 1979: 81; Peng et al., 1997, 19(3):114; Xiao et Li, 1992:376; Yunn., 1987:603)
Chilocorus chinensis Miyatake, 1970:
=*Chilocorus rubidus,* Liu, 1963:
捕 食：茶綿蚧
蚧蟲
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、浙江；越南。

Chilocorus circumdatus (Gyllenhal) 細緣唇瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:461; ASZI et al., 1978:159; Huang, 1999[ed.]:189; Huang et Gao, 1996:161; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, 1991:223; Li et al., 1990:76; Liu, 1963:77; 1965:77; Pan et al., 1987:185; Pang et Mao, 1979:83; Peng et al., 1999:97; Yu et Pang, 1992:17; Yunn., 1987:603)
Coccinella circumdatus Gyllenhal, 1808:
Chilocorus circumdatus, Mulsant, 1850: Liu, 1963:
捕 食：*Ceroplastes floridensis* Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
Aonidiella orientalis (Newstead) 東方圓蚧
Aspidiotus destructor Signoret 椰圓蚧
Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧
Pseudaulacaspis pentagona (Targoni-Tozzetti) 桑盾蚧
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧(廣東)
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧
木瓜蚧。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、浙江；印度、斯里蘭卡、印尼(蘇門答臘)。

Chilocorus esakii Kamiya 異紅點唇瓢蟲 (Ma et al., 1995:226; Pang et Mao, 1979:85; Ren et al., 1991:157; Zou et Zhou, 1993:175)
Chilocorus esakii Kamiya, 1959:

捕 食：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑白蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧
盾蚧(獼猴桃園)。
分 佈：貴州、湖南、浙江、山東、河北、遼寧；日本(九州以南)。

Chilocorus geminus Zaslavskij 孿斑唇瓢蟲 (Ma et al., 1995:226; Pang et Mao, 1979:88)
Chilocorus geminus Zaslavskij, 1962:
捕 食：*Eulecanium kuwanai* (Kanda) 桃球蚧
盾蚧。
分 佈：浙江、甘肅；蘇聯。

Chilocorus gressitti Miyatake 黑背唇瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:461; Huang, 1990[ed.]:189; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, 1991:223; Jing, 1992:567; Li et al.,1990:77; Pang et Mao, 1979:84; Peng et al., 1997, 19(3):114; Peng et al., 1999:97; Yunn., 1987: 604)
Chilocorus gressitti Miyatake, 1970:
捕 食：*Ceroplastes floridensis* Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧
Aspidiotus destructor Signoret 椰圓蚧
盾蚧亞科一些種類。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南、四川；泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

Chilocorus hauseri Weise 閃藍唇瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:223; Liu, 1963:77; 1965:77; Pang et Mao, 1979:82; Ren et al., 1991:157; Yunn., 1987:603)
Chilocorus hauseri Weise, 1895:
捕 食：*Unaspis yanonensis* (Kuwana) 矢尖蚧
盾蚧。
分 佈：福建、廣東、海南、貴州、四川、雲南；緬甸、錫金。

Chilocorus hupehanus Miyatake 湖北紅點唇瓢蟲 (He et al., 1996(4):34; Hu et al., 1994, 10(1):41-42; Huang et Pang, 1991:223; Hun., 1992:412; Li, 1997:709; Pang et Mao, 1979:86; Ren et al., 1991:157; Xiao et Li, 1992:376; Zhang et al., 1993:171-174)
Chilocorus hupehanus Miyatake, 1970:
捕 食：*Eriococcus kaki* Kuwana 柿絨粉蚧
Chrysomphalus aonidium (Linnaeus) 褐圓蚧
Aspidiotus destructor Signoret 椰圓蚧
Aulacaspis crowii Cockerell 米蘭白輪蚧
Pseudaucaspis pentagona Targioni-Tozzett 桑盾蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢尖蚧
Diaspididae 盾蚧科。
分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、四川、湖北。

Chilocorus kuwanae Silvestri 紅點唇瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:462; ASZI et al., 1978:159; An et al., 1994:222; Chen et War 1987:298; Chen et al., 1993:117; Dai, 1992:42; Gao, 1989:137; Huang, 1990[ed.]:189; Huang et Gao, 1996:161, 236; Huang et Pang,

1991:223; Huang et al., 1988, 15(1):15-21; Hun., 1992:412; Jiang, 1981(1-2):94; Jing, 1992:567; Li, 1997:709; Liang, 1988:63-69; Liu, 1963:77; 1965:77; Liu et al., 1982:35; Pang et Mao, 1979:87; Ren et al., 1991:157; Shen et al., 1994:356; Shi et al., 1989-90:81, 82, 87; Su et al., 1986:36; Wang et al., 1990:140; Wu et al., 1989:28-30; Xia et al., 1985, 28(1):454-455; Xia et al., 1986, 2(2):70-74; Xia et al., 1987, 9(3):151-155; Xiao et Li, 1992:376; Yi et al., 1994:224; Yu et Pang, 1992:17; Yunn., 1987:604; Zhang, 1983:86-88; Zhang, 1987[ed.] 2:18; Zou et Zhou, 1993:175)

Chilocorus kuwanae Silvestri, 1909:

捕 食：*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) 黑刺粉虱
Dialeurodes citri Ashmead 柑橘粉虱
蚜蟲
Aonidiella cittina 黃腎圓盾蚧
Aspidiotus destructor Signoret 椰圓蚧
Aspidotus lataniae Signoret 茶圓蚧
Aulacaspis rosae (Bouché) 薔薇白輪蚧(刺梨 *Rosa roxburghii* Tratt)
Aulacaspis rosarum 月季白輪蚧
Ceroplastes ceriferus 角蠟蚧
Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧
Ceroplastes rubens 紅蠟蚧
Chionaspis saitamensis Kuwana 青棡齊盾蚧
Chloropulvinaria aureantii (Cockerell) 柑橘綿蚧
Chrysomphalus bifasciculatus 褐圓盾蚧
東方盔蚧
Chrysophalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧
Diaspidiotus peraiciosus 梨圓盾蚧
Didesmococcus koreeanus 朝鮮球堅蠟蚧
Dopholeucaspis japonica 梨長白蚧
Ericerus pela 白蠟蚧
Eriococcus lagestroemiae 百日紅球絨蚧
Eulecanium kuwanai (Kanda) 桃球蚧
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧(廣東)
Kuwanaspis pseudoleucaspis 竹長白蚧
Matsucoccus matsumurae 日本松幹蚧
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑片盾蚧
Parthenolecanium corni 水木堅蚧
Parthenolecanium orientalis Borchsenius 東方胎球蚧
Phenacaspis cockerelli 考氏白輪盾蚧
Pseudalaspis cokerelli (Cooly) 考氏白盾蚧(木蘭科各種花木)
Pseudaulacaspis pentagona (Targoni-Tozzetti) 桑白蚧
Pseudaonidia duplex 樟圓盾蚧
Pulvinaria aurantii 橘綿蠟蚧
Pulvinaria floccifera 茶綿蠟蚧
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) 梨圓蚧
Saissetia hemisphaerica 半球盔蚧

Sphaerolecanium prunastri 歐李圓球蚧
Takahashia japonica 桑紐蠟蚧
Unaspis yanonensis Kuwana 矢根蚧
Unaspis euonymi (Comstock) 衛矛矢尖蚧
Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧
夾竹桃圓蚧
擬褐圓蚧
桃球蚧
茶梨蚧
茶牡蠣蚧
紫牡蠣蚧
日本長白蚧
盾蚧科
已知可捕食 5 科 30 多種蚧蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、印度、意大利、美國引進(加福尼亞)。

寄生蜂：*Homalotylus falminus* Dalman 瓢蟲隱尾跳小蜂。

Chilocorus nigritus (Fabricius) 黑背唇瓢蟲 (Liu, 1963:78; 1965:78; Lo, 1997:62; Xiao et Li, 1992:376)

捕 食：*Aspidiotus destructor* Signoret 椰圓蚧
Coccus hesperidum Linnaeus 褐軟蚧
堅蚧蟲。

分 佈：臺灣(1939 自引進斯里蘭卡引進)、福建、貴州、雲南、四川；緬甸、印度。印尼(蘇門答臘)。

Chilocorus politus Mulsant 紅褐唇瓢蟲 (Jing, 1988:286; Liu, 1963:78; 1965:78; Yunn., 1987:603)

捕 食：蚧蟲。

分 佈：臺灣(1937 自印尼、斯里蘭卡引進)、雲南、西藏(墨脫)；馬來亞、印度。

Chilocorus renipustulatus (Scriba) 腎斑唇瓢蟲 (Liu, 1963:79; 1965:79)

捕 食：中國蠟蚧
桃堅蚧
楊柳蚧
Aspitiotus destructor Signoret 椰圓蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧
合歡蚧。

分 佈：雲南、江蘇；日本、古北區。

Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:461; ASZI et al., 1978:159; Chen, 1986:27; Chen et Wang, 1987:2 Chen et al., 1993:116; Hu et al., 1981(1-2):15-22; Huang et Gao, 1996:161, 236; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, 1991:22 Hun., 1992:411; Jing, 1988:286; 1992:567; Li, 1997:710；Liang, 1991:144; Liu, 1963:75; 1965:75; Liu, 1996, 22(5):26-27; Liu et al.,

1950:164-185; Pang et Mao, 1979:80; Peng et al., 1997, 19(3):115; Sun, 1985(1):18; Sun, 1986:102; Tan et al., 1997, 24(4):341-346; Wang, 1987:259-262; Wang, 1987[ed.]:364; Wang et al., 1987:176-178; Wang et al., 1989:97; Xiao et Li, 1992:376; Yi et al., 1994:224; Yunn., 1987:603; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Chilocorus rubidus Hope, 1831:

=*Coccinella tristis* Faldermann, 1835:

捕 食：甘蔗綿蚜
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
Ceroplastes japonicus Green 日本龜蠟蚧
Didesmococcus koreanus Borchs. 桃球蚧(朝鮮球蠟蚧)
Ericerus pela (Chavannes) 白蠟蟲
Rhodococcus sariuoni 沙里院蚧
Eulecanium orni Bouché 洋槐蚧
吹綿蚧
柿綿蚧
油茶綿蚧
東方盔蚧
杏球堅蚧
東方盔蚧
Metaceronema japonica (Maskell) 日本卷毛蚧(油茶刺綿蚧)
Kermes nawae Kuwana 板栗球蚧
Lecanium kunoensis Kuwana 桃球蚧
Lecanium prunastri Fonscolombe 杏蠟蚧
Parthenolecanium orientalis Borchsenius 東方胎球蚧
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti 桑盾蚧
球堅蚧
草履蚧
Rhopalosiphum prunifoliae (Fitch) 黍縊管蚜
蚜蟲類。

分 佈：福建、湖南、海南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、陝西、河南、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、西伯利亞、朝鮮、日本、印度、尼泊爾、印尼、澳洲。

Chilocorus rubidus tristis Falder 黑緣紅瓢蟲(三細亞種) (Wang, 1987, 14(4):159-262)

捕 食：*Metaceronema japonica* Masks 刺綿蚧(油茶上)。

分 佈：浙江。

Chilocorus rufitarsus (Motschulsky) 寬緣唇瓢蟲 (Huang et Gao, 1996:161, 236; Huang et Pang, 1991:224; Li et al., 1990:77; Liu, 1963:79; 1965:79; Pang et Mao, 1979:80; Yunn., 1987:603; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Chilocorus rufitarsus Mostschlsky, 1853:

捕 食：油茶綿蚜
蚜蟲
杏球蚧

茶綿蚧
黃檀堆蠟粉蚧
梨蚧
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、雲南、四川、浙江；越南。

Chilocorus yunlongensis Cao et Xiao 雲龍唇瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:117; Yunn., 1987:631)
Chilocorus yunlongensis Cao et Xiao, 1984:117.
捕 食：核桃上蚧蟲
分 佈：雲南。

Chilomenes quadriplagiata (Swartz) 四斑月瓢蟲 (ASZI et al., 1978:148; Liu, 1963:74; 1965:74; L9 et Chen, 1995:369; Ma et al., 1995:227; Sun et al., 1980(4):23)
捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨
Allococcus morrisoni Ezzat et McConnel 馬氏刺粉蚧(石栗)
桃蚜
麥蚜
菜蚜
橘蚜
松蚜。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川、浙江、東北；日本、印度。

Chilomenes sexmaculata (Fabricius) 六斑月唇瓢蟲 (ASZI et al., 1978:148; Liu, 1963:73; 1965: 73; Yu et Chen, 1998:41; Yu et Wang, 1999:154)
Chilomenes sexmaculata (Fabricius, 1781:)
別 名：*六條瓢蟲*。
捕 食：木蝨
麥蚜
桃蚜
煙蚜
豆蚜
菜蚜
豌豆蚜
麥二叉蚜
橘蚜
橘二叉蚜
(獼猴桃園)
蔗粉角蚜
蚧蟲。
分 佈：臺灣、福建、江,西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、陜西；南亞、東南亞、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、澳洲、密克羅尼西亞。

Clitostethus nigrifrons Yu 黑頭陡胸瓢蟲 (Yu, 1997:715)

Clitostethus nigrifrons Yu, 1997:715-716.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Clitostethus sternalis (Pang et Gordon) 腹毛陡胸瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):105; Peng et al., 1999:94)
Pseudoscymnus sternalis Pang et Gordon, 1986:
Clitostethus sternalis; Pang et Yu, 1991:
捕 食 性。
分 佈：海南、廣東。

Clitostethus sp. 壩王嶺陡胸瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):105)
Clitostethus sp., Peng et al., 1997, 19(3):105.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Clitostethus sp. 短葉陡胸瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):105)
Clitostethus sp., Peng et al., 1997, 19(3):105.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Coccidula rufa (Herbst) 紅背粗眼瓢蟲 (ASZI et al., 1978:162; Liu, 1963:93; 1965:93)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：新疆；亞洲、西伯利亞、歐洲。

Coccidula unicolor Reitter 純紅粗眼瓢蟲 (Liu, 1963:93; 1965:93)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：新疆；波斯、土耳其。

Coccinella ainu Lewis 十一星瓢蟲 (Li, 1997:699)
Coccinella ainu Lewis, 1896:
捕 食：桃蚜等。
分 佈：湖北、陝西、甘肅、新疆；亞洲、歐洲、非洲北部。

Coccinella divaricata Olivier 擬九斑瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:9; 1980(2):39)
捕 食 性。
分 佈：山東、北京、新疆、內蒙古；古北區。

Coccinella geminopunctata Liu 孿斑瓢蟲 (ASZI et al., 1978:154; Li, 1996:133; Liu, 1962:261; 1963:38; 1965:38; Zhang, 1998, 14(2):47)
Coccinella geminopunctata Liu, 1962:261.
捕 食：麥蚜
艾蒿蚜
蚜蟲。

分 佈：雲南、西藏、四川、湖北、陝西、河北、甘肅、新疆、內蒙古。

Coccinella lama Kapur 拱背瓢蟲 (Li, 1981:397; Pang et Mao, 1979:5; 1980(2):39)

捕 食：蚜蟲。
分 佈：西藏。

Coccinella longifasciata Liu 縱條瓢蟲 (Jing, 1988:282; 1992:546; Li, 1981:397; Liu, 1962:262; 1963:38; 1965: 38; Pang et Mao, 1980(2):39)

Coccinella longifasciata Liu, 1962:262.
=*Coccinella nigrovittata* Kapur
捕 食：蚜蟲。
分 佈：西藏(林芝)、四川、青海、甘肅、新疆。

Coccinella luteopicta Mulsant 褐綉花瓢蟲 (Jing, 1992:544)

Coccinella luteopicta Mulsant, 1866:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川；印度。

Coccinella magnopunctata Rybakow 大斑瓢蟲 (Jing, 1988:282; 1992:546; Pang et Mao, 1979:8; 1980 (2):39)

Coccinella magnopunctata Rybakow, 1889:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：西藏(波密、林芝)、四川；蒙古、印度、古北區。

Coccinella nigrovittata Kapur 黑條瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:12)

捕 食 性。
分 佈：西藏(芝林)。

Coccinella quatuordecimpustulata (Linnaeus) 雙七瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:470; ASZI et al., 1978:156; He et al., 1991: 107)

捕 食：稻田蚜蟲
麥蚜
艾蒿蚜
菜蚜。
分 佈：江西、四川、浙江、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、古北區。

Coccinella repanda Thunberg 狹臀瓢蟲 (ASZI et al., 1978:154; Chen, 1996, 18(1):20; Chiu et Lo, 1985:4; Huang, 1990[ed.]:197; Li, 1981:397; Liu, 1963:39; 1965:39; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:40)

捕 食：麥蚜
豆蚜
菜縊管蚜
Toxoptera citricidus 大橘蚜。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、西藏(樟木)；印度、印尼、澳洲、新西蘭

Coccinella sachalinenis Ohta 薩哈林瓢蟲 (Jing, 1987:312)

Coccinella sachalinennis Ohta, 1928:

捕 食 性。

分 佈：甘肅；庫頁島。

Coccinella saucerottii Mulsant 西藏瓢蟲 (Jing, 1992:546)

Coccinella saucerottii Mulsant, 1850:

=*Coccinella tibetina* Kapur

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川。

Coccinella sedakovi Mulsant 天山瓢蟲 (Pang et Mao, 1980(2):39)

Coccinella sedakovi Mulsant

=*Coccinella tianshanica* Dobrzhansky

捕 食 性。

分 佈：新疆。

Coccinella septempunctata Linnaeus 七星瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:471; ASZI et Honan, 1977:243-252; ASZI et al., 1978:155; Bai, 1994, 10(3):130; Beijing Normal Univ., Dept. Biol., 1975, (2):50-53; Cai et al., 1980(2):1-4; Cai et al., 1991, 11(2):97-103; Cao et Zhang, 1994, 16(1):1-5; Chen, 1986:27; Chen et Qin, 1982:141-146; Chen et Wang, 1987:197; Chen et al., 1980:141-148; Chen et al., 1984:136-146; Chen, et al., 1989:385-392; Chen et al., 1993:120; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Chen et al., 1999, 15(3):122; Chiu et Lo, 1985:4; Chou et al., 1981:185-192; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; Dong, 1984:91; Dong et al., 1982 4(2):38-40; Dong et al., 1992:219-222; Fan et al., 1989:193-195; 1990:158-163; Fu et Chen, 1982:335-338; 1984:268-274; Gao, 1990:90; Gong et al., 1980:252-259; 1982:9-15; Gong et al., 1982:175-181; Guan, 1087:1-6; Guan et Chen, 1982:239-243; 1983:368-374; 1986:10-15; Hao et al., 1990, 12(2):62-65; He et al., 1991:106; He et al., 1996(4):34; Jiamg, 1990[ed.]:196; Huang, 1981(3):19; Huang et Pang, 1991:226; Hun., 1992:410; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Jia et al., 1999, 21(4):160-163; Jing, 1988: 282; 1992:544; Kuang et al., 1989:51-56; Kung, 1963:236; Li, 1981(1-2):71; 84; Li, 1981: 397; Li, 1991:130-132; Li, 1997:698; Li et Li, 1991:118-124; Li et Wang, 1984:230; Li et al., 1981:47-54; Li et al., 1990:83; Li et al., 1994, 21(1):15-18; Liang et al., 1997, 24(3):193-198; Lin et Wu, 1990:355; 1994:131; Liu, 1963:37; 1965:37; Liu et Qin, 1986:188; Liu et Qin, 1987:138; Liu et Qin, 1989:92; Liu et Qin, 1994, 10(4):185; Lü et al., 1982:34-35; Ma et al., 1995:226; Miao et al., 1998, 20(1):24-29; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Nan et al., 1987:125; Pang et Mao, 1979:4; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-98; 1980(2):39; Qiu et al., 1981, 1:185-192; Ren et al., 1981:268-273; Shang et al., 1980(2):5-8; 1981(4):18-19; Shi et al., 1989-90:87; Shu et Yu, 1985:93; Sun et Wan, 1999, 15(4):169-173; Tan et al., 1997, 24(4):341-346; Wang et Li, 1986, 14(4):13-17; Wang et Wang, 1987:190-193; Wang et al., 196:370; Wang et al., 1977:397-404; Wang et al., 1989:97; Wang et al., 1991:79-81; Wu et Guan, 1981:127-134; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et Lin, 1987:163-164; Wu et Wang, 1990:138-141; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:102; Xi, 1985:204-207; Xiao et Li, 1992:380; Xiao et al., 1991:121, 130; Xie et Sterling, 1987, 14(3):154; Yan, 1988:83-84; Yan et al., 1980(2):9-19; Yan et al., 1982:135-140; 1983:100-103; 1987:146-151; Yu et Chen, 1998:41; Yu et Wang, 1999:94; Yunn., 1987:615; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhai et Zhang, 1987:121-125; Zhai et al., 1985:362-368; Zhai et Zhang, 1984:361-367; Zhang, 1987[ed.] 2:16; Zhang, 1993, 19(5):53; Zhang et Feng, 1983:97-99; Zhang et Sun, 1989:139-141; Zhang et Zhai, 1985:121-128; Zhang et al., 1996(4):14; Zhang et al., 1997, 13(2):96; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zhu, 1982 4(3):32-37; Zhu, 1993, 15(3):116-123; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zhu et Li, 1981(1-2):66-69; Zhu et al., 1980(2):65; Zhu et al., 1993:116-123; Zong et al., 1984:248; Zou et Zhou, 1993:175; Zong et al., 1986:118)

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758:

捕 食：梨木蝨

桑木蝨

松蚜

Aphis gossypii Glover 棉蚜

稻蚜

Macrosiphum avenae Fabricius 麥長管蚜
Toxoptpera graminum Rondani 麥二叉蚜
Rhopalosiphum padi Linnaeus 粟縊管蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜(Wang et al., 1963:38)
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米蚜
Melanaphis sacchari (Zehntner) 高粱蚜
Hyadaphis erysimi pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Aphis laburni Kaltenback 槐蚜
桃粉大尾蚜
松蚜
樟蚜
楊蚜
菜蚜
Pentalonia nigrovervosa Coq. 香蕉蚜
蚜蟲類
稻飛蝨
Podonia tutea Olivier 漆跳甲
木麻黃毒蛾
Trichiocampus cannabis Xiao et Huang 大麻毛怪葉蜂
Nematus hequensis Xiao 河曲絲葉蜂
(獼猴桃園)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲、古北區(非洲薩哈拉沙漠以北至日本)、印度、東南亞、新西蘭、北美(引進)。

Coccinella tianshanica Dobrzhansky 天山瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:7)

捕 食 性。

分 佈：新疆(哈密及天山南北)。

Coccinella tibetina Kapur 西藏瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:6; 1980(2):39)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川。

Coccinella transversalis Fabricius 狹臀瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:472; He et al., 1991:106; Huang et Pang, 1991:226; Li et a 1990:84; Luo et Zhuo, 1986:75; Pang et Mao, 1979:11; 1980(2):39; Peng et al., 1997, 19(3):123; Yu et Pang, 1992:13; Yu et Wang, 1999:98; Yunn. 1987:616; Zhang et Xu, 1991:175-177; Zhang et al., 1991, 13(4):175-177)

Coccinella transversalis Fabricius, 1781; Liu, 1963:
Coccinella repanda Thunberg, 1781; Liu, 1963:
別 名：*橫斑瓢蟲，波紋瓢蟲*。

捕 食：合歡異木蝨
棉蚜
稻蚜
麥蚜
豆蚜
桃蚜
菜蚜
菜縊管蚜
橘二叉蚜
高粱蚜
甘蔗黃蚜
甘蔗綿蚜
粉蚧
蔗白輪盾蚧
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、貴州、陝西、河北、黑龍江；越南、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲、新西蘭。

Coccinella transversoguttata Faldermann 橫斑瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:472; ASZI et al.,1978:155; He et al., 1991:106; Jing, 1988:282; 1992:545; Li, 1981:397; Liu, 1963:39; 1965:39; Pang et Mao, 1979:7; Xiao et Li, 1992:380; Yunn.1987:615; Zhang, 1997, 19(4):156-160; Zong et al., 1984:248)
Coccinella transversoguttata Faldermann, 1835:
=*Coccinella geminopunctata* Liu
捕 食：稻蚜
Macrosiphum avenae 麥長管蚜
豆蚜
菜蚜
艾蒿蚜
稻飛蝨
花粉、花藥。
分 佈：江西、雲南、西藏、四川、湖北、陝西、山東、山西、北京、河北、青海、甘肅、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、西伯利亞、中亞、歐洲、北美、墨西哥。

Coccinella trifasciata Linnaeus 橫帶瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:472; ASZI et al., 1978:155; Li, 1981:397; Jing, 1992:545; Liu, 1963:40; 1965:40; Pang et Mao, 1979:11; 1980(2):39)
Coccinella trifasciata Linnaeus, 1758:
捕 食：麥蚜
柳蚜
艾蒿蚜。
分 佈：西藏、四川、陝西、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江、東北；蒙古、西伯利亞、北美洲西岸。

Coccinella undecimpunctata Linnaeus 十一星瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:473; ASZI et al., 1978:156; He et al., 1991:107; Kuang et al., 1989:51-56; Li, 1996:133; Liu, 1963:40; 1965:40; Pang et Mao, 1979:10; Xiao et Li, 1992:380)

Coccinella undecimpunctata Linnaeus

捕 食：*Eriosoma lanigerum* Hallsm 蘋果綿蚜
麥蚜
棉蚜
艾蒿蚜
稻田蚜蟲。

分 佈：貴州、雲南、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、新疆；亞洲、歐洲、北非。

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus) 雙七瓢蟲 (Liu, 1963:41; 1965:41; Pang et Mao, 1980(2):39)

捕 食：蚜蟲。

分 佈：北京、新疆、遼寧、黑龍江；日本、古北區。

Coelophora approximans Crotch 四眼盤瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:228; Liu, 1963:65; 1965:65)

捕 食：稻飛蝨
菜蚜
蚜蟲
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧。

分 佈：福建、廣東。

Coelophora biplagiata (Swartz) 雙帶盤瓢蟲 (ASZI et al., 1978:149; Deng et al., 1987:166-168; Li, 1981:398; Liu, 1963:65; 1965:65; Lo et Chen, 1995:369; Yu et Chen, 1998:40; Zhang et al., 1991:121-127)

別 名：*錨紋瓢蟲*。

捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨
Ceratovacuna lanigera 甘蔗綿蚜
菜蚜
麥蚜
竹蚜
桃蚜
橘蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
蘋果蚜
柳蚜。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、浙江；朝鮮、日本、越南、馬來西亞、印尼。

Coelophora bissellata Mulsant 十斑盤瓢蟲 (ASZI et al., 1978:149; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Liu, 1963:66; 1965:66

捕 食：蚜蟲

Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)。
分 佈：雲南；朝鮮、菲律賓、印尼、印度。

Coelophora chinensis Weise 粗網盤瓢蟲 (ASZI et al., 1978:149; Chiu et Lo, 1985:4; Liu, 1963:67; 1965:67)
捕 食：*Toxoptera citricidus* 大橘蚜
蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、浙江、上海、山東。

Coelophora circumusta Mulsant 紅基盤瓢蟲 (Liu, 1963:67; 1965:67; Wei et al., 1995:59-63)
捕 食：蚜蟲
Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木虱
Pseudophacopteron conarium Yang et Li 橄欖星室木虱。
分 佈：臺灣、福建、貴州、華南；印度。

Coelophora congener (Schoenherr) 紅星盤瓢蟲 (Liu, 1963:68; 1965:68)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：福建、廣東；印度。

Coelophora decimmaculata Jing 雙五腔瓢蟲 (Jing, 1992:541)
Coelophora decimmaculata Jing, 1992:541-542.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Coelophora korschefskyi Mader 八室盤瓢蟲 (Liu, 1963:68; 1965:68)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南、四川。

Coelophora pupillata (Swartz) 十眼盤瓢蟲 (Liu, 1963:69; 1965:69)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：廣東、雲南；印度、印尼(爪哇)。

Coelophora saucia Mulsnat 黃斑盤瓢蟲 (ASZI et al., 1978:149; Dai, 1990;113-115; Liu, 1963:69; 1965:69; Lu et al., 1986:63; Su et al., 1986:36; Wang, 1987[ed.]:364; Xie et al., 1999, 21(2):84; Zeng, 1995, 11(2):90)
捕 食：梨木蝨
Aphis bambusae Fullaway 竹紅蚜(竹)
Bravicoryne brassicae Linnaeus 菜蚜(甘藍蚜)
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Myzys persicae 桃蚜
Rhopalosiphum nymphaeae Linnaeus 蓮縊管蚜
蘋果蚜
大豆蚜
洋槐蚜

蚜蟲
Ericerus pela (Chavannes) 白蠟蟲
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、山東；菲律賓、印度

Coelophora sexareata Mulsant 細網盤瓢蟲 (Liu, 1963:70; 1965:70)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南；緬甸、印度、印尼(爪哇)。

Cryptognatha nodiceps (Lo, 1997:62)
捕 食：*Aspidiotus destructor* 椰子蚧。
分 佈：臺灣(1926 自千里達引進)；千里達。

Cryptogonus angusticarinatus Sasaji 窄背隱勢瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):113)
Cryptogonus angusticarinatus Sasaji, 1968:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、海南；越南。

Cryptogonus bimaculatus Kapur 二斑隱勢瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:346; Yunn., 1987:625)
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸、印度。

Cryptogonus blandus Mader 黃滑瓢蟲 (Liu, 1963:84; 1965:84)
捕 食：蚜蟲
蚧蟲。
分 佈：雲南。

Cryptogonus complexus Kapur 複合隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:65; Yunn., 1987:624)
Cryptogonus complexus Kapur, 1948:
捕 食 性。
分 佈：雲南；緬甸、印度。

Cryptogonus forficulae Cao et Xiao 鋏葉隱勢瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:120; Yunn., 1987:631)
Cryptogonus forficulae Cao et Xiao, 1984:120.
捕 食：榕樹上的蚜蟲。
分 佈：雲南。

Cryptogonus guangdongiensis Pang et Mao 廣東隱勢瓢蟲 (Li et al., 1990:83; Pang et Mao, 1979: 67; Peng et al., 1997, 19(3):113; Peng et al., 1999:96)
Cryptogonus guangdongiensis Pang et Mao, 1979:67.
捕 食：橘蚜
豆蚜
鬼針蚜。

分 佈：江西、廣東、海南、廣西。

Cryptogonus hainanensis Pang et Mao 海南隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:65; Peng et al., 1997, 19(3):113)

Cryptogonus hainanensis Pang et Mao, 1979:65.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Cryptogonus himalayensis Kapur 喜馬拉雅隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:64; Yunn., 1987:624)

Cryptogonus himalayensis Kapur, 1948:
捕 食：竹蚜
分 佈：雲南；緬甸、錫金。

Cryptogonus horishanus (Ohta) 臺灣隱勢瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:223; Pang et Mao, 1979:62; Yu, 1997:727; Xiao et Li, 1992:373; Yu et Pang, 1992:17; Zhang, 1987[ed.] 2:19)

Scymnus horishanus Ohta, 1929:
=*Pseudaspidimerus japonicus* Nakane et Araki, 1958:
Cryptogonus horishanus, Sasaji, 1968:
捕 食：棉蚜
桃蚜
橘蚜。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、四川、浙江、湖北；日本。

Cryptogonus kurosawai Sasaji 黑澤隱勢瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:78)

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Cryptogonus lijiangiensis Pang et Mao 麗江隱勢瓢蟲 (Jing, 11992:567; Pang et Mao, 1979:66)

Cryptogonus lijiangiensis Pang et Mao, 1979:66.
捕 食：核桃蚜。
分 佈：雲南(麗江)、湖北、陝西。

Cryptogonus lobulus Xiao 裂葉隱勢瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:374)

Cryptogonus lobulus Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:374.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Cryptogonus nepalensis Bielawski 尼泊爾隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:69; Yunn. 1987:624)

Cryptogonus nepalensis Bielawski, 1972:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏；尼泊爾。

Cryptogonus nigritus Pang et Mao 黑背隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:61)

Cryptogonus nigritus Pang et Mao, 1979:61.
捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Cryptogonus octoguttatus Mader 八斑隱勢瓢蟲 (Jing, 1992:568; Pang et Mao, 1979:68)

Cryptogonus octoguttatus Mader, 1954:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川。

Cryptogonus ohtai Sasaji 太田隱勢瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:80)

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Cryptogonus orbiculus (Gyllenhal) 變斑隱勢瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:460; ASZI et al., 1978:141; Huang et Gao, 1996:167; Huang et Pang, 1991:223; Hun., 1992:416; Li et al., 1990:82; Pang et Mao, 1979:59; Peng et al., 1997, 19(3):113; Xiao et Li, 1992:373; Yu, 1997:726; Yu et Wang, 1999:82; Yunn., 1987:624; Zhang, 1987[ed.] 2:19)

Coccinella orbiculus Gyllenhal, 1808:

Gryptogonus orbiculus, Kapur, 1948:

=*Platynaspis oculata* Motschulsky, 1858:

=*Cryptogonus centrogutiatus* Boheman, 1859:

=*Cryptogonus malasiae* Crotch, 1874:

=*Cryptogonus orbiculus* var. *centroguttatis*; Weise, 1900:

=*Cryptogonus orbiculus* ab. *japonicus* Weise, 1908:

捕 食：菜縊管蚜

橘蚜

豆蚜

蚜蟲

蚧蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西；日本、南亞、東南亞、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、印尼、密克羅尼西亞、馬利亞納群島。

Cryptogonus postmedialis Kapur 臀斑隱勢瓢蟲 (ASZI et al., 1978:142; Huang et Pang, 1991:223; Pang et Mao, 1979:60; Peng et al., 1997, 19(3):113)

Cryptogonus postmedialis Kapur, 1948:

捕 食：蚜蟲。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、四川；越南、緬甸、印度、錫金。

Cryptogonus qianjiangeensis Xiao 黔江隱勢瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:374)

Cryptogonus qianjiangeensis Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:374-375.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Cryptogonus quadriguttatus (Weise) 四斑隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:67)

Aspidimerus quadriguttatus Weise, 1895:

Cryptogonus quadriguttatus, Weise, 1900:

捕 食 性。
分 佈：雲南；印度(阿薩姆)、錫金。

Cryptogonus sagittiformis Pang et Mao 矢端隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:63)
Cryptogonus sagittiformis Pang et Mao, 1979:63.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Cryptogonus schraiki Mader 七斑隱勢瓢蟲 (Jing, 1992:568; Pang et Mao, 1979:69; Xiao et Li, 1992:373; Yunn., 1987:624)
Cryptogonus schraiki Mader, 1954:
捕 食：蚜蟲
蚧蟲。
分 佈：雲南、四川、湖北。

Cryptogonus trifurcatus Pang et Mao 叉端隱勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:62; Yunn., 1987:624)
Cryptogonus trifurcatus Pang et Mao, 1979:62.
捕 食：榕蚜。
分 佈：雲南。

Cryptogonus trioblitus (Gorham) 射鵠隱勢瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:460; Liu, 1963:84; 1965:84; Pang et Mao, 1979:70; Yunn., 1987:625)
Aspidimerus trioblitus Gorham, 1895:
Cryptogonus trioblitus, Kapur, 1948:
捕 食：蚜蟲
分 佈：雲南；緬甸、印度(阿薩姆)。

Cryptogonus wuzhishanus Pang et Mao 五指山勢瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:59; Peng et al., 1997, 19(3):113; Peng et al., 1999:96)
Cryptogonus wuzhishanus Pang et Mao, 1979:59.
捕 食 性。
分 佈：海南(五指山)、陝西、山西。

Cryptogonus xiushanensis Xiao 秀山隱勢瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:373)
Cryptogonus xiushanensis Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:373-374.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Cryptogonus yunnanensis Cao et Xiao 雲南隱勢瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:121; Yunn., 1987:632)
Cryptogonus yunnanensis Cao et Xiao, 1984:121.
捕 食：榕樹上蚜蟲。
分 佈：雲南。

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 隱唇孟氏瓢蟲 (ASZI et al., 1978:136; Chen et al., 1994:59; Chen et al., 1999,

15(3):122; Chiu et Lo, 1985:4; Dong, 1993, 9(1):12-14; He, 1995, 21(2):47-48; Huang, 1963, 7(3):124-126; Huang, 1990[ed.]:190; Huang et Gao, 1996:150; Huang et Pang, 1991:222; Huang et al., 1986:155-161; Hwang et al., 1986, 28(2):155-161; Li, 1991:61-66; Li, 1993, 15(3):142-150; Li et al., 1994: ; Liu, 1963:85; 1965:85; Lo, 1997:58; Lo et Tao, 1966:53; Lo et Wu, 1989:181; Lu, 1996, 22(6):44; Lu et Wu, 1991:104; Pang 1996, 18(4)(Suppl.):32; Pang et Li, 1979, 1(3):50; Pang et Mao, 1979:51; Pang et al., 1996, 18(2):64-66; Pu, 1957, (1):61-63; Pu, 1961,:1338-1347; Pu, 1987:60; Pu et al., 1957, (1):61-63; Su et al., 1986:37; Tang et Pang, 1995, 17(1):9-12; Tang et al., 1995, 17(1):9-12; Tang et al., 1995(4):168; Yu et Pang, 1992:15; Yu et Wang, 1999:60)

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853:

別 名：*孟氏隱唇瓢蟲，蒙氏瓢蟲*。

捕 食：*Allococcus morrisoni* Ezzat et McConnel　馬氏刺粉蚧
Nipaecoccus filamentosus　球粉蚧
Oracella acuta (Lobdell)　濕地松粉蚧
Parasaissetia nigra (Nietner)　烏副盔蚧
Planococcus citri Risso　橘粉蚧
Pseudococcus gahani Green　柑橘粉蚧
Pseudococcus citriculus Green　橘小粉蚧
Pseudococcus comstocki　康氏粉蚧(君子蘭上 *Clivia miniata*)
Pseudococcus adonidum Linnaeus　長尾粉蚧
Pseudococcus maritimus Ehr.　葡萄粉蚧
Pseudococcus sp.　可可粉蚧
Pulvinaria aurantii Cockerell　茸綿蚧。

分 佈：臺灣(1909 年輸入)、福建、廣東、北方溫室；原分佈于印度至澳洲，泰國，引進北美、夏威夷及西印度群島，1955 引入廣州，散釋于廣東、福建。

附 註：國外引進種類。

Delphastus pusillus (LeConte) 粉虱小黑瓢蟲 (Huang, 1997:121)

捕 食：粉蝨(重要捕食天敵)。

分 佈：福建(黃 建于 1996 年由英國引進)；中美(原產)。

Diomus brachysiphonius Pang et Gordon 短管基瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222; Pang et Huang, 1986:60; Yu, 1997:719)

Diomus brachysiphonius Pang et Gordon, 1986:60.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建(邵武)、廣東、海南、四川、浙江、陝西、北京。

Diomus brunsuturalis Pang et Gordon 褐縫基瓢蟲 (Pang et Huang, 1986:59; Peng et al., 1997, 19(3):105)

Diomus brunsuturalis Pang et Gordon, 1986:

=*Diomus bxachysiphonius* Pang et Huangk 1986:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、四川、浙江、陝西、北京；越南。

Diomus sp. (Yu et Pang, 1992:15)

Diomus sp. Yu et Pang, 1992:15.

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Eoadalia indica (Grateh) 印度始瓢蟲 (Jing, 1985:426)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川；印度。

Exochomus (s. str.) **flavipes** (Thunberg) 黃足光瓢蟲 (Liu, 1965:80; Pang et Mao, 1979:75)

Coccinella flavipes Thunberg, 1781:

Exochomus flavipes, Liu, 1963:

捕 食：蚧蟲

蚜蟲

分 佈：新疆；古北區、非洲、澳洲。

Exochomus (Anexochomus) mongol Barovsky 蒙古光瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:461; ASZI et al., 1978: 159; Liu, 1963:79; 1965:79; Pang et Mao, 1979:77)

捕 食：松幹蚧。

分 佈：山東、河北、北京、遼寧；朝鮮、蒙古。

Exochomus nigromarginatus Miyatake 黑緣光瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Jing, 1992:568; Pang et Mao, 1979:76; Yunn., 1987:602; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Exochomus (*Xanthocorus*) *nigromarginatus* Miyakake, 1970:

捕 食：蚧蟲。

分 佈：福建、江西、雲南、四川、浙江。

Halyzia hauseri Mader 白條菌瓢蟲 (Kuang et al., 1989:51-56; Li, 1997:704; Liu, 1963:52; 1965:52)

Halyzia hauseri Mader, 1930:

捕 食：蘋果白粉菌

Eriosoma lanigerum 蘋果綿蚜

Adelges sp. 球蚜

分 佈：雲南、四川、湖北、陝西。

Halyzia maculata Jing 點斑菌瓢蟲 (Jing, 1987:201; 1988:283; 1992:548)

Halyzia maculata Jing, 1987:201.

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(墨脫)。

Halyzia sauscrita Muslant 梵文菌瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Jing, 1987:201; 1988:283; 1992:549; Li, 1997:703; Liu, 1963:52; 1965:52; Ma et al., 1995:227; Pang et Mao, 1980(2):36; Xiao et Li, 1992:383; Yu et Wang, 1999:162; Zou et Zhou, 1993:175; Zhang, 1987[ed.] 2:16)

Halyzia sauscrita Muslant, 1850:

取 食：白粉菌

蘋果白粉菌的菌絲及孢子

核桃樹白粉病

(獼猴桃園)。

分 佈：臺灣、福建(武夷山)、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏(波密)、四川、

浙江、湖北、陝西、河北、甘肅；印度、尼泊爾、也門。

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus) 十六斑菌瓢蟲 (Jing, 1987:201)

取 食：

分 佈：中國。

Halyzia shirozui Sasaji 臺灣菌瓢蟲 (Jing, 1987:201; Yu et Wang, 1999:160)

Halyzia shirozui Sasaji, 1982:

取 食：真菌

分 佈：臺灣。

Halyzia straminea (Hope) 草黃菌瓢蟲 (Jing, 1987:201; 1992:549; Liu, 1963:53; 1965:53; Pang et Mao, 1980(2):36)

Halyzia straminea (Hope, 1831:)

捕 食：真菌類

分 佈：雲南、西藏；印度、錫金、尼泊爾。

Harmonia (Ptychanatis) axyridis (Pallas) 異色瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:466; ASZI et al., 1978::151; Bai, 1994, 10(3):130; Chen, 1986, 4(1,2):27, 28; Chen et Wang, 1987:297; Chen et al., 1993:118; Chen et al., 1999, 15(3):122; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; Dong, 1988, 6(1,2):12-13; Fan et Yang, 1983:94-96; Fan et al., 1983, 5(2):94-96; Gao, 1990:90; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; He et al., 1991:107; He et al., 1996(4):34; Huang, 1990[ed.]:196; Huang, 1981(3):19; Huang et Gao, 1996:166; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, 1991:226; Hun., 1992:414; Hu et al., 1989:164-168; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Jing, 1992:551; Kuar et al., 1989:51-56; Lei et Chen, 1987:213-216; Lei et al., 198916(1):21-25; Li, 1981(1-2):70; Li et Wang, 1984:230; Li et al., 1979, 16(4):155; Li et al., 1993:438-443; Li et al.,:96; Liu, 1963:59, 711-712; 1965:59; 1964:295-296; 1965:106; Liu et Qin, 1989:92; Lo et Chen, 1995:369; Luo, 1965, 14(6):610-612; Luo, 1987, 9(2):84-87; Ma et al., 1995:226; Miao et al., 1998, 20(1):24-29; Pang et Mao, 1980(2):37; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-98; Peng et al., 1997, 19(3):118; Qian et al., 1981(1-2):80; Shang et Hu, 1981(1-2):30-31; Sh et al., 1992:273-278; Shi et al., 1989-90:81, 87; Shu et Yu, 1985:93; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1999, 21(4):1-5; Wang. 1982:33; Wang, 1982 4(4):37-39; Wang, 1986:104; Wang, 1987[ed.]:364; Wang et al., 1960:370; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et al., 1987, (3):16-18; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:102; Xiao, 1985(2):29; Xiao et Li, 1992:381; Xiao et al., 1991:120, 121; Xu et Wu, 1989:117-119; Ying et al., 1981:223-227; Yu et Wang, 1999:128; Yunn., 1987:609; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:17; Zhang et al., 1993(3):46-47; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zou et Zhou, 1993:175; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zhu et al., 1996(4):14-17; Zong et a 1984:248; Zong et al., 1986:118)

Coccinella axyridis Pallas, 1773:

Coccinella bissex-notata Herbst, 1793:

Coccinella 19-signata Faldermann, 1835:

Coccinella aulica Faldermann, 1835:

Coccinella spectabilis Faldermann, 1835:

Coccinella conspicua Faldermann, 1835:

Coccinella succinea Hope, 1845:

Anatis circe Mulsant, 1850:

Coccinella (Harmonia) axyridis; Weise, 1885:

Harmonia axyridis Pallas; Jacobson, 1915:

Ptychanatis yedoensis Takizawa, 1917:

捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨

梨木虱

粉蝨

稻葉蟬

Nilaparvata luges (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth)　白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén)　斑飛蝨
Cinara pinea Mordwiko　松蚜(馬尾松、油松、赤松、黑松)
Cinara sp.　落葉松大蚜
稻蚜
Macrosiphum avenae　麥長管蚜
Schizaphis graminum　麥二叉蚜
Eriosoma lanigerum　蘋果綿蚜
Hyadaphis erysimi pseudobrassicae (Davis)　菜縊管蚜
橘蚜
Aphis craccivora Koch　豆蚜
Aphis glycines Matsumura　大豆蚜(Wang et al., 1963:38)
Aphis gossypii Glover　棉蚜
Aphis sacchari Zehntner　高粱蚜
菜縊管蚜
Pineus sp.　紅松球蚜
桃粉大尾蚜
甘蔗蚜
瘤蚜
苜蓿蚜
Rhopalosiphum padi (Linnaeus)　桃粉蚜禾谷縊管蚜)
Rhopalosiphum prunifoliae　小米蚜
Sinomegoura citricola (van der Goot)　樟修尾蚜
棗蚜
蚜蟲類
粉蚧
Ceroplastes floridensis Comstock　龜蠟蚧(橡膠)
Ericerus pela (Chavannes)　白蠟蟲
日本松幹蚧
Matsucoccus massonianae Young　馬尾松幹蚧
Nesticoccus sinensis　竹巢粉蚧
Rhizococcus transversus Green　竹皺絨蚧
Podontia tutea Olivier　漆跳甲
Ambrostoma quadrimprassum Motschulsky　榆紫葉甲(卵)
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟(初孵幼蟲)
Helicoverpa armigera (Hübner)　棉鈴蟲(卵、幼蟲)
Hyphantia cunea (Drury)　美國白蛾(卵)
Trichiocampus cannabis Xiao et Huang　大麻毛怪葉蜂
葉蟎
(獼猴桃園)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江

蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯(西伯利亞)、越南、印度、法國和美國(引進)。

Harmonia (Leis) dimidiata (Fabricius) 紅肩瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:467; He et al., 1991:107; Huang, 1990[ed.]:195; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, 1991:226; Jing, 1988:285; 1992:552; Li et al., 1990:97; Liu, 1963:60; 1965:60; Pang et Mao, 1980(2):37; Xiao et Li, 1992:381; Yu et Pang, 1992:14; Yu et Wang, 1999:120; Yunn., 1987:609; Zhang, 1987[ed.] 2:17)

Leis dimidiata Fabricius, 1781:
=*Leis dimidiata* ab. *humeralis* Weise, Liu, 1963:
=*Leis dimidiata* ab. *sicarai* Mader, Liu, 1963:

別 名：*小十三星瓢蟲*。

捕 食：稻蚜
麥蚜
僞菜蚜
豆蚜
綉線菊蚜
Neophyllaphis podocarpi Takahashi 羅漢松蚜
粉蝨
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、河南；日本、越南、印度、尼泊爾、印尼、美國(引進)。

Harmonia dimidiata ab.**sicardi** Mader 紅肩瓢蟲豹紋變型 (ASZI et al., 1978:152; Hun., 1992:414)

捕 食：粉蝨
麥蚜
豆蚜
蚜蟲類。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、雲南、四川、浙江；日本、尼泊爾。

Harmonia eucharis (Mulsant) 奇斑瓢蟲 (He et al., 1991:107; Jing, 1988:285; 1992:551; Pang, 1984:145; Pang et Mao, 1980(2):37; Yunn., 1987:611)

Ballia eucharis Mulsant, 1853:
=*Ballia christophori* Mulsant, 1853:
=*Ballia dianae* Mulsant, 1853:
=*Ballia brahmae* Mulsant, 1853:
=*Ballia gustavi* Mulsant, 1853:
=*Ballia moutivaga* Mulsant, 1853:
=*Ballia testacea* Mulsant, 1853:
=*Pelina mayeti* Mulsant, 1866:
=*Ballia zephirinae* Mulsant, 1866:
=*Neda bayaderae* Mulsant, 1866:
=*Halyzia roubali* Mader, 1931:
=*Ballia korschefskyi* Mader, 1931:
=*Ballia korschefskyi* Mader, Liu, 1963:
=*Ballia dianae* Mulsant, Liu, 1963:
=*Ballia zephirinae* Mulsant, Liu, 1963:

=*Ballia eucharis* Mulsant ab. *mayeti* Mulsant, Liu, 1963:
捕 食：雲南松、華山松、雲南油杉上的蚜蟲。
分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、西藏(波密)、四川、山東、北京、黑龍江；日本、印度。

Harmonia obscurosignata (Liu) 隱斑瓢蟲 (Pang et Mao, 1980(2) 37; Xu et Wu, 1989:117-119)
Ballia obscurosignata Liu, 1862:
捕 食：*Nesticoccus sinensis* 竹巢粉蚧
Rhizococcus transversus Green 竹皺絨蚧。
分 佈：江蘇。

Harmonia octomaculata (Fabricius) 八斑和瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:468; He et al., 1991:107; Huang, 1990[ed.]:197; Huang et Pang, 1991:226; Hun., 1992:414; Li et al., 1990:94; Luo et Zhuo, 1986:75; Ma et al., 1995:227; Pang et Mao, 1980(2):37; Peng et al., 1997, 19(3):118; Xiao et Li, 1992:381; Yu et Wang, 1999:122; Yunn., 1987:609; Zhang, 1987[ed.] 2:17)
Coccinella octomaculata Fabricius, 1781:
=*Coccinella arcllata* Fabricius, 1787:
Harmonia octomaculata; Mader, 1926:
Synharmonia octomaculat Fabricius; Liu, 1963:
=*Harmonia aracuata*; Chapin, 1965:
別 名：*八條瓢蟲*。
棲 息：稻田、柑橘、黃花菜。
捕 食：稻薊馬
合歡異木蝨
棉蚜
麥蚜
豆蚜
菜蚜
高粱蚜
蔗粉角蚜
黑尾葉蟬
白翅葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
綿蚧屬
粉蚧屬
球蚧屬
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(初孵幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、印尼、新幾內亞、澳洲、密克羅尼西亞。

Harmonia sedecimnotata (Fabricius) 纖麗瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:467; He et al., 1991:107; Huang et Li, 1993, 16(2):18;

Huang et Pang, 1991:226; Li et al., 1990:95; Pang et Mao, 1980(2):37; Peng et al., 1997, 19(3):119; Sun et al., 1980(4):23; Yu et Wang, 1999:124; Yunn., 1987:611; Zhang, 1987[ed.] 2:17)

Coccinella sedeciimnotata Fabricius, 1801:
=*Daulis girini* Mulsant, 1866:
Harmonia sedecimnotata; Timberlake, 1943:
Callineda sedecimnotata Fabricius, Liu, 1963

棲 息：農田、柑橘、番石榴

捕 食：螺旋粉蝨
稻蚜
綿蚧
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
Unaspis yanonensis Kuwana 矢尖蚧
牡蠣蚧。

分 佈：臺灣、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、山東；菲律賓、越南、馬來西亞、印尼。

Harmonia trilochana (Kapur) 三斑和瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:345)

捕 食：松樹及小麥上蚜蟲。

分 佈：雲南；錫金。

Harmonia yedoensis (Takizawa) 隱斑瓢蟲 (He et al., 1991:108; Huang et Pang, 1991:226; Hun., 1992:413; Jing, 1992:552; Li et al., 1990:95; Pang, 1984:147; Tang et al., 1995, 17(4):168; Xiao et Li, 1992:381; Yu et Pang, 1992:14; Yu et Wang, 1999:126; Zhang, 1987[ed.] 2:17)

Ptychanatis yedoensis Takizawa, 1962:
=*Ballia obscurosignata* Liu, 1963:

棲 息：農作物、果樹、林木

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
松蚜
稻蚜
蚜蟲
日本松幹蚧
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、河北、北京、吉林；朝鮮、日本、越南。

Hippodamia (Asemiadalia) potanini (Weise) 角異瓢蟲 (Li, 1997:698)

Hippodamia potanini (Weise, 1889:)

捕 食：蚜蟲。

分 佈：四川、湖北、陝西。

Hippodamia (s. str.) **tredecimpunctata** (Linnaeus) 十三星瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:462; ASZI et al., 1978:145; D

et Zu, 1997, 19(2):49-54; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; He et al., 1991:108; Li, 1981(1-2):84; Liu, 1963:33; 1965:33; Pang et Mao, 1980(2):36; Wang et al., 1960:371)

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
稻蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Aphis laburni Kaltenbach 槐蚜
Aphis glycines Mutsumura 大豆蚜(Wang et al., 1963:38)
Aphis sacchari Zehntner 高粱蚜
Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜
Macrosiphum pisi Kaltenback 豆長管蚜
Toxoptera graminum Rondani 麥二叉蚜
Rhopalosiphum prunifoliae Fitch 粟蚜
Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus) 荷縊管蚜
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲。

分 佈：江西、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、吉林、黑龍江；蘇聯(西伯利亞)、歐洲、北美洲。

Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze) 多異瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:463; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; Dong, 1984:91; He et al., 1991:108; Huang et al., 1989:51-56; Huang et Pang, 1991:225; Li, 1996:133; Liu et Qin, 1989:92; Pang et Mao, 1980(2):36; Wu et al., 1991:102; Xiao et Li, 1992:383; Yunn., 1987:605; Zhang, 1987[ed.] 2:17; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zong et al., 1984:249)

Adonia variegata Goeze, 1777:

捕 食：*Eriosoma lanigerum* 蘋果綿蚜
稻蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
麥蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
玉米蚜
Aphis laburni Kaltenback 槐蚜。

分 佈：全國各地海拔 1200-2200 m. 福建、江西、湖南、廣東、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；古北區，日本、印度、印尼、非洲(中部)。

Hyperaspini chinensis Grotch 中華盾瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:383)

捕 食：蚜蟲。

分 佈：湖北。

Hyperaspis asitica Lewis 亞洲顯盾瓢蟲 (ASZI et al.,,1978:143)

捕 食：蚜蟲

軟蚧。
分 佈：浙江至黑龍江；日本。

Hyperaspis gyotokui Kamiya 六斑顯盾瓢蟲 (ASZI et al., 1978:144; Li, 1981(1-2):84)
捕 食：麥蚜
薊菜蚜
Toxoptera graminum Rondani 麥二岔蚜
分 佈：陝西、河北。

Hyperaspis leechi Miyatake 四斑顯盾瓢蟲 (ASZI et al., 1978:144; Huang et Pang, 1991:228; Li, 1997:707)
Hyperaspis leechi Miyatake, 1967:
捕 食：蚜蟲
葉甲(卵)。
分 佈：福建、四川、浙江、陝西、河北至黑龍江。

Hyperaspis repensis (Herbst) 四星盾瓢蟲 (Liu, 1963:83; 1965:83; Wang et al., 1960:371)
捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
Aphis sacchari Zehntner 高粱蚜。
分 佈：江蘇、山東、河北、北京；古北區。

Hyperaspis sinensis (Crotch) 中華顯盾瓢蟲 (ASZI et al., 1978:144; Chen et al., 1993:120; Huang et Pang, 1991:228; Li et al., 1990:100; Sun, 1986:102; Sun et Lei, 1983:142-145; Zhang, 1987[ed.] 2:18)
捕 食：紫珠氈蚜
軟體蚜
蚜蟲
軟蚧
粉蝨
葉甲(卵)。
分 佈：福建、江西、廣西、四川、貴州、浙江、江蘇、安徽、陝西、北京。

Illeis (s. str.) **bistigmosa** (Mulsnat) 二斑素瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:345; Jing, 1986:335; Peng et al., 1997, 19(3):116; Pu et Wei, :214)
Egleis bistigmosa Mulsant, 1850:
Illis (*Illis*) *bistigmosa*; Iablokoff-Kkhnzorian, 1982:
別 名：*小素菌瓢蟲*。
取 食：白粉病菌菌絲、孢子。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南；越南、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、印尼。

Illeis (s. str.) **chinensis** Iablokoff-Khnzorian 中國素瓢蟲 (Pu et Wei, :214)
取 食：
分 佈：廣西。

Illeis (s. str.) **cincta** (Fabricius) 素鞘瓢蟲 (Liu, 1963:50; 1965:50; Pang et Mao, 1980(2):36; Peng et al., 1997, 19(3):117; Pu et Wei, :215; Xiao et Li, 1992:383; Zhang, 1987[ed.] 2:17; Zou et Zhou, 1993:175)

Coccinella cincta Fabricius, 1798:

Illis cincta; Timberake, 1943:

取 食：南瓜白粉病
橡膠白粉病
真菌
桃蚜(斯里蘭卡)
(獼猴桃園)。

分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北、河北；日本、菲律賓、印度、斯里蘭卡、印尼(巽他群島)。

Illeis (s. str.) **confusa** Timberlake 狹葉素瓢蟲 (Jing, 1986:334; Pu et Wei, :215)

別 名：*華素菌瓢蟲*。

取 食：

分 佈：廣東、廣西、雲南、浙江；越南。

Illeis (s. str.) **indica** Timberlake 印度素瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:345; Pu et Wei, :214)

取 食：白粉病菌菌絲、孢子。

分 佈：廣西、雲南；印度、巴基斯坦。

Illeis (s. str.) **koebelei koebelei** Timberlake 柯氏素瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Jing, 1986:335; Jing, 1992:549; Li, 1997:703; Pu et Wei, :215; Xiao et Li, 1992:383; Yu et Wang, 1999:158)

Illeis koebelei Timberlake, 1943:

取 食：白粉病菌的孢子及菌絲
真菌。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山西、河北；朝鮮、日本、菲律賓、印度、印尼。

Illeis shiensiensis Timberlake 陝西素瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Jing, 1986:335; Peng et al., 1997, 19(3):117; Pu et Wei, :214; Xiao et Li, 1992:383)

Illeis shensiensis Timberlake, 1943:

取 食：真菌。

分 佈：福建(武夷山)、海南、廣西、雲南、四川、陝西、河北。

Jauravia assamensis Kapur 月斑環艷瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:346; Yunn., 1987:629)

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度。

Jauravia limbata Motschulsky 黃環艷瓢蟲 (Jiang, 1980(1):17-23; Pang et Mao, 1979:26; Yu et Wang, 1999:92; Yunn., 1987:629)

Jauravia limbata Motschulsky, 1858:

捕 食：*Drosicha corpulenta* (Kuwana) 草履蚧(桑、桃、梨、櫻花、珊瑚、朴、楓楊等

20多種樹木)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、山東、山西、河北、遼寧、黑龍江；泰國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、日本、蘇聯。

Jauravia quadrinatata Kapur 四斑環艷蟲 (Cao et Xiao, 1985:346; Yunn., 1987:629)

捕 食 性。

分 佈：雲南；印度。

Keiscymnus taiwanensis Yang et Wu 臺灣凱瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):105; Peng et al., 1999:94; Tang et al., 1995, 17(40:168; Yu et Pang, 1992:15)

Keiscymnus taiwanensis Yang et Wu, 1972:

=*Scymnus* (*Pullus*) *sternitus* Pang et Gordon, 1986:

捕 食：*Oracella acuta* (Lebell) 濕地松粉蚧。

分 佈：臺灣、廣東、海南、貴州。

Lemnia (s. str.) **biplagiata** (Swartz) 雙帶盤瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:468; Chiu et Lo, 1985:4; He et al., 1991:108; Huang, 1990[ed.]:196; Huang et Gao, 1996:166; Huang et Pang, 1991:226; Jing, 1992:564; Li et al., 1990:87; Ma et al., 1995:227; Pang et Mao, 1980(2):38; Peng et al., 1997, 19(3):119; Sun et al., 1980(4):23; Yu et Chen, 2000, (12):33; Yu et Pang, 1992:14; Yu et Wang, 1999:134; Yunn., 1987:609; Zhang, 1987[ed.] 2:17; Zhao et al., 1998, 20(1):9-12)

Coccinella biplatiata Swartz, 1808:

=*Lemnia fraudulenia* Mulsant, 1850:

=*Lemnia melanota* Mulsant, 1850:

=*Coelophora nepalensis* Crotch, 1874:

=*Coelophora personata* Weise, 1910:

=*Lemnia biplagiata melanota* (Mulsant, 1850) f. *personeta* (Weise, 1910)

=*Osumia bimaculata* Kurisaki, 1923:

Lemnia (s. str.) *biplagiata*; Kamiya, 1965:

別 名：*錨紋瓢蟲*。

捕 食：粉蝨、葉蟬、飛蝨

木蝨

朴綿蚜

Aphis gossipyii 棉蚜

Myzus persicae 桃蚜

柳蚜

柏蚜

Aphis craccivora Koch 豆蚜

白尾紅蚜

鬼針蚜

菜蚜

蘿蔔蚜

麥長管蚜

麥二叉蚜

茶蚜

Toxoptera aurantii (Boyer et Fonscolambe) 小橘蚜(橘二叉蚜)
Toxoptera citricida (Kirkaldy) 大橘蚜
甘蔗綿蚜
甘蔗黃蚜
甘蔗粉蚜
竹蚜
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、安徽、山東；朝鮮、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼(爪哇)。

Lemnia (s. str.) **bissellata** (Mulsant) 十斑盤瓢蟲 (Chen, 1996, 18(1):20; He et al., 1991:108; Huang et Pang, 1991:226; Jing, 1988:284; 1992:564; Li et al., 1990:88; Pang et Mao, 1980(2):38; Peng et al., 1997, 19(3):120; Yunn., 1987:609; Zhang, 1987[ed.] 2:17)

Coelophora bissellata Mulsant, 1850:
Lemnia (s. str.) *bissellata*; Sasaji, 1971:
Lemnia (*Spilocaria*) *bissellata*; Pang et Mao, 1980:

捕 食：稻蚜
麥長管蚜
Aphis craccivora Kock 豆蚜
玉米蚜
蚜蟲
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟。

分 佈：福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、山東；朝鮮、菲律賓、越南、印度、印尼、南亞、東南亞。

Lemnia (Artemis) circumsta (Mulsant) 紅基盤瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:226; Li et al., 1990:89; Pang et Mao, 1980(2):38; Yu et Wang, 1999:140; Yunn., 1987:609)

Artemis circumusta Mulsant, 1850:
=*Artemis mandarina* Musant, 1850:
=*Artemis rufula* Mulsant, 1850:
=*Coelophora westmanni* Mulsant, 1850:
Lemnia (*Artemis*) *circumusta*; Pang et Mao, 1980:

捕 食：*Aphis craccivora* Koch 豆蚜
麥蚜
蚜蟲。

分 佈：臺灣、福建、海南、廣西、雲南；越南、泰國、印度。

Lemnia circumvelata (Mulsant) 周緣盤瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:382; Yu et Wang, 1999:144)

Lemnia circumvelata (Mulsant, 1853:)

寄 主：蚜蟲。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、貴州、河南、陝西；尼泊爾。

Lemnia (Artemis) duvauceli (Mulsant) 九斑盤瓢蟲 (Li et al. 1990:89; Peng et al., 1997, 19(3):120)

Caria duvauceli Mulsant, 1850:
Lemnia (*Artemis*) *duvauceli*; Iablokoff-Khnzorian, 1982:
Alloneda novemmaculata Cao et Pu, 1985:
捕 食：蚜蟲
分 佈：香港、海南、廣西；日本、緬甸、印度、印尼。

Lemnia jianfengensis Jing 尖峰盤瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):120)

Lemnia jianfengensis Jing, 1988:
捕 食 性。
分 佈：海南。

Lemnia lushuiensis Jing 瀘水盤瓢蟲 (Jing, 1992:564)

Lemnia lushuiensis Jing, 1992:564.
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南。

Lemnia (Synia) melanaria (Mulsant) 紅頸盤瓢蟲 (He et al., 1991:108; Huang et Pang, 1991:227; Hun., 1992:412; Li et al., 1990:90; Peng et al., 1997, 19(3):120; Xiao et Li, 1992:382; Yu et Wang, 1999:142)

Synia melanaria Mulsant, 1850:
=*Synia melanopepla* Mulsant, 1850:
=*Leise rougeti* Mulsant, 1866:
=*Synia melanaria* ab. *rougeti*; Miwa et Yoshida, 1935:
Lemnia (*Synia*) *melanaria*; Iablokoff-Khnzorian, 1982:
捕 食：稻蚜
蚜蟲
粉蝨。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、陝西、甘肅；菲律賓、越南、泰國、印度、斯里蘭卡。

Lemnia (s. str.) **saucia** (Mulsant) 黃斑盤瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:468; He et al., 1991:108; Huang, 1990[ed.]:196; Huang et Gao, 1996:166, 275; Huang et Pang, 1991:226; Hun., 1992:413; Li, 1997:706; Li et al., 1990:87; Ma et al., 1995:227; Pang et Mao, 1980(2):38; Xiao et Li, 1992:382; Yu et Wang, 1999:136; Yunn., 1987:609; Zhang, 1987[ed.] 2:17)

Coelephora saucia Mulsant, 1850:
Leis calypso Mulsant
別 名：*赤星瓢蟲*。
捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨
稻蚜
麥蚜

棉蚜
柏蚜
鬼針蚜
楓蚜
楊蚜
算盤珠蚜
胡枝子蚜
蚧蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、甘肅；日本、菲律賓、泰國、印度、尼泊爾。

Lemnia swinhoei (Crotch) 赤星瓢蟲 (Chiu et Lo, 1985:4; Chu et Hsueh, 1976:58-74; Xie et al., 1999, 21(2):84; Yao et Tao, 1972:37-40)
Coelophora asucia swinhoei Critch, 1874:
Coelophora takanosis Ohta, 1931:
捕 食：43 種蚜蟲：*Aphis laborni* 豆蚜
Aphis gossypi 棉蚜
Acyrthosiphum pisi 豌豆蚜
Brevicoryne brassicae 菜蚜
Dactynotus formosanus 白尾紅蚜
Lipaphis crysiwi 僞菜蚜
Myzus persicae 桃蚜
Rhopalosiphum padi 稻蚜
Rhopalosiphum maidis 玉米蚜
Longiungiungius sacchari 黍蚜
Macrosiphum rosaibarae 玫瑰蚜
Macrosiphoniella sanforni 菊蚜
Oregma bambusifoliae 竹葉綠蚜
Toxoptera citricidus 大橘蚜
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、浙江、江蘇、山東；菲律賓、印度。

Lemnia sp. (Zhang, 1987[ed.] 2:17)
寄 主：算盤珠上的蚜蟲
分 佈：江西。

Macroilleis hauseri (Mader) 白條菌瓢蟲 (ASZI et al., 1978:146; Huang et Pang, 1991:224; Hun., 1992:411; Jing, 1988:283; 1992:549; Pang et Mao, 1980(2):36; Peng et al., 1997, 19(3):117; Xiao et Li, 1992:383; Yu et Wang, 1999:164; Zou et Zhou, 1993:175)
Halyzia hauseri Mader, 1926:
Macroilleis hauseri; Miyatake, 1965:
捕 食：白粉菌
蘋果白粉菌

球蚜
(獼猴桃園)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、海南、廣西、貴州、雲南、西藏(波密)、四川、湖北、陝西、甘肅；越南、印度、錫金、尼泊爾、不丹。

Macronaemia hauseri (Weise) 黑條長瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:464; He et al., 1991:108; Jing, 1992:566; Kuang et al., 1989:51-56; Liu, 1963:35; 1965: 35; Pang et Mao, 1980(2):37)
Macronaemia hauseri (Weise, 1905:)
捕 食：*Eriosoma lanigerum* 蘋果綿蚜
稻蚜
麥蚜
豆蚜。
分 佈：雲南、四川。

Macronaemia paradoxa (Mader) 奇異長瓢蟲 (Jing, 1992:566)
Macronaemia paradoxa (Mader, 1947:)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Macronaemia yunnanensis Cao et Xiao 雲南長瓢蟲 (Yunn., 1987:630)
捕 食：雲南油杉、苦刺及玉米葉上的蚜蟲。
分 佈：雲南。

Megalocaria dilatata (Fabricius) 十斑大瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:469; Huang et Pang, 1991:227; Li, 1997:704; Li et al., 1990:85; Pang et Mao, 1980(2):37; Xiao et Li, 1992:382; Yunn., 1987:606; Zhang, 1987[ed.] 2:17)
Anisolemnia dilatata Fabricius, 1775:
捕 食：竹蚜
甘蔗綿蚜
甘蔗黃蚜
桃粉蚜
麥蚜
茶蚜
蚜蟲。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、湖北；印度、印尼。

Megalocaria reichii (Mulsant) 萍斑大瓢蟲 (Yunn., 1987:609)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南；印度。

Megalocaria reichii pearsoni (Crotch) 萍斑大瓢蟲 (Pang et Mao, 1980(2):37)
Anisolemnia pearsoni Crotch
捕 食 性。
分 佈：中國。

Menochilus sexmaculatus (Fabricius) 六斑月瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:465; Bai, 1994, 10(3):130; Cao et Zhang, 1994, 16(1):1-5; Chen, 1996, 18(1):21; Chien, 1989:187-190; Chiu et Lo, 1985:4; Chu et Hsueh, 1976:58-74; He et al., 1991:108; Huang, 1981(3):19; Huang, 1990[ed.]:196; Huang et Gao, 1996:166; Huang et Li et al.,:97; Hung et al., 1983:80; Kuang et al., 1989:51-56; Li, 1981(1-2):70; Li, 1997:707; Lo et Chen, 1995:369; Pang, :227; Pang, 1991:186-188; Hun., 1992:410; Pang, 1990:82; Pang et Mao, 1980(2):38; Peng et al., 1997, 19(3):121; Su et al., 1986:37; Sun et al., 1982:40; Tang et al., 1995, 17(4):168; Xiao et Li, 1992:382; Xie et al., 1999, 21(2):84; Yu et Pang, 1992:13; Yunn., 1987:611; Zhang, 1987[ed.] 2:17; Zhang et al., 1980(4):13-16; Zong et al., 1984:248; Zong et al., 1986:118)

Coccinella 6-maculata Fabricus, 1781:
=*Coccinella 4-plagiata* Swartz, 1808:
Chilomenes sexmaculata; Mulsant, 1850:
Menochilus sexmaculata; Timberlake, 1943:
別 名：*四斑月瓢蟲，六條瓢蟲*。
捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨
36 種蚜蟲：*Aphis laborni* 豆蚜
Aphis gossypi 棉蚜
Acyrthosiphum pisi 豌豆蚜
Brevicoryne brassicae 菜蚜
Dactynotus formosanus 白尾紅蚜
Eriosoma lanigerum 蘋果綿蚜
Lipaphis crysiwi 僞菜蚜
Macrosiphum avenae 麥長管蚜
Myzus persicae 桃蚜
Rhopalosiphum padi 稻蚜
Rhopalosiphum maidis 玉米蚜
Longiungiungius sacchari 黍蚜
Macrosiphum rosaibarae 玫瑰蚜
Macrosiphoniella sanforni 菊蚜
Oregma bambusifoliae 竹葉綠蚜
苜蓿蚜
鬼針蚜
柏蚜
Schizaphis graminum 麥二叉蚜
煙蚜
Toxoptera citricidus 大橘蚜
松蚜
臺灣長足大蚜
楓楊扁蚜
茶葉蟬
稻葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木蝨
Allococcus morrisoni Ezzat et McConnel 馬氏刺粉蚧(石栗)
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松圓突蚧
Scirpophaga incentulas (Walker) 三化螟(蟻螟)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；日本、琉球、菲律賓、越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國、印度、阿富汗、伊朗(東部)、斯里蘭卡、印尼、新幾內亞、密克羅尼西亞。

Micraspis allardi (Muls.) 四斑兼食瓢蟲 (Jing, 1985:424)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Verania discolor (Fabricius) 稻紅瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:464; ASZI et al., 1978:147; Chen, 1996, 18(1):21; Huang, 1981(3):19; Huang, 1990[ed.]:197; Huang et Pang, 1991:227; He et al., 1991:108; Hun., 1992:415; Jing, 1985:424; 1992:565; Jiang et Su 1985:115-117; Kung, 1963:236; Li, 1997:707; Li et al., 1990:99; Liu, 1963:72; 1965:72; Luo et Zhuo, 1986:75; Ma et al., 1995:228; Pang et Mao, 1980(2):38; Peng et al., 1997, 19(3):121; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:40; Ye et Wang, 1987:11; Yu et Pang, 1992:15; Yu et Wang, 1999:130; Yunn., 1987:611; Zhang, 1987[ed.] 2:17; Zhang et al., 1982 4(3):28-31; Zhang, 1989, 8(1):24-28; Zong et al., 1984:248; Zou et Zhou, 1993:175; Zong et al., 1986:118)

Coccinella discolor Fabricius, 1798:
Verania discolor; Mulsant, 1850:
Micraspis discolor; Miyatake, 1965:
Micraspis kurasoi Miyatake, 1977:
Micraspis satoi Miyatake, 1977:

棲 息：水稻田、柑橘、番石榴

捕 食：稻薊馬

Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
白翅葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨
Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨
Laedelphax striatella (Fallen) 斑飛蝨
棉蚜
桃蚜
橘蚜
稻蚜
麥長管蚜
麥蚜
苜蓿蚜
菜縊管蚜
Macrosiphum formosanum 蚜
Macrosiphum formosartemisiae 蚜

Neophyllaphis podocarpi Takahashi 羅漢松蚜
Pentalonia nigronervosa Coq. 香蕉蚜
Rhopalosiphum maidis 玉米蚜
Chilo suppressalis (Walker) 二化螟(蟻螟)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(蟻螟)
褐邊螟(蟻螟)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟(卵、幼蟲)
Naranga aenescens Moore 稻螟蛉(幼蟲)
Oulema oryzae (Kuwayama) 負泥蟲(幼蟲)
稻潛葉蠅
蚧蟲(獼猴桃園)
有時取食水稻、小麥、油菜、玉米等花藥。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西；日本(琉球)、菲律賓、越南、馬來西亞、泰國、印度、錫金、斯里蘭卡、印尼(爪哇)、密克羅尼西亞。

Micraspis univittata (Hope) 黑條兼食瓢蟲 (Jing, 1985:424; 1988:285)
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)；印度、尼泊爾。

Micraspis yunnanensis Jing 雲南兼食瓢蟲 (Jing, 1985:424)
Micraspis yunnanensis Jing, 1985:424-425.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Nephus ancyroides Pang et Pu 錨端彎葉毛瓢蟲 (Pang et Pu, 1988:239)
Nephus ancyroides Pang et Pu, 1988:239.
捕 食 性。
分 佈：廣西(南寧)。

Nephus (Geminospho) bilinearis Yu 雙線彎葉毛瓢蟲 (Yu, 1997:718)
Nephus (*Geminospho*) *bilinearis* Yu, 1997:718-719.
捕 食 性。
分 佈：廣東、四川、湖北。

Nephus (Geminosipho) dilepismoides Pang et Pu 雙鱗彎葉毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222; Pang et Pu, 1988:240; Peng et al., 1997, 19(3):106; Xiao et Li, 1992:373)
Nephus dilepsimoides Pang et Pu, 1988:240.
=*Nephus ancyroides* Pang et Pu, 1988:
Nephus (s. str.) *dilepsimoides*; Yu, 1995:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西(南寧)。

Nephus koltzei (Weise) 長斑彎葉毛瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:50)

Nephus koltzei (Weise, 1887)
Scymnus (*Nephus*) *koltzeri*, Mader, 1955:
捕 食：柳粉蚧。
分 佈：河南、河北、北京；西伯利亞東部。

Nephus koreanus (Fursch) 高麗彎葉毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222)

捕 食 性。
分 佈：福建(邵武)。

Nephus (Geminospho) patagiatus (Lewis) 膜邊彎葉毛瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):106)

Scymnus patagiatus Lewis, 1896:
Nephus (*Geminospho*) *patagiatus*; Fursch, 1990:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南、陝西；日本、越南。

Nephus (s. str.) **roepkei** (Fluiter) 羅氏彎葉毛瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):106)

Scymnus roepkei Fluiter, 1938:
Nephus (s. str.) *roepkei*; Pang et Gordon, 1986:
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南；菲律賓、爪哇、密克羅尼西亞。

Nephus (s. str.) **ryuguus** (Kamiya) 圓斑彎葉毛瓢蟲 (ASZI et al., 1978:137;Chiu et Lo, 1985:4; Huang, 1990[ed.]:191; Huang et Pang, 1991:222; Pang et Mao, 1979:49; Peng et al., 1997, 19(3):106; Shi et al., 1989-90:81; Su et al., 1986:37)

Scymnus (*Nephus*) *ryuguus* Kamiya, 1961:
Nephus ryuguus, Sasaji, 1971:
Nephus (s. str.) *ryuguus*; Fursch, 1987:
捕 食：*Allococcus morrisoni* Ezzat et McConnel 馬氏刺粉蚧(石栗)
Nipaecoccus filamentosus 球粉蚧
Pseudococcus citri Risso 柑橘粉蚧
Pseudococcus sp. 大紅花粉蚧
木槿粉蚧
粉蚧科
Unaspis yanonensis Kuwana 矢尖蚧
Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜。
分 佈：臺灣、福建(福州)、廣東、上海；日本(琉球)。

Nephus (Sidis) tagiapatus (Kamiya) 星彎葉毛瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):106)

Scymnus (*Nephus*) *tagiapatus* Kamiya, 1965:
Nephus (*Sidis*) *tagiapatus*; Ren et Pang, 1994:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西；日本(琉球群島)、馬來西亞、泰國、印度、安達曼群島。

Nephus (Geminosipho) wushanus Yu 巫山彎葉毛瓢蟲 (Yu, 1997:717)

Nephus (*Geminosipho*) *wushanus* Yu, 1997:717-712.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Nephus (Geminosipho) ziguiensis Yu 秭歸彎葉毛瓢蟲 (Yu, 1997:716)

Nephus (*Geminosipho*) *ziguiensis* Yu, 1997:716-717.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Nephus sp. (Yu et Pang, 1992:16)

Nephus sp. Yu et Pang, 1992:16.

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Oenopia baoshanensis Jing 保山巧瓢蟲 (Jing, 1992:559)

Oenopia baoshanensis Jing, 1992:559.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Oenopia billieti (Mulsant) 雙六巧瓢蟲 (Jing, 1987:414; 1992:558)

Oenopia billieti (Mulsant, 1853:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川；印度。

Oenopia bissexnotata (Mulsant) 十二斑巧瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:465; He et al., 1991:109; Hun., 1992:415; Jing, 1986:204; 1992:558; Pang et Mao, 1980(2):38; Yunn., 1987:611; Zhang, 1987[ed.] 2:17)

Synharmonia bissexnotata Mulsant, 1850:

別 名：*十二斑和瓢蟲*。

捕 食：稻田蚜蟲
榆瘤蚜
蘋果綿蚜
蚜蟲。

分 佈：江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、河南、陝西、山東、河北、青海、新疆、遼寧、黑龍江；蘇聯。

Oenopia chinensis (Weise) 粗網巧瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:466; Huang et Pang, 1991:227; Hun., 1992:415; Li et al., 1990:84; Jing, 1986:203; Pang et Mao, 1980(2):38; Xiao et Li, 1992:380; Yunn., 1987:612; Zhang, 1987[ed.] 2:17)

Coelophora chinensis Weise, 1912:

別 名：*粗網盤瓢蟲*。

捕 食：蚜蟲

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、山東。

Oenopia conglobata (Linnaeus) 菱斑巧瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:465; He et al., 1991:109; Huang et Pang, 1991:227; Jing, 1986:203; Li, 1996:134; Pang et Mao, 1980(2):38; Qi, 1994:286-287)

Synharmonia conglobata Linnaeus

Synharmonia conglobata contaminata Menetries, Liu, 1963:

別 名：*菱斑和瓢蟲，褐斑和瓢蟲*。

捕 食：稻田蚜蟲
Aphis gossypii Glover 棉蚜
木槿蚜
柳蚜
桃粉蚜
麥蚜
蘋果綿蚜
玉米蚜
高粱蚜
菜蚜
榆藍葉甲(卵)。

分 佈：福建、西藏、四川、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、古北區。

Oenopia deqenensis Jing 德欽巧瓢蟲 (Jing, 1992:558)

Oenopia deqenensis Jing, 1992:558-559.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Oenopia dracoguttata Jing 龍斑巧瓢蟲 (Jing, 1986:204; 1988:284)

Oenopia dracoguttata Jing, 1986:204.

捕 食 性。

分 佈：西藏(日喀則、墨脫、波密、林芝)。

Oenopia emmerichi Mader 淡紅巧瓢蟲 (Jing, 1986:203; 1992:557; Liu, 1963:71; 1965:71; Pang et Mao, 1980(2):38; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Oenopia emmerichi Mader, 1933:

捕 食：蚜蟲。

分 佈：江西、雲南、西藏、四川。

Oenopia flavidbrunna Jing 黃褐巧瓢蟲 (Jing, 1986:204)

Oenopia flavidbrunna Jing, 1986:204.

捕 食 性。

分 佈：雲南(黑龍潭、昆明)。

Oenopia formosana (Miyatake) 臺灣巧瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:227; Xiao et Li, 1992:380; Yu et Wang, 1999:102; Zou et Zhou, 1993:175)

別 名：*六星瓢蟲*。
捕 食：木蝨
蚜蟲
(獼猴桃園)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、陝西。

Oenopis gonggarensis Jing 貢嘎巧瓢蟲 (Jing, 1992:560)
Oenopis gonggarensis Jing, 1992:560.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Oenopis kirbyi Mulsant 黑緣巧瓢蟲 (He et al., 1991:109; Jing, 1986:203;1988:284; 1992:557; Liu, 1963:72; 1965:72; Pang et Mao, 1980(2):38; Peng et al., 1997, 19(3):122; Xiao et Li, 1992:379; Yunn., 1987:612; Zou et Zhou, 1993:175)
Oenopis kirbyi Mulsant, 1850:
捕 食：麥長管蚜(稻田)
桃蚜
球蚜
蚜蟲
(獼猴桃園)。
分 佈：臺灣、江西、湖南、海南、雲南、西藏(墨脫)、四川、湖北、山東；泰國、緬甸、印度。

Oenopia lanpingensis Jing 蘭坪巧瓢蟲 (Jing, 1992:561)
Oenopia lanpingensis Jing, 1992:561-562.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Oenopia oncina (Olivier) (Jing, 1986:203)
捕 食 性。
分 佈：中國。

Oenopia picithoroxa Jing 黑胸巧瓢蟲 (Jing, 1992:560)
Oenopia picithoroxa Jing, 1992:560.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Oenopia pomiensis Jing 波密小巧瓢蟲 (Jing, 1987:413; 1988:285)
Oenopia pomiensis Jing, 1987:413-414.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Oenopia quadripunctata Kapur 四斑巧瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:345; Jing, 1986:204; 1988:285; 1992:563; Yunn., 1987:612)

Oenopia quadripunctata Kapur, 1963:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南、西藏(墨脫)；緬甸、印度、錫金。

Oenopia sauzeti Mulsant 黃緣巧瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:466; ASZI et al., 1978:150; Du et Diao, 1991:54-57; He et al., 1991:109; Huang et Pang, 1991:227; Hun., 1992:414; Jing, 1986:203; Jing, 1992:557; Li, 1981; 398; Li, 1997:700; Li et al., 1990:85; 1988:284; Kuang et al., 1989:51-56; Liu, 1963:71; 1965:71; Pang et Mao, 1980(2):38; Wu et Ji, 1989:151-155; Yu et Wang, 1999:104; Yunn., 1987:612; Zhou et Xiang, 1987:17-20)
Oenopia sauzeti Mulsant, 1860:
捕 食：*Eriosoma lanigerum* 蘋果綿蚜
梨蚜
李蚜
麥長管蚜(稻田)
柳蚜
蚜蟲
球蚜。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、安徽、湖北、河南、陝西、甘肅；越南、泰國、緬甸、印度。

Oenopia scalaris (Timberlake) 梯斑巧瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:227; Jing, 1986:204; Yu et Wang, 1999:106)
Oenopia scalaris (Timberlake, 1943:)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、廣東、河北；日本、越南、密克羅尼西亞。

Oenopia sexareata (Mulsant) 細網巧瓢蟲 (Jing, 1986:203; 1988:284; 1992:558; Pang et Mao, 1980(2):38; Yunn., 1987:612)
Oenopia sexareata (Mulsant, 1853:)
捕 食：蚜蟲。
分 佈：廣西、雲南、西藏(墨脫)、四川；緬甸、印度、印尼。

Oenopia sexmaculata Jing 六斑巧瓢蟲 (Jing, 1986:206; 1992:562; Xiao et Li, 1992:380)
Oenopia sexmaculata Jing, 1986:206.
捕 食：蚜蟲
分 佈：貴州、四川(瀘定磨西)、湖北。

Oenopia signatella (Mulsant) 點斑小巧瓢蟲 (Jing, 1987:414; 1992:562)
Oenopia signatella (Mulsant, 1866:)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南、西藏；緬甸、印度、斯里蘭卡。

Oenopia yunlongensis Jing 雲龍巧瓢蟲 (Jing, 1992:561)
Oenopia yunlongensis Jing, 1992:561.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Ortalis bruneiana ssp. **menglunensis** Pang et Mao 勐倉刻眼瓢 (Li et al., 1990:74; Pang et Mao, 1979:40)

Ortalis bruneiana ssp. *menglunensis* Pang et Mao, 1979:40.

捕 食：竹蚜

竹刺粉蝨。

分 佈：廣西、雲南。

Ortalis jinghongiensis Pang et Mao 景洪刻眼瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:39; Yunn., 1987:628)

Ortalis jinghongiensis Pang et Mao, 1979:39.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Ortalia nigropectoralis Pang et Mao 黑腹刻眼瓢蟲 (Ma et al., 11995:225; Pang et Mao, 1979:39)

Ortalia nigropectoralis Pang et Mao, 1979:39.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)、浙江。

Ortalia pectoralis Weise 黃褐刻眼瓢蟲 (Li et al.,1990:73; Jing, 1988:286; Ma et al., 1995:225; Pang et Mao, 1979:38; Yunn., 1987:628)

Ortalia pectoralis Weise, 1901:

捕 食：蚜蟲。

分 佈：廣西、雲南、西藏(墨脫)、浙江；印度。

Ortalia yunnanensis Pang et Mao 雲南刻眼瓢蟲 (Li, 1997:708; Pang et Mao, 1979:41; Peng et al., 1997, 19(3):105; Zou et Zhou, 1993:175)

Ortalia yunnanensis Pang et Mao, 1979:41.

捕 食：*Aphis craccivora* Koch 豆蚜

橘蚜

蚜蟲

(獮猴桃園)。

分 佈：湖南、廣東、海南、雲南、四川。

Ortalis sp. 刻眼瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222)

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)。

Pania luteopustulata (Mulsant) 黃室盤瓢蟲 (He et al., 1991:109; Huang et Pang, 1991:227: Jing, 1988: 282; 1992:565; Li et al., 1990:90; Pang et Mao, 1980(2):38; Xiao et Li, 1992:383; Yunn., 1987:611; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Oenopia luteopustulata Mulsant, 1850:

=*Coelophora korschefskyi* Mader

別 名：*八室盤瓢蟲*。

捕 食：稻蚜

蚜蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、陝西；緬甸甸、印度。

Phaenochilus melasternalis Gyllenhal 細須唇瓢蟲 (Huang et Li, 1993, 16(2):18)

捕 食：*Ceroplastes floridensis* Comstock 龜蠟蚧(橡膠)。

分 佈：雲南。

Phaenochilus metesternalis Miyatake 細須唇瓢蟲 (Jing, 1988:286; Li et al., 1990:80; Pang et Mao, 1979:78; Yunn.:603)

Phaenochilus metasternalis Miyakake, 1970:

捕 食 性。

分 佈：廣東、海南、廣西、雲南、西藏(墨脫)。

Pharoscymnus taoi Sasaji 四星小黑瓢蟲 (ASZI et al., 1978:133; Chiu et Lo, 1985:3; Huang et Pang, 1991:218; Li et al., 1990:67; Pang et Mao, 1979:26; Peng et al., 1997, 19(3):104; Peng et al., 1999:93; Shiao, 1978:218; Tang et al., 1995(4):168; Wu et Tao,:147; Yu et Pang, 1992:13)

Pharoscymnus taoi Sasaji, 1967:

別 名：*臺毛艷瓢蟲*。

捕 食：*Oracella acuta* (Lobdell) 濕地松粉蚧

Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧

Aonidiella sp. 木瓜赤圓蚧

Aspidiotus destructor Signoret 淡圓蚧

Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧

Pseudaonidia duplex (Cockerell) 茶圓蚧

Aphis craccivora Koch 豆蚜

Hyadaphis erysimi pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西。

Phrynocaria approximans (Crotch) 四眼盤瓢蟲 (Pang et Mao, 1980(2):38)

Coelophora approximans Crotch

捕 食 性。

分 佈：中國。

Phrynocaria congener (Billberg) 紅星盤瓢蟲 (He et al., 1991:109; Huang et Gao, 1996:275; Huang et Pang, 1991:2; Jing, 1992:556; Li, 1997:706; Li et al., 1990:86; Ma et al., 1995:227; Pang, 1991:186-188; Pang et Mao, 1980(2):38; Xiao et Li, 1992:. Yu et Wang, 1999:132; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Coccinella congener Billberg, 1908:

=*Coelophora congener* (Schöenberr), Liu, 1963:

=*Coelophora approximans* Crotch, Liu, 1963:

捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨

Pseudophacepteron canarium Yang et Li 橄欖星室木蝨

Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

楓楊扁蚜

豆蚜

Macrosiphum granarium (Kirby)　麥長管蚜
球蚧
綿蚧
Scirpophaga incertulas (Walker)　三化螟(蟻螟)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江；日本、越南、印度。

Phrynocaria nigrilimbata Jing 黑緣星盤瓢蟲 (Jing, 1986:307)
Phrynocaria nigrilimbata Jing, 1986:307-308.
捕 食 性。
分 佈：雲南(瑞麗)。

Phrynocaria piciella Jing 小黑星盤瓢蟲 (Jing, 1992:556)
Phrynocaria piciella Jing, 1992:556.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Phymatosternus lewisii (Crotch) 艷色廣盾瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:90)
捕 食：蚜蟲
蚧蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、貴州、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西；日本、越南、緬甸、印度。

Platynaspidius maculosus (Weise) 四斑廣盾瓢蟲 (Yu et Wang, 1999;86)
Platynaspidius maculosus (Weise, 1910:)
別 名：*五星小黃瓢蟲*。
捕 食：蚜蟲
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、江蘇、湖北、陝西；越南。

Platynaspidius quinquepunctatus Miyatake 五斑廣盾瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:88)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Platynaspis angulimaculata Mader 斧斑廣盾瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:462; ASZI et al., 1978:160; Liu, 1963:81; 1965:81; Pang et Mao, 1979:93; Xiao et al., 1992:377; Yunn., 1987:604)
Platynaspis angulimaculata Mader, 1938:
捕 食：扁柏上的蚜蟲
圓蚧。
分 佈：廣東、雲南、西藏、四川、湖北。

Platynaspis bimaculata Pang et Mao 雙斑廣盾瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:94; Yunn., 1987:604)
Platynaspis bimaculata Pang et Mao, 1979:94.
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Platynaspis gressitti (Miyatake) 葛氏廣盾瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Pang et Mao, 1979:92; Peng et al., 1993, 19(3):115)

Phymatosternus gressitti Miyatake, 1961:

別 名：*扭葉廣盾瓢蟲*。

捕 食：蚜蟲

分 佈：福建、廣東、海南、雲南。

Platynaspis hainanensis (Miyatake) 海南廣盾瓢蟲 (Li et al., 1990:79; Pang et Mao, 1979:97; Peng et al., 1997, 19(3):115; Peng et al., 1999:97)

Phymatosternus hainanensis Miyatake, 1961:

捕 食：*Cerataphis* sp. 檳榔蠟蚜

蚜蟲。

分 佈：海南、廣西。

Platynaspis huangea Cao et Xiao 黃斑廣盾瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:119; Yunn., 1987:631)

Platynaspis huangea Cao et Xiao, 1984:119.

捕 食：黃角樹上蚜蟲

分 佈：雲南。

Platynaspis lewisii Crotch 艷色廣盾瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:462; ASZI et al., 1978:160; Huang et Pang, 1991:224; Li et al., 1990:78; Pang et Moa, 1979:96; Peng et al., 1997, 19(3):115; Shi et al., 1989-90:81; Xiao et Li, 1992:377; Yunn., 1987:604; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Platynaspis lewisii Crotch, 1873:

Phymatosternus lewisii, Miyatake, 1961:

捕 食：菊蚜

Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜

鬼針草蚜

蚧蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、_海、湖北、陝西、甘肅；朝鮮、日本、緬甸、印度。

Platynaspis maculosa Weise 四斑廣盾瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Li et al., 1990:79; Ma et al., 1995:226; Pang et Mao, 1979: 96; Peng et al., 1997, 19(3):116; Peng et al., 1999:97; Xiao et Li, 1992:377; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

Platynaspis maculosa Weise, 1910:

=*Platynaspidius maculosus,* Miyakake, 1961:

捕 食：*Aphis craccivora* Koch 豆蚜

棉蚜

鬼針蚜

高梁蚜

蚧蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、海南、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西；日本。

Platynaspis ocellimaculata Pang et Mao 眼斑廣盾瓢蟲 (Jing, 1992:568; Pang et Mao, 1979:95; Yunn., 1987:604)

Platynaspis ocellimaculata Pang et Mao, 1979:95.

捕 食：蚜蟲(樟科植物)。

分 佈：雲南。

Platynaspis octogutatus (Miyatake) 八斑廣盾瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Pang et Mao, 1979:98; Peng et al., 1997, 19(3):116)

Phymatosternus octoguttata Miyatake, 1961:

Platymaspis octoguttata; Pang et Mao, 1979:

捕 食：*Aphis craccivora* Koch 豆蚜。

分 佈：福建、廣東、海南、雲南。

Platynaspis sexmaculata Cao et Xiao 六斑廣盾瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:118; Yunn., 1987:631)

Platynaspis sexmaculata Cao et Xiao, 1984:118.

捕 食：榕樹上蚜蟲

分 佈：雲南。

Plotina muelleri Mader 福建彩瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:218; Huang et Zhang, 1987:28-29; Pang et Mao, 1979:24)

Plotina muelleri Mader, 1955:

捕 食 性。

分 佈：福建。

Propylaea japonica (Thunberg) 龜紋瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:471; ASZI et al., 1978:157; Bai, 1994, 10(3):130; Cao et Zhang, 1994, 16(1):1-5; Chen, 1986:27; Chen et al., 1993:120; Chen et al., 1999, 15(3):122; Chiu et Lo, 1985:5; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; 1997, 19(4):146-151; Dong, 1984:91; Gao, 1990:90; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; Hao et al., 1993:192-193; He et al., 1991:110; He et al., 1996(4):34; Huang, 1981(3):19; Huang, 1990[ed.]:196; Huang et Gao, 1996:167; Huang et Pang, 1991:228; Hun., 1992:410; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Jing, 1992:549; Lei et Chen, 1987:213-216; Lei et al., 1988, 9(Suppl.):32, 50; Li, 1981(1-2):71; 84; Li, 1997:702; Li et al., 1990:99; Liu, 1963:48; 1965:48; Liu et Qin, 1989:92; Lu et al., 1983:33-38; Lu et al., 1986:63; Luo et Zhuo, 1986:75; Ma et al., 1995:226; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Nan et al., 1987:125; Pang, 1991:186-188; Pang et Mao, 1980(2):39; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-98; Peng et al., 1997, 19(3):1221; Shen, 1986:80; Shen et al., 1991:114-119; Shen, et al., 1992:273-278; Shi et al., 1989-90:81, 87; Song, 1984:82; Song et al., 1988:22-33; Song et al., 1988, 10(1):22-23; Tan et al., 1997, 24(4):341-346; Tang et al., 1995(4):168; Wang et Wei, 1990:101-1044; Wang et al., 1960:370; Wang et al., 1989:98; Wang et al., 1991:79-81; Wei et Ran, 1983:89-93; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et al., 1991:28; Wu et al., 1991:102; Xiao et Li, 1992:380; Xiao et al., 1991:121; Yan, 1988:83-84; Yang, 1985:82-86; 137-142; Ying, 1981: 223-227; Yu et Wang, 1999:108; Yunn., 1987:612; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:18; Zhang et al., 1996(4):14; Zhang et al., 1990:2; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zhu et Xiao, 1987:184; Zhu et al., 1998, 25(1):92-94; Zong et al., 1984:248; Zou et Zhou, 1993:175; Zong et al., 1986:118)

Coccinella japonica Thunberg, 1781:

Propylea japonica; Lewis, 1896:

=*Propylea japonica* ab. *dionea*; Weise, 1923:

=*Propylea conglobata*; Miwa, 1931:

=*Propylea conglobata* var. *dionea*; Miwa, 1931:

Propylea quaturodecimpunctata; Miwa et al., 1932:

=*Propylaea* (!) *japonica*; Liu, 1963:

捕 食：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛蝨

Sogatella furcifera (Horvàth) 白背飛蝨

Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛蝨

Empoasca bituttula (Ishida) 棉葉蟬

稻蚜
Aphis citricidus (Kirkaldy) 橘蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜(Wang et al., 1963:38)
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Aphis nerii Boyer et Fonscolombe 莢竹桃蚜
Aphis umbrella Börner 錦葵蚜
麥蚜
Bravicoyne brassicae 菜蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 蘿蔔蚜
Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜
Melanaphis sacchari (Zehntner) 高梁蚜
桃粉大尾蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Rhopalosiphum maidia (Fitch) 玉米蚜
Rhopalosiphum rufiabdominalis (Sasaki) 紅腹縊管蚜
Schizaphis graminum 麥二叉蚜
蘋果黃蚜
苜蓿蚜
鬼針蚜
松蚜
臺灣長大蚜
Toxoptera citricidus 大橘蚜
Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木蝨
Oracella acuta (Lobdell) 濕松粉蚧
小菜蛾(二齡幼蟲)
Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) 稻縱卷葉螟
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(蟻螟)
Anomis flava Fabricius 棉小造橋蟲
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵、幼蟲)
Contarinia sp. 茉莉花癭蚊(Song et Cai, 1991:107)
葉蟎
Trichiocampus cannabis Xiao et Huang 大麻毛怪葉蜂
(獼猴桃園)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞)、越南、印度、不丹。

寄生蜂：*Homalotylus flaminius* Dalman 瓢蟲隱尾跳小蜂。

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus) 方斑瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:471; ASZI et al., 1978:157; Liu, 1963:49;

1965:49; Ma et al., 1995:226; Pang et Mao, 1980(2):39; Xiao et Li, 1992:380; Zhang, 1987[ed.] 2:18)
捕 食：粉蝨
蚜蟲
蚧
粉蚧。
分 佈：江西、浙江、江蘇、湖北、陝西、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；蘇聯(西伯利亞、高加索)、歐洲。

Protocaria scalaris Timberlake 黃原瓢蟲 (Li, 1997:700)
Protocaria scalaris Timberlake, 1943:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、四川、日本。

Pseudoscymnus amplus Yang et Wu (Pang, 1991:198)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus ancistroides Pang et Huang 雙鈎方瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Pang, 1991:198; Pang et Huang, 1986:65)
Pseudoscymnus ancistroides Pang et Huang, 1986:65-66.
捕 食 性。
分 佈：福建(先鋒嶺)。

Pseudoscymnus anmashanus Yang (Pang, 1991:198)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus bivalves Yu 雙瓣方瓢蟲 (Yu, 1997:720)
Pseudoscymnus bivalves Yu, 1997:720.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Pseudoscymnus changi Yang (Pang, 1991:198)
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus disselasmatus Pang et Huang 雙膜方瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222; Pang, 1991:198; Pang et Huang, 1986:65)
Pseudoscymnus disselasmatus Pang et Huang, 1986:65.
捕 食 性。
分 佈：福建(南靖)。

Pseudoscymnus fulvihumerus Yang et Wu (Pang, 1991:199)
捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus gibbosus Yu 瘤葉方瓢蟲 (Yu, 1997:720)

Pseudoscymnus gibbosus Yu, 1997:720-721.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Pseudoscymnus hareja (Weise) (Pang, 1991:199)

Scymnus hareja Weise, 1879:
=*Scymnus hareja* ab. *yezonesis* Ohta, 1929:
Pseudoscymnus hareja, Chapin, 1962:
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本。

Pseudoscymnus kurohime (Miyatake) 黑方突毛瓢蟲 (ASZI et al., 1978:137; Huang, 1990[ed.]:191; Huang et Pang 1991:222; Li et al.,1990:73; Ma et al., 1995:225; Pang, 1991:198; Peng et al., 1997, 19(3):107)

Scymnus (s. str.) *kurohime* Miyatake, 1959:
Pseudoscymnus kurohime, Chapin, 1962:
捕 食：*Ceratovacuna lanigera* Zehntner 甘蔗綿蚜
玉米蚜
Pseudococcus spp. 粉蚧。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、浙江、湖北；琉球、越南、密克羅尼西亞(馬利安諾)。

Pseudoscymnus lamellatus Yang et Wu (Pang, 1991:199)

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus lancetapicalis (Pang et Gordon) 毛端方瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):107)

Nephus (s. str.) *lancetapicalis* Pang et Gordon, 1986:
Pseudoscymnus lancetapicalis; Pang et Yu, 1991:
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南。

Pseudoscymnus lewisi (Kamiya) 里氏方瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222; Pang, 1991:199; Peng et al., 1997, 19(3):107)

Clitostethus lewisi Kamiya, 1961:
=*Clitostethus nakanei* Araki, 1964:
Pseudoscymnus lewisi; Kamiya, 1966:
捕 食 性。
分 佈：福建(大竹嵐)、海南、湖北、陝西；日本、越南。

Pseudoscymnus montanus Yang (Pang, 1991:199)

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus (s. str.) **nakanei** (Araki) 那卡方瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):107)

Scymnus (s. str.) *nakanei* Araki, 1963:
Pseudoscymnus nakanei; Kamiya, 1966:
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南、四川、陝西；日本。

Pseudoscymnus nepalicus Miyatake 尼泊爾方瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):107)

Pseudoscymnus nepalicus Miyatake, 1985:
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南；尼泊爾。

Psuedoscymnus orbiculatus Yang 圓斑方瓢蟲 (Pang, 1991:200; Yang, 1971, 20:85-96; Yu et Wang, 1999:62)

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus ohtai Yang et Wu (Pang, 1991:200)

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Pseudoscymnus paltatus Pang et Huang 矛端方瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222; Pang, 1991:200; Pang et Huang, 1986:64)

Pseudoscymnus paltatus Pang et Huang, 1986:64.
捕 食 性。
分 佈：福建(沙縣)。

Pseudoscymnus pronotus Pang et Huang 黃胸方瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222; Pang, 1991:200; Pang et Huang, 1986:64)

Pseudoscymnus pronotus Pang et Huang, 1986:64-65.
捕 食 性。
分 佈：福建(南靖)。

Pseudoscymnus quinquepunctatus (Weise) 五斑方瓢蟲 (Pang, 1991:200; Yu et Wang, 1999:64)

Nephus quinquepunctatus Weise, 1923:
Pseudoscymnus quinquepunctatus, Chapin, 1962:
=*Psuedoscymnus quinquepunctatus quinquepunctatus* Kamiya, 1965:
=*Psuedoscymnus quinquepunctatus okinawanus* Kamiya, 1965:
捕 食 性。
分 佈：臺灣；琉球群島。

Pseudoscymnus seboskii (Ohta) 石氏方瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:222; Pang, 1991:200)

Sscymnus hereji seboshii Ohta, 1929:
Pseudoscymnus seboshii, Chapin, 1962:
捕 食 性。
分 佈：福建；日本。

Pseudoscymnus shixingiensis Pang 始興方瓢蟲 (Pang, 1993:493)

Pseudoscymnus shixingiensis Pang, 1993:493.

捕 食 性。

分 佈：廣東(始興)。

Pseudoscymnus sternalis Pang et Gordon (Pang, 1991:201)

Pseudoscymnus sternalis Pang et Gordon, 1986:

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Pseudoscymnus sylvaticus (Lewis) 枝斑方瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):107)

Scymnus sylvaticus Lewis, 1896:

Pseudoscymnus sylvaticus; Chapin, 1962:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南；朝鮮、日本。

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus) 二十二星瓢蟲 (Pang et Mao, 1980(2):36)

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus)

捕 食 性。

分 佈：中國。

Rodolia cardinalis (Mulsant) 澳洲瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:476; ASZI et al., 1978:162; Chen et Wang, 1987:297; Chen et al., 1994:58; Chiu et Lo, 1985:3; Huang, 1990[ed.]: 186-187; Huang et Gao, 1996:147; Huang et Pang, 1991:228; Li et al., 1990:81; Liu, 1963:89; 1965:89; Lo, 1997:57; Lo et Tao, 1966:52; Lo et Wu, 1989:181; Lu, 1996, 22(6):44-45; Pang, 1996, 18(4)(Suppl.):32; Pu, 1987:60; Su et al., 1986:37; Xiao et Li, 1992:377; Yu et Wang, 1999:54; Yunn., 1987:626; Zhang, 1987[ed.] 2:18; Zhang, 1994(4):7-9)

Vedalia cardinalis Mulsant

捕 食：*Icerya purchasi* Maskell 吹綿蚧
紫蘇粉蚧
蚜蟲
葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西；日本、蘇聯、印尼(爪哇)、澳洲、非洲、美洲。原產于大洋洲。

附 註：1909 年從美國引進臺灣，1929 年從臺灣移殖上海，1932 年再從臺灣移殖浙江黃岩防治吹綿蚧(*Icerya purchasi* (Maskell))。

Rodolia concolor Lewis 暗紅瓢蟲 (Liu, 1963:89; 1965:89)

捕 食：*Drosicha contrahens* Walker 桑蝨。

分 佈：北京；日本。

Rodolia fumida Mulsant 煙色紅瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:346; Yunn. 1987:625)

捕 食：蚜蟲
蚧蟲。

分 佈：雲南；緬甸、印度、斯里蘭卡、馬達加斯加。

Rodolia guerini (Crotch) 六斑紅瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:478; Huang et Pang, 1991:228; Li et al., 1990:82; Zou et Zhou, 1993:175)
Vedalia guerini Crotch
=*Rodolia sexmaculata* Mader
捕 食：*Icerya purchasi* Maskell 吹綿蚧
(獮猴桃園)。
分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、四川、浙江。

Rodolia limbata Motschulsky 紅環瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:477; ASZI et al., 1978:163; Liu, 1963:90; 1965:90; Yunn., 1987:625; Zhang, 1987[ed.] 2:18)
捕 食：*Drosicha contrahens* Walker 桑蝨
Icerya purchasi Maskell 吹綿蚧
桑芽蚧
Drosicha corpulenta 草履蚧
分 佈：福建、江西、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、山西、河北、北京、遼寧、黑龍江；日本、蘇聯(西伯利亞東部)。

Rodolia octoguttata Weise 八斑紅瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:228; Liu, 1963:90; 1965:90; Yunn., 1987:626)
=*Rodolia octomaculata*
捕 食：蚧蟲
分 佈：福建、雲南、四川；印度。

Rodolia pumila Weise 小紅瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:478; ASZI et al., 1978:163; Chiu et Lo, 1985:3; Huang, 1990[ed.]:187; Huang et Gao, 1996:147; Huang et Pang, 1991:228; Li et al., 1990:81; Liu, 1963:91; 1965:91;Lo, 1997:57; Lo et Tao, 1966:53; Ma et al., 1995:226; Peng et al., 1997, 19(3):123; Su et al., 1986:37; Yu et Pang, 1992:15; Yu et Pang, 1992:15; Yu et Wang, 1999:56; Yunn., 1987:625)
Rodolia punila Weise, 1892:
=*Rodolia okinawensis* Miiyatake, 1959:
捕 食：*Icerya purchasi* Maskell 吹綿蚧(月季)
蚜蟲
葉蟎。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、浙江；日本(琉球)、越南、密克羅尼西亞(引進)。

Rodolia quadrimaculata Mader 四斑紅瓢蟲 (Hun., 1992:412; Jing, 1992:569; Liu, 1963:91; 1965:91; Xiao et Li, 1992: 378)
Rodolia quadrimaculata Mader
捕 食：*Icerya purchasi* Maskell 吹綿蚧。
分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北、陝西；日本。

Rodolia rubea Mulsant 紫紅瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:229; Peng et al., 1997, 19(3):123)
Rodolia rubea Mulsant, 1850:
=*Rodolia carueipellis* Mulsant, 1853:
捕 食：蚧蟲。

分 佈：福建、海南、浙江。

Rodolia rufocincta Lewis 淺緣瓢蟲 (Liu, 1963:92; 1965:92; Ma et al., 1995:226)

捕 食：*Drosicha contrahens* Walker 桑蝨。

分 佈：浙江、河北、北京。

Rodolia rufopilosa Mulsant 大紅瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:476; ASZI et al., 1978:163; Chen et al., 1993:120; Chen et al., 1999, 15(3):122; Huang, 1990[ed.]:187; Huang et Gao, 1996:147; Huang et Pang, 1991:229; Hun., 1992:412; Jing, 1988:286; Li et al., 1990:80; Liu, 1963:88; 965:88; Ma et al., 1995:226; Peng et al., 1997, 19(3):123; Sun et al., 1984:111; Xiao et Li, 11992:377; Yu et Pang, 1992:15; Zhang, 1987[ed.] 2:19; Zhang, 1994(4):7-9)

Rodolia rufopilosa Mulsant, 1850:

捕 食：*Icerya purchasi* Maskell 吹綿蚧

Icerya seychellarum Westwood 銀毛吹綿蚧

Drosicha corpulenta 草履蚧

蚜蟲

葉蟎。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、西藏(墨脫)、貴州、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、甘肅；日本、菲律賓、越南、緬甸、印度、印尼(蘇門答臘)。

Rodolia xianfengensis Xiao 咸豐紅瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:377)

Rodolia xianfengensis Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:377-378.

捕 食：蚧(銀蓮花)。

分 佈：湖北。

Scymnus (Pullus) accamptus Pang et Pu 彎端小瓢蟲 (Pang et Pu, 1990:336；Peng et al., 1997, 19(3):108)

Scymnus (*Pullus*) *accamptus* Pang et Pu, 1990:336.

捕 食 性。

分 佈：海南、廣西。

Scymnus (s. str.) acidotus Pang et Huang 端絲小毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1985:38; Peng et al., 1997, 19(3):108; Yu et Pang, 1991:179)

Scymnus (s. str.) *acidotus* Pang et Huang, 1985:36-37.

捕 食 性。

分 佈：福建(挂墩)、廣東、海南、浙江。

Scymnus (Pullus) akonis (Ohta) (Kamiya, 1965: ; Yang, 1978:106; Yu et Pang, 1991:180)

Pullus akonis Ohta, 1929:

Scymnus (*Pullus*) *akonis* (Ohta), Kamiya, 1965:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Scymnus (Pullus) ambonoidea Pang 刃突小瓢蟲 (Pang, 1988:386; Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (*Pullus*) *ambonoidea* Pang, 1988:386-387.

捕 食 性。
分 佈：廣東(鼎湖山)。

Scymnus (s. str.) **andamanensis** Kapur 安小毛瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:372)
捕 食：李蚜。
分 佈：湖南、貴州、陝西。

Scymnus (s. str.) **apiciflavus** (Motschulsky) 端黃小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):108; Yu et Pang, 1991:180)
Diomus apiciflavus Motschulsky, 1858:
Scymnus apiciflavus Motschulsky, 1858:
Scymnus (*Pullus*) *apiciflavus*; Bileawski et Chujo, 1961:
Scymnus (s. str.) *apiciflavus*; Peng et al., 1997:108.
捕 食 性。
分 佈：海南、四川、陝西；越南、印度、斯里蘭卡。

Scymnus (Neopullus) babai Sasaji 黑背毛瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:459; He et al., 1991:105; Huang et Pang, 1991:221; Hun., 1992:416; Pang et Mao, 1979:47; Peng et al., 1997, 19(3):107; Wang et al., 1989:99; Xiao et Li, 1992:372; Yu, 1997:725; Yu et Pang, 1991:183; Zou et Zhou, 1993:175)
Scymnus (*Neopullus*) *babai* Sasaji, 1971:
捕 食：黍蚜
稻蚜
粉蚧
Contarinia sp. 茉莉花癭蚊(Song et Cai, 1991:107)
(獼猴桃園)。
分 佈：福建、湖南、海南、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Scymnus (Pullus) bicolor Yang 內囊小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Yang, 1978:114; Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus (*Pullus*) *bicolor* Yang, 1978:114-115.
=*Scymnus* (*Pullus*) *endocrycus* Pang et Huang
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Scymnus bipunctata 二點小黑瓢蟲 (Lo, 1997:58)
捕 食：蚧蟲。
分 佈：臺灣。

Scymnus (Neopullus) brunnescens Motschulsky 棕色毛瓢蟲 (Yu et Pang, 1991:184)
Scymnus brunnescens Motschulsky, 1866:
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本、緬甸、斯里蘭卡。

Scymnus (Pullus) centralis Kamiya 中黑小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):108; Yang, 1978:106-107; Yu et Pang, 1991:180; Yu et Wang, 1999:66)

Scymnus (*Pullus*) *centralis* Kamiya, 1965:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、海南；日本、越南。

Scymnus (Pullus) chinensis Jordon 中華小瓢蟲 (Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus chinensis Jordon, 1894:
捕 食 性。
分 佈：中國。

Scymnus (Pullus) cnidatus Pang et Pu 刺端小瓢蟲 (Pang et Pu, 1990:336)
Scymnus (*Pullus*) *cnidatus* Pang et Pu, 1990:336.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Scymnus (Pullus) comperei Pang et Gordon 細管小瓢蟲 (Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus (*Pullus*) *comperei* Pang et Gordon, 1986:
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Scymnus (Pullus) compoceratus Pang et Huang 彎角小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1986:63; Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus (*Pullus*) *compoceratus* Pang et Huang, 1986:63.
捕 食 性。
分 佈：福建(南靖)。

Scymnus (Pullus) contemtus (Weise) 尖帽小瓢蟲 (Kamiya, 1965: ; Peng et al., 1997, 19(3):109; Yang, 1978:106; Yu et Pang, 1991:181)
Pullus contemtus Weise, 1923:
Scymnus (*Pullus*) *contemtu;*, Korschefsky, 1931:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、海南；日本、越南。

Scymnus (s. str.) **crinitus** Fürsch 長毛小毛瓢蟲 (Yu et Pang, 1991:179)
Scymnus (s. str.) *crinitus* Fürsch, 1966:
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、河北、甘肅。

Scymnus (Pullus) cryphaconicus Ren et Pang (Ren et Pang, 1994:257)
Scymnus (*Pullus*) *cryphaconicus* Ren et Pang, 1994:257.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Scymnus (Pullus) curvus Yang (Yang, 1978:111; Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus (*Pullus*) *curvus* Yang, 1978:111-113.

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Scymnus (Pullus) dactylicus Pang 指突小瓢蟲 (Pang, 1988:388; Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus (*Pullus*) *dactylicus* Pang, 1988:388-389.
捕 食 性。
分 佈：廣東(鼎湖山)。

Scymnus (Pullus) dichorionicus Pang et Huang 葉突小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1986:63; Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus (*Pullus*) *dichorionicus* Pang et Huang, 1986:63-64.
捕 食 性。
分 佈：福建(黄坑)。

Scymnus (Pullus) dicorycus Pang et Huang 雙囊小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1986:61; Peng et al., 1999:95; Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus (*Pullus*) *dicorycus* Pang et Huang, 1986:61.
捕 食 性。
分 佈：福建(連城)、廣東、海南；越南。

Scymnus (s. str.) **dissolobus** Pang et Huang 雙葉小毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1985:41; Yu et Pang, 1991:179)
Scymnus (s. str.) *dissolobus* Pang et Huang, 1985:41-43.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Scymnus (s. str.) **dolichonychus** Yu et Pang 長爪小毛瓢蟲 (Yu et Pang, 1994:474)
Scymnus (s. str.) *dolichonychus* Yu et Pang, 1994:474-475.
捕 食 性。
分 佈：貴州、四川、湖南、浙江、湖北。

Scymnus (Pullus) dorcatomoides Weise (Kamiya, 1965: ; Yang, 1978:106; Yu, 1997:724; Yu et Pang, 1991:181)
Scymnus dorcatomoides Weise, 1879:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、四川；日本、越南。

Scymnus (Pullus) dorytatus Pang 矛管小瓢蟲 (Pang, 1988:387; Yu et Pang, 1991:181)
捕 食 性。
分 佈：廣東(鼎湖山)。

Scymnus (s. str.) **elagatisophyllus** Kuznetsov et Ren 梭葉小毛瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):108)
Scymnus (s. str.) *elagatisophyllus* Kuznetsov et Ren, 1991:
捕 食 性。
分 佈：海南；越南。

Scymnus (Pullus) endocorycus Pang et Huang 內囊小瓢蟲 (Pang et Huang, 1986:62)

Scymnus (*Pullus*) *endocorycus* Pang et Huang, 1986:62.

捕 食：甘蔗粉蚧。

分 佈：福建。

Scymnus (Pullus) excorycus Pang et Huang 外囊小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1986:61; Yu et Pang, 1991:181)

Scymnus (*Pullus*) *excorycus* Pang et Huang, 1986:61-62.

捕 食 性。

分 佈：福建(莆田)、海南。

Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll) 端銹小瓢蟲 (Hun., 1992:416; Peng et al., 1997, 19(3):109; Yu et Pang, 1991:181)

Pullus ferrugatus Moll, 1785:

=*Pullus analis* Fabricius, 1887:

=*Pullus ruficollis* Olivier, 1791:

=*Pullus parvula* Illig.

=*Pullus abdominalis* Apetz.

捕 食：桃蚜
　　　李蚜。

分 佈：福建、湖南、陝西；古北區(亞洲、歐洲)。

Scymnus (s. str.) folchinii Canepari 長隆小毛瓢蟲 (Yu, 1997:721; Yu et Pang, 1991:179)

Scymnus (s. str.) *folchinii* Canepari, 1979:

捕 食 性。

分 佈：四川、浙江、湖北、山東、河北、北京。

Scymnus (Pullus) formosanus (Weise) 臺灣小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):109; Yu et Pang, 1991:181)

Rhizobius formosanus Weise, 1923:

Scymnus (*Pullus*) *formosanus*; Sasaji, 1986:

別 名：*麗小瓢蟲*。

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西、貴州、四川、浙江；越南。

Scymnus (Pullus) frontalis (Fabricius) 四斑小瓢蟲 (Liu, 1965:87; Pang et Mao, 1979:49; Zhang, 1987[ed.] 2:19; Zhang et Zhang, 1994:251)

捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
　　　Aphis laburni Kaltenback 槐蚜
　　　Diuraphis noxia (Mordvilko) 麥雙尾蚜。

分 佈：福建、江西、山東、河北、新疆；亞洲、歐洲、古北區。

Scymnus (Pullus) fujianensis Pang et Gordon 福建小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Yu et Pang, 1991:182)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Scymnus (Pullus) giganteus Kamiya 大小黑瓢蟲 (Yu et Pang, 1992:16)

Scymnus (*Pullus*) *giganteus* Kamiya, 1961:

捕 食 性。

分 佈：廣東；越南、日本。

Scymnus gradrivuleratus Mulsant 連斑小毛瓢蟲 (Zhang et Zhang, 1994:251)

Scymnus gradrivuleratus Mulsant

捕 食：*Diuraphis noxia* (Mordvilko) 麥雙尾蚜。

分 佈：新疆。

Scymnus (Pullus) hainanicus Pang et Gordon 海南小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):109; Yu et Pang, 1991:182)

Scymnus (*Pullus*) *hainanicus* Pang et Gordon, 1986:

捕 食 性。

分 佈：海南。

Scymnus (Pullus) hatomemsis Kamiya 哈圖小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):109)

Scymnus (*Pullus*) *hatomemsis* Kamiya, 1965:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南；日本。

Scymnus (s. str.) henanensis Pang et Gordon 河南小毛瓢蟲 (Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *henanensis* Pang et Gordon, 1986:

=*Scymnus* (s. str.) *hainanensis* Pang et Gordon, 1986:

捕 食 性。

分 佈：貴州、河南。

Scymnus (Pullus) hilaris Motschulsky (Kamiya, 1965: ; Yang, 1978:106)

Scymnus hilaris Motschulsky, 1858:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Scymnus (Pullus) hingstoni Kapur 印氏小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):110)

Pullus hingstoni Kapur, 1963:

Scymnus (*Pullus*) *hingstoni*; Yu et Pang, 1992:

捕 食 性。

分 佈：福建、廣東、海南；越南、印度、錫金。

Scymnus (Pullus) hirsutus Yu 密小瓢蟲 (Yu, 1997:725)

Scymnus (*Pullus*) *hirsutus* Yu, 1997:725.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Scymnus (Neopullus) hoffmanni Weise 黑襟毛瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:459; ASZI et al., 1978:139; He et al., 1991:105; Huang et Pang, 1991:221; Hun., 1992:415; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Li, 1997:709; Li et al., 1990:73; Liu, 1963:87; 1965:87; Liu et Qin, 1989:92; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Pang et Mao, 1979:46; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Peng et al., 1997, 19(3):108; Shi et al., 1989-90:81; Song, 1984:82; Sun et al., 1980(4):23; Sun et al., 1982:40; Wu et Ji, 1989:151-155; Xiao et Li, 1992:372; Yu et Pang, 1991:183; Yu et Wang, 1999:72; Zhang, 1987[ed.] 2:19; Zhao, 1986:43-57; 1987:49-57; Zhao et Wang, 1987:47-54; Zhou et Xiang, 1987:17-20; Zhu, 1994, 16(1):28-35; Zong et al., 1984:248)

Scymnus hoffmanni Weise, 1879:
Scymnus (*Pullus*) *hoffmanni*, Mader, 1955:
Scymnus (*Neopullus*) *hoffmanni*; Pang et Mao, 1979:
捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
豆蚜
大豆蚜
桃蚜
Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜
稻蚜
禾谷縊管蚜
苜蓿蚜
甘蔗綿蚜
甘蔗黃蚜
茶蚜
葉蟎
蚧蟲
稻薊馬
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本。

Scymnus (Neopullus) hoocalis Pang et Gordon 鉤端光瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:372 Yu et Pang, 1991:184)

Scymnus (*Nipponopullus*) *hoocalis* Pang et Gordon, 1986:
Scymnus (*Didion*) *hoocalis*, Pang et Gordon, 1986:
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西、湖北。

Scymnus (s. str.) **inderihensis** Mulsant (Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *inderihensis* Mulsant, 1850:
捕 食 性。
分 佈：甘肅；蒙古、蘇聯。

Scymnus (Pullus) ionchiatus Pang et Huang 矛端小瓢蟲 (Pang et Huang, 1985:33)

Scymnus (*Pullus*) *ionchiatus* Pang et Huang, 1985:33-35.
捕 食 性。
分 佈：福建(黃崗山)。

Scymnus (Pullus) japonicus Weise 日本小瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:458; Huang et Pang, 1991:220; Jing, 1988:286; Pang et Mao, 1979:45; Xiao et Li, 1992:371; Yu et Pang, 1991:182; Zhang, 1987[ed.] 2:19)

Scymnus ferrugatus var. ? *japonicus* Weise, 1879:
=*Pullus ferrugatus japonicus*; Jacobson, 1905:
=*Scymnus* (*Pullus*) *ferrugatus japonicus*, Mader, 1955:
Scymnus (*Pullus*) *japonicus*, Sasaji, 1971:
捕 食：蚜蟲
分 佈：福建、江西、海南、雲南、西藏(墨脫)、浙江、江蘇、湖北、山東、北京、遼寧、吉林；朝鮮、日本。

Scymnus (Pullus) kawamurai (Ohta) 黑背小瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:458; ASZI et al., 1978:137; He et al., 1991:105; Huang et Pang, 1991:220; Jing, 1988:287; Li, 1997:708; Pang et Mao, 1979:43; Shi et al., 1989-90:81; Xiao et Li, 1992:372; Yu et Pang, 1991:182)

Pullus kawamurai Ohta, 1929:
Scymnus (*Pullus*) *kuwamurai*; Korschefsky, 1931:
=*Scymnus* (*Pullus*) *kamiyai* Araki, 1964:
捕 食：稻蚜
Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜
分 佈：福建、江西、廣東、海南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、寧夏、新疆；日本、印度。

Scymnus (Pullus) klapperichi Pang et Gordon 拱葉小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Peng et al., 1997, 19(3):110; Yu et Pang, 1991:182)

Scymnus (*Pullus*) *klapperichi* Pang et Gordon, 1986:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、海南、廣西。

Scymnus (Pullus) koebelei (Pang et Gordon) 凱氏小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):110; Peng et al., 1999:95)

Keiscymnus koebelei Pang et Gordon, 1986:
=*Scymnus* (*Pullus*) *xanthostethus* Pang et Pu, 1990:
Scymnus (*Pullus*) *koebelei*; Pang et Yu, 1991:
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西。

Scymnus (Pullus) leo Yang (Yang, 1978:113; Yu et Pang 1991:182)

Scymnus (*Pullus*) *leo* Yang, 1978:113-114.
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Scymnus (Pullus) linanicus Yu et Pang 臨安小瓢蟲 (Yu et Pang, 1994:475)

Scymnus (*Pullus*) *linanicus* Yu et Pang, 1994:475-476.
捕 食 性。
分 佈：浙江(臨安)。

Scymnus (Pullus) lonchiatus Pang et Huang 矛端小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Yu et Pang, 1991:182)

Scymnus (*Pullus*) *lonchiatus* Pang et Huang, 1986:
捕 食 性。
分 佈：福建(黃崗山)。

Scymnus (Pullus) longisiphonulus Cao et Xiao 長管小瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:123; Yunn.1987: 632)
Scymnus (*Pullus*) *longisiphonulus* Cao et Xiao, 1984:123.
捕 食：榕樹上的蚜蟲
分 佈：雲南。

Scymnus (s. str.) **longmenicus** Pang 龍門小毛瓢蟲 (Pang, 1986:308; Peng et al., 1997, 19(3):108; Yu et Pang, 1991:180)
Scymnus (s. str.) *longmenicus* Pang, 1986:308.
捕 食 性。
分 佈：廣東(龍門)、海南。

Scymnus (Pullus) loxiphyllus Ren et Pang (Ren et Pang, 1994:259)
Scymnus (*Pullus*) *loxiphyllus* Ren et Pang, 1994:259.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Scymnus (Pullus) mastigoides Ren et Pang 鞭絲小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):110)
Scymnus (*Pullus*) *mastigoides* Ren et Pang, 1995:
捕 食 性。
分 佈：湖南、海南、貴州。

Scymnus (s. str.) **mimulus** Capra et Fursch 四斑小毛瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:460; ASZI et al., 1978:140; Yu et Pang, 1991:180)
Scymnus (s. str.) *frontalis* Pang et Gordon, *nec* Fabricius
別 名：*四斑毛瓢蟲*。
捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
Aphis laburni Kaltenback 槐蚜。
分 佈：福建、山東、河北、新疆；德國、古北區。

Scymnus (Neopullus) minisculus Yu et Pang 小葉毛瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):108)
Scymnus (*Neopullus*) *minisculus* Yu et Pang, 1992:
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南。

Scymnus (Pullus) nankunicus Pang 南昆小瓢蟲 (Pang, 1986:308; Peng et al., 1997, 19(3):110; Xiao et Li, 1992:372; Yu et Pang, 1991:182; Yu et Pang, 1992:17)
Scymnus (*Pullus*) *nankunicus* Pang, 1986:308.
捕 食 性。
分 佈：福建(邵武)、湖南、廣東(龍門)、海南。

Scymnus (Pullus) nepenthus Pang et Huang 蓋端小瓢蟲 (Pang et Huang, 1985:32)

Scymnus (*Pullus*) *nepenthus* Pang et Huang, 1985:32-33.

捕 食 性。

分 佈：福建。

Scymnus (s. str.) **nibulus** Mulsant 雲小毛瓢蟲 (Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *nibulus* Mulsant, 1850:

捕 食 性。

分 佈：臺灣；緬甸、印度。

Scymnus (s. str.) **nigrosuturalis** Kamiya 黑縫小毛瓢蟲 (Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *nigrosuturalis* Kamiya, 1961:

捕 食 性。

分 佈：臺灣；日本、密克羅尼西亞。

Scymnus (s. str.) **notidanus** Pang et Huang 鰭突小毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1985:37; Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *notidanus* Pang et Huang, 1985:37-38.

捕 食 性。

分 佈：福建(黃崗山)。

Scymnus (Pullus) notus Pang et Pu 紫背小瓢蟲 (Pang et Pu, 1990:337)

Scymnus (*Pullus*) *notus* Pang et Pu, 1990:337.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Scymnus (Pullus) oestocraerus Pang et Huang 箭端小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1985:35; Peng et al., 1997, 19(3):110; Yu et Pang, 1991:182)

Scymnus (*Pullus*) *oestocraerus* Pang et Huang, 1985:35.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建(武夷山區挂墩、大竹嵐、先鋒嶺)、海南、貴州、雲南；越南。

Scymnus (Pullus) oncosiphonos Cao et Xiao 鈎管小瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:122; Yu et Pang, 1991:182; Yunn., 1987:632)

Scymnus (*Pullus*) *oncosiphonos* Cao et Xiao, 1984:122.

捕 食：榕樹上蚜蟲。

分 佈：雲南。

Scymnus (s. str.) **orientalis** Mader 東方小毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *orientalis* Mader, 1955:

捕 食 性。

分 佈：福建。

Scymnus (Pullus) ovimaculatus Sasaji 卵斑小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):111; Tang et al., 1995, 17(4):168)

Scymnus (*Pullus*) *ovimaculatus* Sasaji, 1968:
捕 食：*Oracella acuta* (Lobdell) 濕地松粉蚧。
分 佈：廣東、海南；馬來亞。

Scymnus (s. str.) **paganus** Lewis 褐色小毛瓢蟲 (Li, 1997:709; Yu et Pang, 1991:180)
Scymnus (s. str.) *paganus* Lewis, 1896:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、四川、湖北；日本。

Scymnus (**Pullus**) **pangi** (Fursch) 龐氏小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):111; Yu et Pang, 1991:182)
=*Scymnus* (s. str.) *formosanus* Fursch, 1960:
=*Scymnus* (*Nipponopullus*) *hoocalis* Pang et Gordon, 1986:
Scymnus (*Pullus*) *pangi* (Fursch, 1989:)
=*Scymnus* (*Pullus*) *notus* Pang et Pu, 1990:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、海南、廣西。

Scymnus (**Neopullus**) **paralleus** Yu et Pang 平葉毛瓢蟲 (Yu et Pang, 1994:210)
Scymnus (*Neopullus*) *paralleus* Yu et Pang, 1994:210.
捕 食 性。
分 佈：河北(北戴河)。

Scymnus (**Pullus**) **paratenuis** Ren et Pang (Ren et Pang, 1994:260)
Scymnus (*Pullus*) *paratenuis* Ren et Pang, 1994:260.
捕 食 性。
分 佈：貴州；越南。

Scymnus (**Pullus**) **pelecoides** Pang et Huang 斧端小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Pang et Huang, 1985:35; Peng et al., 1997, 19(3):111; Yu et Pang, 1991:182)
Scymnus (*Pullus*) *pelecoides* Pang et Huang, 1985:35.
捕 食 性。
分 佈：福建(挂墩)、海南、浙江。

Scymnus (**Pullus**) **perdere** Yang 南端小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Yang, 1978:109-111; Yu et Pang, 1991:182; Yu et Wang, 1999:68)
Scymnus (*Pullus*) *perdere* Yang, 1978:109-111.
=*Scymnus* (*Pullus*) *nepenthus* Pang et Huang, 1986:
捕 食：(柑橘園)
分 佈：臺灣、福建(邵武)、廣東、浙江。

Scymnus (**Pullus**) **phylloides** Yu 葉形小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):111)
Scymnus (*Pullus*) *phylloides* Yu, 1995:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、海南。

Scymnus (Pullus) posticalis Scicard 後斑小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Li et al., 1990:72; Pang, 1984:253-254; Peng et al., 1997, 19(3):111; Xiao et Li, 1992:372; Yu, 1997:723; Yu et Pang, 1991:182; Yunn., 1987:627)

Scymnus (*Pullus*) *posticalis* Sicard, 1912:
=*Scymnus* (s. str.) *ishidai* Araki, 1963:
=*Scymnus* (*Pullus*) *hilaris* Sasaji, 1971:
捕 食：*Rhopalosiphum maidis* (Fitch) 玉米蚜。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、湖北、陝西；日本、越南、泰國、緬甸。

Scymnus (s. str.) **prosericatus** Pang 附絲小毛瓢蟲 (Pang, 1988:385; Peng et al., 1997, 19(3):109; Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *prosericatus* Pang, 1988:385-396.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東(鼎湖山)、海南；日本、越南。

Scymnus (s. str.) **prosphykontus** Pang et Huang 附竿小毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1985:43; Yu et Pang, 1991:180)

Scymnus (s. str.) *prosphykontus* Pang et Huang, 1985:43.
捕 食 性。
分 佈：福建(大竹嵐)。

Scymnus (Pullus) prostylotus Pang et Huang 附椿小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Pang et Huang, 1985:31; Yu et Pang, 1991:183)

Scymnus (*Pullus*) *prostylotus* Pang et Huang, 1985:31.
捕 食 性。
分 佈：福建(黃崗山)。

Scymnus (Pullus) quadrillum (Motschulsky) (Kamiya, 1965: ; Yang, 1978:106- 109, 107; Yu et Wang, 1999:70)

Scymnus (*Pullus*) *quadrillum* (Motschulsky, 1858:)
捕 食：桃蚜
棉蚜
大橘蚜。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、浙江；琉球、越南、菲律賓、印度、斯里蘭卡。

Scymnus (s. str.) **quadrivulneratus** Mulsant 連斑毛瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:459; ASZI et al., 1978:139; He et al., 1991: 105; Pang et Mao, 1979:48)

Scymnus quadrivulneratus Mulsant
捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
麥蚜
稻蚜
葉蟎。
分 佈：浙江、安徽、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆；蒙古、蘇聯(西伯利亞)。

Scymnus (Pullus) rectoides Sasaji 直管小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):111)

Scymnus (*Pullus*) *rectoides* Sasaji, 1971:

捕 食 性。
分 佈：海南；日本。

Scymnus (Pullus) rhachiatus Pang et Huang 針端小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Pang et Huang, 1985:36; Yu et Pang, 1991:183)
Scymnus (*Pullus*) *rhachiatus* Pang et Huang, 1985:36.
捕 食 性。
分 佈：福建(福州)。

Scymnus (Pullus) rhamphiatus Pang et Huang 柳端小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Pang et Hunag, 1985:29; Xiao et Li, 1992:372; Yu, 1997:722; Yu et Pang, 1991:182)
Scymnus (*Pullus*) *rhamphiatus* Pang et Huang, 1985:29.
別 名：*鈎管小瓢蟲*。
捕 食：蚜蟲。
分 佈：福建(大竹嵐、先鋒嶺)、湖南、貴州、四川、浙江、湖北、陝西。

Scymnus (Pullus) runcatus Yu et Pang 倒齒小瓢蟲 (Yu et Pang, 1994:476)
Scymnus (*Pullus*) *runcatus* Yu et Pang, 1994:476-477.
捕 食 性。
分 佈：浙江(天目山)。

Scymnus ryuguus (Kamiya) 圓斑彎葉毛瓢蟲 (Huang et Gao, 1996:150; Lo et Tao, 1966:54)
捕 食：*Nipaecoccus filamentosus* (Cockerell) 球粉蚧。
分 佈：臺灣、福建。

Scymnus (Pullus) scalpratus Yu 匙葉小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):111)
Scymnus (*Pullus*) *scalpratus* Yu, 1993:
捕 食 性。
分 佈：海南。

Scymnus (s. str.) **scapanulus** Pang et Huang 拳爪小毛瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:220; Pang et Huang, 1985:39; Yu et Pang, 1991:180)
Scymnus (s. str.) *scanpanulus* Pang et Huang, 1985:39-41.
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山三港)。

Scymnus (Pullus) scrobiculatus Yu 凹葉小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):111)
Scymnus (*Pullus*) *scrobiculatus* Yu, 1993:
捕 食 性。
分 佈：海南。

Scymnus (Pullus) shirozui Kamiya 彎葉小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):111; Yang, 1978:106; Yu et Pang, 1991:183)
Scymnus (*Pullus*) *shirozui* Kamiya, 1965:
捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、海南。

Scymnus (Pullus) singularis Mader 獨斑小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Yu et Pang, 1991:183)

Scymnus (*Pullus*) *singularis* Mader, 1955:

捕 食 性。

分 佈：福建。

Scymnus (Pullus) sodalis (Weise) 束小瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:458; ASZI et al., 1978:138; Huang, 1990[ed.]:191; Huang et Pang, 1991:221; Jing, 1988:286; Kamiya, 1965: ; Pang et Mao, 1979:44; Peng et al., 1997, 19(3):112; Yang, 1978:106; Yu, 1997:724; Yu et Pang, 1991:183)

Pullus sodalis Weise, 1923:

Scymnus (*Pullus*) *sodalis,* Korschefsky, 1931:

別 名：*臺灣小瓢蟲*。

捕 食：*Sinomegoura citricola* (van der Goot) 樟修尾蚜粉蚧。

分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、湖北；日本(琉球)、越南、印度、。

Scymnus (Pullus) sternitus Pang et Gordon 腹毛小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Yu et Pang, 1991:183)

Scymnus (*Pullus*) *sternitus* Pang et Gordon, 1986:

捕 食 性。

分 佈：福建、海南、貴州。

Scymnus (Pullus) syoitii Sasaji 細小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Yu et Pang, 1991:183)

Scymnus (*Pullus*) *syoitii* Sasaji, 1971:

捕 食 性。

分 佈：福建；日本。

Scymnus (Pullus) taiwanicus (Ohte) 臺灣小瓢蟲 (Li et al., 1990:72; Peng et al., 1999:95; Yu et Pang, 1991:183)

Pullus taiwanus Ohta, 1929:

Scymnus (*Pullus*) *taiwanus;* Korschefsky, 1931:

=*Scymnus* (*Pullus*) *quadrillum* Yang, 1978. *nec Nephus quadrillum* Motschulsky.

別 名：*錨葉小瓢蟲*。

捕 食：菊蚜

Aphis nerii Boyer de Fonscolombe 夾竹桃蚜。

分 佈：臺灣、福建、浙江、廣東、海南、廣西；越南、菲律賓。

Scymnus (Pullus) takabayashii (Ohta) 端手小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Yu et Pang, 1991:183)

Pullus takabayashii Ohta, 1929:

捕 食：蚜蟲。

分 佈：福建(崇安)；日本。

Scymnus (Pullus) takasago Kamiya 菱端小瓢蟲 (Yang, 1978:106; Yu et Pang, 1991:183)

Scymnus (*Pullus*) *takasago* Kamiya, 1965:

捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Scymnus (Pullus) tenus Yang 長管小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Peng et al., 1997, 19(3):112; Yu et Pang, 1991183)
Scymnus (*Pullus*) *tenus* Yang, 1978:
=*Scymnus* (*Pullus*) *longisiphonulus* Cao et Xiao, 1984:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、雲南；越南。

Scymnus (Pullus) toxosiphonius Pang et Huang 箭管小瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:221; Pang et Huang, 1986:62; Yu et Pang, 1991:183)
Scymnus (*Pullus*) *toxosiphonius* Pang et Huang, 1986:62-63.
捕 食 性。
分 佈：福建(連城)。

Scymnus (Pullus) trimaculatus Yu et Pang 三斑小瓢蟲 (Yu et Pang, 1994:209)
Scymnus (*Pullus*) *trimaculatus* Yu et Pang, 1994:209.
捕 食 性。
分 佈：雲南(西雙版納)。

Scymnus (Pullus) tympanus Yu et Pang 鼓膜小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):112)
Scymnus (*Pullus*) sp., Yu et Pang, 1992:
Scymnus (*Pullus*) *tympanus* Yu et Pang, 1992:
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南。

Scymnus (Pullus) villis Weise 廉小瓢蟲 (Kamiya, 1965: ; Yang, 1978:106; Yu et Pang, 1991:183)
Scymnus (*Pullus*) *villis* Weise, 1923:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Scymnus (Pullus) xanthostethus Pang et Pu 黃胸小瓢蟲 (Pang et Pu, 1990:338)
Scymnus (*Pullus*) *xanthostethus* Pang et Pu, 1990:338.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Scymnus (Neopullus) yamato Kamiya 長突毛瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:459; ASZI et al., 1978:139; Huang et Pang, 1991:221; Li, 1997:708; Lu et al., 1989:157-160; Ma et al., 1995:225; Pang et Mao, 1979:45; Wang et al., 1989:100; Xiao et Li, 1992:372; Yu et Pang, 1991:183; Zhang, 1987[ed.] 2:19)
Scymnus (*Neopullus*) *yamato* Kamiya, 1961:
捕 食：*Aphis craccivora* Koch 豆蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米蚜
Rhopalosiphum nymphaeae Linnaeus 蓮縊管蚜

蚜蟲。

分 佈：福建、江西、廣東、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、河北、河北、北京、遼寧；日本。

Scymnus (Pullus) yangi Yu et Pang 內囊小瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):112; Peng et al., 1999:96)

=*Scymnus* (*Pullus*) *bicolor* Yang, 1978:

=*Scymnus* (*Pullus*) *vimhphuensis* Hoang, 1982:

=*Scymnus* (*Pullus*) *endocorycus* Pang et Huang, 1986:

Scymnus (*Pullus*) *yangi* Yu et Pang, 1992:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、浙江、廣東、海南；越南。

Scymnus (Pullus) sp. (Yu et Pang, 1992:17)

Scymnus (*Pullus*) sp. Yu et Pang, 1992:17.

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Scymnus sp. (Zhang, 1987[ed.] 2:19)

捕 食：苜蓿蚜。

分 佈：江西。

Scymnus sp. 小毛瓢蟲 (Huang, 1981(3):19)

Scymnus sp.

捕 食：*Aphis gossypi* Glover 棉蚜。

分 佈：湖北。

Scymnus sp. 小毛瓢蟲 (Su et al., 1986:37)

捕 食：*Pseudaulacaspis cockerelli* (Cooley) 考氏白盾蚧(白蘭)。

分 佈：廣東。

Scymnus sp. 小黑毛瓢蟲 (Chen et al., 1999, 26(1):7-12)

捕 食：*Tetranychus cinnabarinus* Boisduval 朱砂葉螨

Tetranychus truncatus Ehara 截形葉螨

Tetrancyhus urticae Koch 二斑葉螨。

分 佈：陝西。

Semiadalia decimguttata Jing 十斑彎角瓢蟲 (Jing, 1986:73)

Semiadalia decimguttata Jing, 1986:73.

捕 食 性。

分 佈：西藏(林芝)。

Semiadalia potanini (Weise) (Jing, 1986:73)

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Serangium baculum Xiao 莖骨刀角瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:369)

Serangium baculum Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:369.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Serangium drepnicum Xiao 鐮葉刀角瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:368)

Serangium drepnicum Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:368-369.

捕 食：蚜蟲(核桃)。

分 佈：湖北。

Serangium japonicum Chapin 刀角瓢蟲 (ASZI et al., 1978:132; Huang et Pang, 1991:218; Li et al., 1990:67; Pang et Mao, 1979:28; Shi et al., 1989-90:81; Xiao et Li, 1992:368; Yunn., 1987:628)

Serangium japonicum Chapin, 1940:

捕 食：蠟蚧

黑刺粉蝨

Dialeurodes citri Ashmead 柑橘粉蝨

珊瑚粉蝨

柑橘及女貞上的粉蝨和蚧蟲。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、陝西；日本。

Serangium sp. 粉白小黑瓢蟲 (Chiu et Lo, 1985:4; Lo et Chen, 1995:369)

捕 食：*Alleurocanthus spiniferus* 黑刺粉蝨

Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木蝨。

分 佈：臺灣。

Singhikalia duodecimguttata Xiao 十二斑新紅瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:378)

Singhikalia duodecimguttata Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:378-379.

捕 食 性。

分 佈：四川、湖北。

Sospita bissexnotata Jing 十二星中齒瓢蟲 (Jing, 1992:546)

Sospita bissexnotata Jing, 1992:546-547.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Sospita chinensis Mulsant 華鹿瓢蟲 (ASZI et al., 1978:156; Liu, 1963:44; 1965:44)

捕 食：蚜蟲

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇。

Sospita quadrivittata Miyatake 四條褐瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:118)

Sospita quadrivittata Miyatake, 1965:

棲 息：林地
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Sphaeroplotina hainanensis Miyatake 海南圓彩瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):104)
Sphaeroplotina hainanensis Miyatake, 1969:
捕 食 性。
分 佈：海南。

Srangium sp. 粉白小瓢蟲 (Chien, 1989:188)
捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨(卵、若蟲)
分 佈：臺灣。

Stethorus (s. str.) **aptus** Kapur 黑囊食蟎瓢蟲 (Huang, 1990[ed.]:193; Huang et Gao, 1996:135; Huang et Pang, 1991:219; Li et al., 1990:68; Lin et al., 1991:90; Pang et Mao, 1979:32; Peng et al., 1997, 19(3):104; Zhang et al., 1993(3):46-47)
Stethorus aptus Kapur, 1948:
=*Stethorus aptus tsutsuii* Nakane et Araki, 1959:
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎
柑橘葉蟎
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) 朱砂葉蟎
甘蔗葉蟎
楊桃葉蟎
桃葉蟎。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、浙江；日本、馬來西亞。

Stethorus (Allostethorus) binchuanensis Pang et Mao 賓川食蟎瓢蟲 (Pang et Mao, 1979: 36; Yunn. 1987:628)
Stethorus (*Allostethorus*) *binchuanensis* Pang et Mao, 1979:36.
捕 食：柑橘葉蟎
桃葉蟎。
分 佈：雲南。

Stethorus (s. str.) **cantonensis** Pang 廣東食蟎瓢蟲 (ASZI et al., 1978:135; Huang, 1990[ed.]:192; Huang et Gao, 1996:136; Huang et Pang, 1991:219; Li et al., 1990:69; Lin et al., 1991:90; Pang et Mao, 1979:30; Peng et al., 1997, 19(3):104; Xiao et Li, 1992:370; Zhang, 1987[ed.] 2:19)
Stethorus (s. str.) *cantonensis* Pang, 1966:
捕 食：咖啡小爪蟎
Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎
柑橘葉蟎
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) 朱砂葉蟎
甘蔗葉蟎
木瓜葉蟎
桃葉蟎

葉蟎類。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、湖北。

Stethorus (Allostethorus) chengi Sasaji 束管食蟎瓢蟲 (Chen et Wang, 1987:298; Huang, 1990[ed.]:193; Pang et Mao, 1979:34; Wen et Lee, 1981:134; Wen et al., 1993:303; Xiao et Li, 1992:370; Yu, 1997:714)
Stethorus chengi Sasaji, 1968:
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘葉蟎
Tetranychus phaselus Ehara 豆葉蟎
Tetranychus cinnabarinus Boisduval 朱砂葉蟎。
分 佈：臺灣、貴州、四川、浙江、湖北、陜西。

Stethorus (Allostethorus) convexus Yu 松突食蟎瓢蟲 (Li, 1997:715)
Stethorus (*Allostethorus*) *convexus* Yu, 1996:
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、河北、北京。

Stethorus (Parastethorus) dichiapiculus Xiao 裂端食蟎瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:370)
Stethorus (*Parastethorus*) *dichiapiculus* Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:370-371.
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 橘全爪蟎。
分 佈：四川。

Stethorus (Allostethorus) dongchuanensis Cao et Xiao 東川食蟎瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984: 124; Yunn.1987:632)
Stethorus (*Allostethorus*) *dongchuanensis* Cao et Xiao, 1984:124.
捕 食：柑橘上的葉蟎。
分 佈：雲南。

Stethorus (Parastethorus) guangxiensis Pang et Mao 廣西食蟎瓢蟲 (Huang, 1990[ed.]:194; Huang et C 1996:135; Huang, et Pang,:219; Li et al., 1990:71; Lin et al., 1991:90; Pang et Mao, 1979:37; Yin, 1980(3):67-70)
Stethorus (*Parastethorus*) *guangxiensis* Pang et Mao, 1979:37.
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 橘全爪蟎。
分 佈：福建、廣西、湖北。

Stethorus hiroshimai Sasaji 廣島食蟎瓢蟲 (Wen et al., 1993:303)
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘葉蟎。
分 佈：臺灣。

Stethorus (Parastethorus) indica Kapur 印度食蟎瓢蟲 (Cao et Xiao, 1985:346; Li et al., 1990:71; Yunn. 1987:628)
捕 食：蔭香葉蟎。
分 佈：廣西、雲南；印度。

Stethorus japonica 小黑瓢蟲 (Lo et Ho, 1970:192)
捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donn. 擬紅蟎

Panonychus citri (McGreger) 橘全爪蟎
Tetranychus cordylinicolus Lo 葉蟎
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj. 瓜葉蟎
Tetranychus hydrangeae Prit. et Bak. 葉蟎
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎
Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉蟎
Tetranychus truncatus Etr. 截形葉蟎。
分 佈：臺灣。

Stethorus loi Sasaji 羅氏小黑瓢蟲 (Chang, 1985:450; Chang et Liu, 1986:263-272; Chao et Lo, 1972:191-192; Chiu et Lo, 1985:5; Lo, 1986:31-39; Lo et Chao, 1973:177; Lo et Ho, 1970:193; Lo et Wu, 1989:182; Lo et al., 1984:342; Lo et al., 1990:166-178; Shih et al., 1991:290-300; Wen et al., 1993:303)
捕 食：*Brevipalpus obovatus* Donn. 擬紅蟎
Panonychus citri (McGreger) 橘全爪蟎(柑橘)
Tetranychus cinnabarinus Boisduval 朱砂葉蟎
Tetranychus cordylinicolus Lo 葉蟎
Tetranychus cucurbitae Rahm. et Punj. 瓜葉蟎
Tetranychus hydrangeae Prit. et Bak. 葉蟎
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎(草莓)
Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉蟎;
Tetranychus truncatus Etr. 截形葉蟎
Tetranychus urticae (Koch) 二點葉蟎(草莓)。
分 佈：臺灣。

Stethorus (s. str.) **longisiphonulus** Pang 長管食蟎瓢蟲 (Huang et Gao, 1996:135; Huang et Pang, 1991:219; Lin et Chen, 1984:126; Pang et Mao, 1979:32; Peng et al., 1997, 19(3):104)
Stethorus longisiphonulus Pang, 1966:
別 名：*長管頰瓢蟲*。
捕 食：*Tetranychus cinnabarinus* (Boisduval) 朱砂葉蟎
Tetranychus (s. str.) *urticae* Koch 二點葉蟎(木瓜葉蟎)。
分 佈：福建、廣東、海南；越南。

Stethorus (Parastethorus) malaicus Xiao 馬喇食蟎瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:371)
Stethorus (*Parastethorus*) *malaicus* Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:371.
捕 食 性。
分 佈：貴州、四川。

Stethorus (Allostethorus) parapauperculus Pang 擬小食蟎瓢蟲 (ASZI et al., 1978:135; Huang, 1990[ed.]:193; Huang et Gao, 1996:135; Huang et Pang, 1991:219; Li et al., 1990:70; Lin et Chen, 1984:126-128; Lin et al., 1991:90; Pang et Mao, 1979:35; Peng et al., 1999:93; Yunn. 1987:628; Zhuang, 1991:17)
Stethorus parapauperculus Pang, 1966:
Stethorus (*Allostethorus*) *parapauperculus* Pang et Mao, 1975:
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎

Tetranychus piercei McGreger 皮氏葉蟎
柑橘葉蟎
甘蔗葉蟎
Tetranychus phaselus Ehara 豆葉蟎
葉蟎類。
分 佈：福建、廣東、海南、廣西、雲南。

Stethorus (s. str.) **punctillum** Weise 深點食蟎瓢蟲 (ASZI et al., 1978:134; Chen et Wang, 1987:298; Chen et al., 1993:119; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Gu et al., 1996, 18(4):163-166; He et al., 1996(4):34; Huang, 1990[ed.]:192; Huang et Gao, 1996:135; Huang et Pang, 1991:219; Jiang et al., 1982 4(4):34-36; Li, 1985(1):53; Li et al., 1991:61-66; Li et al., 1990:69; Liu et Qin, 1989:92; Pang et Mao, 1979:33; Shi et al., 1989-90:83; Tian, 1995, 11(4):153-155; Xiao et Li, 1992:369; Zhang, 1987[ed.] 2:19; Zhang et al., 1993(3):46-47)

Stethorus punctillum Weise, 1891:
別 名：*深點顆瓢蟲*。
捕 食：咖啡小爪蟎
蘋果葉蟎
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) 朱砂葉蟎
梨葉蟎
Tetranychus viennensis Zache 山楂葉蟎
桑葉蟎
Eotetranychus kankitus Ehara 柑橘始葉蟎
棉葉蟎
Panonychus citri McGregor 橘全爪蟎
Tetranychus phaselus Ehara 豆葉蟎
甘蔗葉蟎
棉葉蟎
花卉葉蟎
葉蟎類。
分 佈：福建、江西、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆、遼寧、黑龍江；日本、西伯利亞至歐洲、古北區。

Stethorus (s. str.) **rani** Kapur 朗食蟎瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:219; Lin et al., 1991:90)
捕 食：*Panonychus citri* (McGregor) 柑橘全爪蟎
柑橘葉蟎。
分 佈：福建。

Stethorus (Allostethorus) shaanxiensis Pang et Mao 陝西食蟎瓢蟲 (Chen et Wang, 1987:298; Huang, 1990[ed.]:194; Pang et Mao, 1979:35)
Stethorus (*Allostethorus*) *shaanxiensis* Pang et Mao, 1979:35.
捕 食：蘋果葉蟎。
分 佈：陝西(眉縣)。

Stethorus (s. str.) **siphonulus** Kapur 腹管食蟎瓢蟲 (He et al., 1996(4):34; Huang, 1997:121; Huang, 1990[ed.]:19

Huang et Gao, 1996:135; Huang et Pang, 1991:219; Huang et al., 1988, 15(1):1-6; Huang et al., 1990, 17(2):183; Huang et al., 1991:13; Huang et al., 1995(3):50-51; Li, 1997:708; Li et al., 1990:68; Pang et Mao, 1979:31)

Stethorus siphonulus Kapur, 1948:

捕 食：*Oligonychus coffeae* (Nietner) 咖啡小爪蟎
茶黃蟎
Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎
Tetranychus cinnabarinus 朱砂葉蟎
甘蔗葉蟎
楊桃葉蟎
桃葉蟎。

分 佈：福建、廣東、廣西、浙江、湖北；馬來西亞。

Stethorus (Allostethorus) vietnamicus Hoang 越南食蟎瓢蟲 (Li et al., 1990:70; Peng et al., 1997, 19(3):105)

Stethorus (*Allostethorus*) *vietnamicus* Hoang, 1979:

捕 食：柑橘葉蟎
柚葉蟎。

分 佈：海南、廣西；越南。

Stethorus (s. str.) **wulingicus** Xiao 武陵食蟎瓢蟲 (Xiao et Li, 1992:370)

Stethorus (s. str.) *wulingicus* Xiao, *In* Xiao et Li, 1992:370.

捕 食：柏樹葉蟎。

分 佈：四川。

Stethorus (s. str.) **yingjiangensis** Cao et Xiao 盈江食蟎瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:124; Yunn., 1987:632)

Stethorus (s. str.) *yingjiangensis* Cao et Xiao, 1984:124.

捕 食：榕樹上的葉蟎。

分 佈：雲南。

Stethorus (Parastethorus) yunnanensis Pang et Mao 雲南食蟎瓢蟲 (Hung, 1990[ed.]:194; Pang et Mao, 1979: 36; Yunn., 1987:628)

Stethorus (*Parastethorus*) *yunnanensis* Pang et Mao, 1979:36.

捕 食：柑橘葉蟎
桃葉蟎。

分 佈：雲南。

Stethorus spp. 食蟎瓢蟲 (Xu et al., 1995, 17(3):121-124)

捕 食：柑橘葉蟎。

分 佈：廣東。

Sticholotis formosana Weise 麗艷瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):103)

Sticholotis formosana Weise, 1923:

Sticholotis substriatus ab. *formosana;* Korschefsky, 1933:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、海南；剛果。

Sticholotis punctata Crotch 斑點艷瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:218; Xiao et Li, 1992:368)

別 名：*十二斑艷瓢蟲*。

捕 食：柑橘蚧

分 佈：福建、貴州、湖北；日本。

Sticholotis ruficeps Weise 紅額艷瓢蟲 (ASZI et al, 1978:133; Pang et Mao, 1979:25)

Sticholotis ruficeps Weise, 1902:

捕 食：蚧蟲

分 佈：廣東；馬來西亞、密克羅尼西亞。

Sumnius brunneus Jing 紅褐粒眼瓢蟲 (Jing, 1983:403; 1992:569)

Sumnius brunneus Jing, 1983:403-404.

捕 食：草履蚧(核桃)。

分 佈：雲南(瀘水)、四川(峨眉山清音閣)。

Sumnius cordoni Weise 柄斑粒眼瓢蟲 (ASZI et al., 1978:162; Jing, 1983:403; Liu, 1965:94; Yunn. 1987: 625)

捕 食：蚧蟲。

分 佈：雲南、四川；印度。

Sumnius nigrofuscus Jing 黑褐粒眼瓢蟲 (Jing, 1983:404; 1992:569)

Sumnius nigrofuscus Jing, 1983:404-405.

捕 食 性。

分 佈：雲南(維西攀天閣)。

Sumnius petiolimaculatus Jing 柄斑粒眼瓢蟲 (Jing, 1983:405)

Sumnius petiolimaculatus Jing, 1983:405-406.

捕 食 性。

分 佈：雲南(西雙版納)。

Sumnius vestitus (Mulsant) 柄斑粒眼瓢蟲 (ASZI, 19861:479; Huang et Pang, 1991:228)

=*Sumnius cardoni* Weise

捕 食：蚧蟲。

分 佈：福建、雲南、四川；印度。

Sumnius yunnanus Mader 雲南粒眼瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:480; Liu, 1965:94; Yunn., 1987:625)

捕 食：蚧蟲。

分 佈：雲南。

Synharmonia bissexnotata (Mulsant) 十二斑和瓢蟲 (Liu, 1965:43)

捕 食：榆瘤蚜

Eriosoma lanigerum (Hausmann) 蘋果綿蚜。

分 佈：四川、山東、東北；西伯利亞。

Synharmonia conglobata (Linnaeus) 菱斑和瓢蟲 (ASZI et al., 1978:154; Li 1981:398; Liu, 1965: 42)

捕 食：*Aphis gossypii* Glover 棉蚜
木槿蚜
柳蚜
桃粉蚜
小麥蚜
Eriosoma lanigerum (Hausmann) 蘋果綿蚜
小葉楊瘤蚜
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米蚜
Melanaphis sacchari (Zehntner) 高粱蚜
薊菜蚜
菜蚜
球蚜。

分 佈：西藏、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古；蒙古、古北區。

Synharmonia contaminata Ménétriés 褐斑和瓢蟲 (Liu, 1963:42; 1965:42)

捕 食：蚜蟲

分 佈：新疆；亞洲中部。

Synharmonia octomaculata (Fabricius) 八斑和瓢蟲 (ASZI et al., 1978:154; Bai, 1994, 10(3):130; Huang et Gao, 1996:166; Liu, 1963:43; 1965: 43; Lo et Chen, 1995:369; Sun et al., 1980(4):23)

捕 食：*Diaphorina citri* Kuwayama 柑橘木蝨
Macrosiphum avenae 麥長管蚜
Macrosiphum pisi Kaltenback 豆蚜
Schizaphis graminum 麥二叉蚜
菜蚜。

分 佈：臺灣；福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、湖北；日本、菲律賓、印度、印尼、大洋洲、澳洲。

Synia melanaria Mulsant 紅項瓢蟲 (ASZI et al., 1978:148; Chen, 1993:45; Liu, 1963:64; 1965:64; Pang et Mao, 1980(2):37; Yunn., 1987:606; Zhang, 1987[ed.] 2:18)

別 名：*紅頸瓢蟲*。

捕 食：*Megacopta majuscula* Hsiao et Jin 巨豆龜蝽
蚜蟲
粉蝨。

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南；菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡。

Synonycha grandis (Thunberg) 大突肩瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:469; ASZI et al., 1978:150; Deng et al., 1987:166-168; He et al., 1991: 110; Huang, 1990[ed.]:195; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Huang et Pang, :228; Jing, 1988:286; Li et al., 1990:86; Liu, 1965:55; Lo, 1997:58; Pang et Mao, 1980(2):37; Su et al.,1986:37; Sun et al., 1984:111; Tang et al., 1995(4):168; Teng et al., 1981(1-2):51-55; Yu

et Wang, 1999:146; Yunn., 1987:606; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:18)
別 名：*大十三星瓢蟲*。
捕 食：梨木蝨
Aphis bambusae Fullaway 竹紅蚜
Aphis sacchari 黃蚜
Aphis saliceti 柳蚜
Ceratovacuna lanigera 甘蔗綿蚜
竹綿蚜
茶蚜
Trichoregma bambusifoliae 竹葉蚜
Oregma bambusicola 竹筍蚜
Oregma lanigera 蚜
蚜蟲
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
Oracella acuta (Lobdell) 濕地松粉蚧。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫)、貴州、山東、東北；日本、菲律賓、印尼、緬甸、印度、斯里蘭卡、新幾內亞。

Telsimia emarginata Chapin 整胸寡節瓢蟲 (ASZI, 1986, 1:462; ASZI et al., 1978:161; He et al., 1996(4):34; Huang, 1999[ed.]:190; Huang et Gao, 1996:161; Huang et Pang, 1991:224; Huang et al., 1988, 15(1):15-21; Liu, 1963:82; 1965:82; Pang et Mao, 1979:100; Ren et al., 1991:157; Xiao et Li, 1992:376; Yu et Pang, 1992:17; Zhang, 1987[ed.] 2:18)
Telsimia emarginata Chapin, 1926:
捕 食：*Aonidiella aurantii* Mask.
Chrysomphalus aonidum Linnaeus 褐圓蚧
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) 紅圓蚧
Hemiberlesia pitysophila Takagi 松圓突蚧
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧
Pseudaulacaspis pentagona (Targoni-Tozzetti) 桑白蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧
盾蚧。
分 佈：福建、廣東、貴州、四川、浙江、湖北。

Telsimia huiliensis Pang et Mao 會理寡節瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:102)
Telsimia huiliensis Pang et Mao, 1979:102.
捕 食：盾蚧
分 佈：四川(會理)。

Telsimia humidiphila Kapur 短葉寡節瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):116)
Telsimia humidiphila Kapur, 1969:
捕 食 性。
分 佈：海南；印度。

Telsimia jinyangiensis Pang et Mao 金陽寡節瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:102)

Telsimia jinyangiensis Pang et Mao, 1979:102.

捕 食：盾蚧。

分 佈：四川(金陽)。

Telsimia nagasakiensis Miyatake 長崎寡節瓢蟲 (Yu et Wang, 1999:84)

捕 食：蚧蟲。

分 佈：臺灣；南韓、日本。

Telsimia nigra (Weise) 裂胸寡節瓢蟲 (Liu, 1965:82)

捕 食：*Parlatoria zizyphus* (Lucas) 黑點蚧。

分 佈：福建、四川；日本。

Telsimia nigra ssp. **centralis** Pang et Mao 中原寡節瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:100)

Telsimia nigra cnetralis Pang et Mao, 1979:100.

捕 食：*Parlatoria zizyphus* (Lucas) 黑點蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧。

分 佈：四川。

Telsimia nigracentralis Pang et Mao 中原寡節瓢蟲 (Huang et Pang, :224; Xiao et Li, 1992:377)

捕 食：*Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus) 褐圓蚧
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧
黑刺粉虱。

分 佈：福建、四川、湖北。

Telsimia nitida Chapin 粉白小黑瓢蟲 (Chiu et Lo, 1985:3, 4; Wu et Tao, 1976:147)

捕 食：*Aonidiella citrina* 蚧
Aonidiella sp. 木瓜赤圓蚧
Aspidiotus deutructor Signoret 淡圓蚧
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 褐圓蚧
Lepidosaphes beckii 牡蠣蚧
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧。

分 佈：臺灣；小笠原群島、夏威夷。

Telsimia sichuanensis Pang et Mao 四川寡節瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:224; Pang et Mao, 1979:101; Peng et al., 1997, 19(3):116; Xiao et Li, 1992:377)

Telsimia sichuanensis Pang et Mao, 1979:101.

捕 食：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑白蚧
Parlatoria zizyphus (Lucas) 黑點蚧
盾蚧。

分 佈：福建、海南、廣西、四川、浙江、陜西。

Telsimia sp. 寡節瓢蟲 (Pan et al., 1987:185)

Telsimia sp. Pan et al., 1987:185.

捕 食：*Hemiberlesia pitysophila* Takagi 松突圓蚧。

分 佈：廣東。

Telsimia sp. 彎月寡節瓢蟲 (Peng et al., 1997, 19(3):116)

Telsimia sp., Peng et al., 1997, 19(3):116.

捕 食 性。

分 佈：海南。

Telsimia sp. (Zhang, 1987[ed.] 2:18)

捕 食：蚧蟲。

分 佈：江西。

Tetrabrachys kozlovi (Barovsky) 厚緣四節瓢蟲 (ASZI et al., 1978:164; Liu, 1963:95; 1965:95)

捕 食：桑蝨(卵)

Icerya purchasi Maskell 吹綿蚧(卵)(室內)。

分 佈：山西、北京；蒙古。

Thea vigintiduopunctata (Linnaeus) 二十二星菌瓢蟲 (Li, 1997:703; Liu, 1963:51; 1965:51)

Thea vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758:)

捕 食：椿樹白粉菌 *Phyllactinia corylea* (Pers.)。

分 佈：四川、河南、山東、河北、北京、新疆；古北區。

Verania sp. 十二斑兼食瓢蟲 (Wang et al., 1989:100)

捕 食：蚜蟲

分 佈：湖南。

Vibidia duodecimguattata (Poda) 十二斑菌瓢蟲 (Huang et Pang, 1991:225; Jing, 1992:547; Li, 1997:700; Liu, 1963:53; 1965:53; Pang et Mao, 1979:469; 1980(2):36; Zhang, 1987[ed.] 2:18; Zou et Zhou, 1993:175)

Vibidia duodecimguattata (Poda, 1761:)

取 食：椿樹白粉菌

桑樹白粉病

山核桃樹白粉病

(獼猴桃園)。

分 佈：福建、江西、湖南、貴州、西藏、四川、湖北、河南、陝西、河北、北京、青海、吉林；朝鮮、日本、西伯利亞、小亞細亞、歐洲，古北區。

Vibidia huiliensis Pang et Mao 會理褐菌瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:469; 1980(2):36)

Vibidia huiliensis Pang et Mao, 1979:469.

取 食：

分 佈：四川(會理)。

Vibidia korschefeskii (Mader) 哥氏褐菌瓢蟲 (Jing, 1992:547)

Vibidia korschefeskii (Mader, 1930:)
取 食：
分 佈：雲南、陝西。

Vebidia luliangensis Cao et Xiao 陸良褐菌瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:109, Xiao et Li, 1992:383)

Vebidia luliangensis Cao et Xiao, 1984:109.
取 食：蘋果白粉菌。
分 佈：雲南、四川。

Vebidia luliangensis Cao et Xiao 陸良褐菌瓢蟲 (Cao et Xiao, 1984:109)

Vebidia luliangensis Cao et Xiao, 1984:109.
取 食：蘋果白粉菌。
分 佈：雲南。

Vibidia xichangiensis Pang et Mao 西昌褐菌瓢蟲 (Pang et Mao, 1979:468; 1980(2):36)

Vibidia xichangiensis Pang et Mao, 1979:468.
捕 食 性。
分 佈：四川(西昌)。

Vibidia zhongdianensis Jing 中甸褐菌瓢蟲 (Jing, 1992:547)

Vibidia zhongdianensis Jing, 1992:547-548.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏。

Xanthadalia hiekei Iablokoff-Khnzorian 滇黃壯瓢蟲 (Jing, 1992:543)

Xanthadalia hiekei Iablokoff-Khnzorian
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Xanthadalia medogensis Jing 墨脫黃壯瓢蟲 (Jing, 1987:301)

Xanthadalia medogensis Jing, 1987:301-302.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫格當)。

Xanthadalia motuoensis Jing 墨脫黃壯瓢蟲 (Jing, 1988:285)

捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Xanthadalia xiangchengensis Jing 鄉城黃壯瓢蟲 (Jing, 1992:543)

Xanthadalia xiangchengensis Jing, 1992:543-544.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Meloidae 芫菁科

Cerocoma schaefferi Linnaeus 施氏齒角芫菁 (Huang et al., 1995:61)

寄 主：蜂巢。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、蘇聯歐洲部分。

Cissites cephalotes (Olivier) 大紅芫菁 (Chang, 1995:封面、封裏)

寄 主：熊蜂巢內寄生。

分 佈：臺灣；越南、菲律賓、馬來西亞、緬甸、印尼。

Denierella minutiserra Tan 微鋸齒爪芫菁 (Tan, 1988:289)

Denierella minutiserra Tan, 1988:289.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Denierella serrata Kaszab 灰邊齒爪芫菁 (Tan, 1992:289; Tan et Ma, 1997:737)

Denierella serrata Kaszab, 1952:

捕 食：豆科植物、泡桐等。

分 佈：福建、江西、海南、四川、湖北。

Epicauta ambusta Pall. (Tan, 1958:153)

Epicauta ambusta Pall., 1782:102.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古；蒙古、西伯利亞。

Epicauta amnnerhermi Maki 曼氏豆芫菁 (He et al., 1991:110)

捕 食：蝗卵。

分 佈：廣西。

Epicauta apicipennis Tan (Tan, 1958:153, 163)

Epicauta apicipennis Tan, 1958:153, 163.

捕 食 性。

分 佈：四川(峨眉山、重慶)。

Epicauta aptera Kaszab 無翅芫菁 (Tan, 1958:153; 1992:289; Tan et Ma, 1997:735)

Epicauta aptera Kaszab, 1952:584.

捕 食：幼蟲捕食，成蟲爲害豆科植物、甜菜、馬鈴薯、瓜類

分 佈：福建、江西、廣西、貴州、四川、浙江。

Epicauta badeni Haag (Tan, 1958:153)

Epicauta badeni Haag, 1880:78, 82.

=*Epicauta badeni* Kono, 1936:90.

捕 食 性。

分 佈：臺灣、中國大陸。

Epicauta brevitibialis Kaszab (Tan, 1958:153)

Epicauta brevitibialis Kaszab, 1952:583.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Epicauta cheni Tan (Tan, 1958:153, 162)

Epicauta cheni Tan, 1958:135, 162.

捕 食 性。

分 佈：廣西(傜山)；越南(東京)。

Epicauta chinensis Laporter 中華芫菁 (ASZI, 1986, 1:483; He et al., 1991:110; Tan, 1958:153)

Epicauta chinensis Laporter, 1840:274.

別 名：*中國豆芫菁*。

捕 食：蝗卵。

分 佈：臺灣、廣西、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、東北、黑龍江；朝鮮、日本。

Epicauta curvispina Kaszab 鉤刺豆芫菁 (Tan, 1958:153; 1992:289)

Epicauta curvispina Kaszab, 1952:578.

捕 食 性。

分 佈：福建、貴州、四川。

Epicauta dubia Fabricius 疑豆芫菁 (He et al., 1991:110; Tan, 1958:153; Tan et Ma, 1997:736; Zhang, 1987[ed.] 2:19)

Epicauta dubia Fabricius, 1781:329.

=*Epicauta sibirica* J. Lee, 1866:159.

別 名：*黑頭鋸角豆芫菁*。

捕 食：幼蟲(蝗卵)、成蟲爲害甜菜、豆科植物、馬鈴薯、瓜類等。

分 佈：江西、四川、河南、河北、北京、甘肅、內蒙古、東北；東西伯利亞。

Epicauta emmerichi Pic (Tan, 1958:154)

Epicauta emmerichi Pic, 1934:86.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Epicauta erythrocephala Pall. 紅頭豆芫菁 (Huang et al., 1995:61)

捕 食：蝗卵。

分 佈：新疆；外里海、土耳其。

Epicauta erythrocephala latelineolata Muls. et Rey (Tan, 1958:154)

Epicauta erythrocephala latelineolata Muls. et Rey, 1858:175.

捕 食 性。

分 佈：新疆；外里海、土耳其。

Epicauta gorhami Marseul 鋸角豆芫菁 (ASZI, 1986, 1:484; ASZI et al., 1978:166; Chu et Wang, 1956:61-73; He et al., 1991:110; Li et al., 1990:64; Tan, 1958:154; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

Epicauta gorhami Marseul, 1873:227.
=*Epicauta badeni,* Wien., 1905:196.
=*Epicauta areolifrons* Rett.
別 名：*豆芫菁*。
捕 食：蝗蟲(卵、若蟲)；成蟲爲害大豆、棉、蕹菜、綠豆、向日葵、芝麻、莧菜、茄、花生、馬鈴薯、甜菜、菜豆、苜蓿、紫雲英、洋槐、紫穗槐、蕃茄、稻、十字花科蔬菜。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、河南、山東；日本。

Epicauta hirticornis Haag-Rutenber 毛角豆芫菁 (ASZI, 1986, 1:484; ASZI et al., 1978:166; He et al., 1991:110; Sun et al., 1984:111; Tan, 1958:154; 1981:408; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

Epicauta hirticornis Haag-Rutenber, 1880:79, 81.
捕 食：蝗蟲(卵、若蟲)；成蟲爲害龍葵、大豆、大青、茄、黃麻、田菁。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、西藏(墨脫)、貴州、四川、河南；越南、印度。

Epicauta impressicornis Pic (Tan, 1958:154)

Epicauta impressicornis Pic, 1913:163.
捕 食 性。
分 佈：雲南；越南。

Epicauta interrupta (Fairmaire) 凹跗豆芫菁 (Tan, 1958:154; 1981:408; 1992:575)

Epicauta interrupta Fairmaire, 1889:48.
=*Epicauta desgodinsi* Friv., 1892:115.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Epicauta kwengsiensis Tan 廣西豆芫菁 (He et al., 1991:110; Li, et al., 1990:65; Tan, 1958:154, 163)

Epicauta kwengsiensis Tan, 1958:154, 163.
捕 食：蝗(卵)。
分 佈：廣西。

Epicauta laticornis Haag-Rutenberg (Tan, 1958:154)

Epicauta laticornis Haag-Rutenberg, 1880:78, 82.
捕 食 性。
分 佈：中國南部；南洋群島(Timor)。

Epicauta mannerheimi Mäkl. (Tan, 1958:154)

Epicauta mannerheimi Mäkl., 1875:623.
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、雲南；越南、喜馬拉雅。

Epicuata megalocephala Gebler 大頭豆芫菁 (ASZI,1986, 1:484; Huang et al., 1995:61; Tan, 1958:155; 1992: 575)

Epicuata megalocephala Gebler, 1817:318.

捕 食 性。

分 佈：四川、河北、北京、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、黑龍江；蘇聯(西伯利亞、哈薩克斯坦。

Epicauta obscurocephala Reitter 暗頭豆芫菁 (ASZI, 1986, 1:485; ASZI et al., 1978:614; Feng et al., 1994, 10(3):142; He et al., 1991: 111)

Epicauta obscurocephala Reitter, 1905:195.

捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗卵、幼蟲。

分 佈：江西、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、山東、山西、河北、天津、北京、寧夏、內蒙古。

Epicauta ruficeps Illiger 紅頭豆芫菁 (Hun., 1992:416; Tan, 1958:155; 1992:289; 1992:575; Tan et Ma, 1997:736; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

Epicauta ruficeps Illiger, 1880:140.

=*Epicauta plumicornis* Lap., 1840:274.

別 名：*黑毛豆芫菁*。

捕 食：幼蟲捕食性；成蟲爲害泡桐、瓜類、豆類。

分 佈：江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、湖北；馬來西亞、婆羅洲、印尼。

Epicauta sibirica Pallas 西伯利亞豆芫菁 (ASZI, 1986, 1:485; He et al., 1991:111; Huang, et al., 1995:62; Hun., 1992:416; Tan, 1958:155; 1992:289; Yunn., 1987:636)

Epicauta sibirica Pallas, 1777:23.

=*Epicauta pectinata* Geoze, 1777:701.

=*Epicauta erythrocephala* Pallas, 1782:97.

=*Epicauta flabellicornis* Germ., 1817:210.

=*Epicauta dubia* Fisch., 1824:230.

別 名：*紅頭鋸角豆芫菁*。

捕 食：蝗(卵)，幼蟲捕食性；成蟲爲害豆類、甜菜、馬鈴薯。

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、青海、浙江、湖北、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、蘇聯(西伯利亞、外貝加爾)、日本、越南、印尼。

Epicauta tibialis Waterhouse 毛脛豆芫菁 (Hun., 1992:417; Tan, 1958:155; Tan et Ma, 1997:735; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

Epicauta tibialis Waterhouse, 1871:406.

捕 食：幼蟲捕食竹蝗(卵)；成蟲爲害豆科植物、茄、莧菜、馬鈴薯、芋、竹、茶、杉、大青、辣椒、龍葵、蔬菜等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川；印度、喜馬拉雅。

Epicauta waterhousei Haag-Rutenberg 花生豆芫菁 (He et al., 1991:111; Liang, 1966:230-231; Tan, 1958:155)

Epicauta waterhousei Haag-Rutenberg, 1880:79, 81.

=*Epicauta fromosensis* Wellm., 1912:31.

捕 食：蝗(卵)。

分 佈：臺灣、福建、海南、廣西；印度。

Epicauta weixiensis Tan 維西豆芫菁 (Tan, 1992:575)

Epicauta weixiensis Tan, 1992:575-576.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Epicauta xantusi Kaszab 甜菜豆芫菁 (Tan, 1958:155; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

Epicauta xantusi Kaszab, 1952:577.

捕 食：蝗(卵)；成蟲爲害大豆、花生、甜菜、馬鈴薯、棉、茄、合萌。

分 佈：江西、四川、江蘇、上海、河北、山西。

Epicauta sp. 黑翅豆芫菁 (He et al., 1991:111)

捕 食：蝗(卵)。

分 佈：廣西。

Epicauta sp. 長斑豆芫菁 (He et al., 1991:111)

捕 食：蝗(卵)。

分 佈：廣西。

Lytta caraganae Pallas 綠芫菁 (ASZI, 1986, 1:485; He et al., 1991:111; Huang et al., 1995:62; Hun., 1992:417; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

捕 食：蝗(卵)，幼蟲捕食性；成蟲取食刺槐、紫穗槐、黃菠蘿、錦雞兒、豆類、花生、苜蓿、蠶豆、苜蓿、紅花草、油菜、花生、槐、紫穗槐、莧菜、十字花科蔬菜、梨。

分 佈：江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯(哈薩克斯坦)。

Lytta fissicollis Fairmaire 溝胸綠芫菁 (Tan, 1981:409; 1988:290; 1992:576; Yunn., 1987:636)

Lytta fissicollis Fairmaire, 1886:

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏(波密、察雅吉塘、八宿、日喀則)、四川。

Lytta impressithorax Pic 黃胸綠芫菁 (Hun., 1992:417; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

捕 食：幼蟲捕食性；成蟲爲害蠶豆、油菜、梨。

分 佈：江西、湖南、湖北。

Lytta robowskyi Dokhtouroff 西藏綠芫菁 (Tan, 1981:409; 1992:576)

Lytta robowskyi Dokhtouroff, 1887:

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川。

Lytta rubrinotata Tan 紅斑綠芫菁 (Tan, 1981:409)

Lytta tubrinotata Tan, 1981:409.

捕 食 性。
分 佈：西藏。

Lytta suturella Mostchulsky 赤帶綠芫菁 (Huang et al., 1995:62)
捕 食 性。
分 佈：新疆、北方省區；哈薩克斯坦。

Lytta taliana Pic 黃胸綠芫菁 (Tan, 1981:409; 1992:576)
Lytta taliana Pic, 1915:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Melo asperatus Tan 額窩短翅芫菁 (Tan, 1981:410)
捕 食 性。
分 佈：西藏(西絨寺)。

Melo autumnalis Oliver 細刻短翅芫菁 (Tan et Ma, 1997:738)
Melo autumnalis Oliver, 1792:
捕 食 性。
分 佈：湖北；歐洲中部及南部、奧地利、英國。

Meloe brevicollis Panzer 闊胸地膽 (Tan, 1996:108; Zhang, 1987[ed.] 2:20)
Meloe brevicollis Panzer, 1793:15.
別 名：*短胸短翅芫菁*。
捕 食：蜂類幼蟲；成蟲為害十字花科蔬菜。
分 佈：江西。

Meloö (s. str.) **erythrocnemus** Pallas 紅足短翅芫菁 (Huang et al., 1995:62)
捕 食 性。
分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞、高加索、蘇聯歐洲部分。

Meloö medogensis Tan 墨脫短翅芫菁 (Tan, 1988:290)
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Meloö modestus Fairmaire 隆背短翅芫菁 (Tan, 1981:410; 1992:577)
Meloö modestus Fairmaire, 1887:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Meloö patellicornis Fairmaire 碟角短翅芫菁 (Tan, 1992:577; Yunn., 1987:635; Zhang, 1987[ed.] 2:20)
Meloö patellicornis Fairmaire, 1887:
捕 食：花蜂屬(*Anthophora*)及雙翅目幼蟲；成蟲為害棉、苜蓿、紫雲英、蘿蔔、蠶豆、

小麥、甘薯、豌豆、辣椒、半邊蓮。
分 佈：江西、雲南、四川、江蘇、安徽、山西、河北、北京。

Meloö (Pros.) proscarabaeus Linnaeus 曲角短翅芫菁 (Huang et al., 1995:62; Tan, 1981:410; 1992: 577)
Meloö (*Pros.*) *proscarabaeus* Linnaeus, 1758:
捕 食 性。
分 佈：西藏(察隅)、四川、安徽、新疆、東北；朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

Meloö subcordicollis Fairmaire 心胸短翅芫菁 (Hun., 1992:418; Tan, 1981:410; 1992:290; Zhang, 1987[ed.] 2:20)
捕 食：蜂類；成蟲爲害十字花科蔬菜等。
分 佈：江西、湖南、貴州、雲南、西藏(樟木)、甘肅、內蒙古。

Meloö (s. str.) **succius** Rossi 圖申短翅芫菁 (Huang et al., 1995:62)
捕 食 性。
分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞、南高加索、蘇聯歐洲部分。

Mylabris (Tigr.) atrata Pallas 小花斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)
捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古阿泰西北部、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克、克里米亞、高加索、自匈牙利至烏拉爾的南歐草原。

Mylabris (Arg.) audouini Mars. 毯斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)
捕 食 性。
分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞。

Mylabris axillaris Billberg 腋斑芫菁 (ASZI, 1986, 1:486)
捕 食 性。
分 佈：江蘇、湖北、河北、北京、新疆、內蒙古；埃及、敘利亞。

Mylabris (Tigr.) biguttata Gebl. 二斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)
捕 食 性。
分 佈：新疆南部；哈薩克、烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯、阿富汗。

Mylabris bistillata Tan 雙滴斑芫菁 (Tan, 1981:407; 1992:576)
Mylabris bistillata Tan, 1981:407.
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Mylabris calida Pallas 蘋斑芫菁 (ASZI, 1986, 1:486; ASZI et al., 1978:166; He et al., 1991:111)
捕 食：蝗蟲(卵)(若蟲)。
分 佈：江蘇、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、新疆、內蒙古、黑龍江；蘇聯(中亞細亞、高加索、伏爾加河下游地區)、阿爾巴尼亞、突尼斯、埃及、希

臘、小亞細亞、敘利亞、伊朗、阿富汗。

Mylabris cichorii Linnaeus 眼斑芫菁 (ASZI, 1986, 1:486; ASZI et al., 1978:167; He et al., 1991:111; Hun., 1992:417; Li et al., 1990:65; Sun et al., 1984:111; Tan, 1992:289; Tan et Ma, 1997:737; Yunn., 1987:636; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

捕 食：蝗(卵)，幼蟲捕食性；成蟲爲害蘋果、瓜類、豆類的花器，蕃茄、花生、馬鈴薯、棉、綠豆、大豆、泡桐、向日葵的葉子。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、山東、河北、北京、甘肅、新疆、黑龍江；越南、印度。

Mylabris (Eumyl.) cricata Pallas 藏紅花斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；南西伯亞草原、南外貝加爾、蘇聯歐洲部分南部、伊朗、敘利亞。

Mylabris (Chalc.) coerulescens Gebl. 天藍斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、伊朗、阿富汗。

Mylabris (Amm.) elegantissima Zubk. 沙丘斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古；哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼、伊朗、阿富汗。

Mylabris (Chalc.) festova Pallas 飾裝斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；西西伯利亞、蒙古西部、哈薩克斯坦、巴爾幹半島、蘇聯歐洲部分東部。

Mylabris (Chalc.) frolovi Germ. 草原斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古；哈薩克斯坦、中亞細亞、伊朗、阿富汗。

Mylabris (Micr.) geminata Fabricius 對生斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、蘇聯歐洲部分。

Mylabris guatuordecimpunctata Pall. 十四點斑芫菁 (Wumaerbicke, 1994:293-294)

捕 食：*Paracyptera microptera microptera* (F.-W.)　小翅曲背蝗(卵)。

分 佈：新疆。

Mylabris hingstoni Blair 長角斑芫菁 (Tan, 1981:406)

捕 食 性。

分 佈：西藏[青藏高原特有種]。

Mylabris hirta Tan 多毛斑芫菁 (Tan, 1992:289; 1992:576)

Mylabris hirta Tan, 1992:576-577.

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、湖北。

Mylabris (Chalc.) intermedia Fischer 中間斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦。

Mylabris (Tigr.) khodjentica Ball. 霍氏斑芫菁 (Hunag et al., 1995:64)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼斯坦。

Mylabris (Chalc.) koenigi Dokht. 柯氏斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞、伊朗、阿富汗。

Mylabris (Chalc.) ledebouri Gebl. 李氏斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯坦。

Mylabris longiventris Blair 擬高原斑芫菁 (Tan, 1981:406)

捕 食 性。

分 佈：西藏[青藏高原特有種]。

Mylabris macilenta Marseul 瘦斑芫菁 (Tan, 1981:407)

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Mylabris (Eumyl.) magnoguttata Heyd. 粗點斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞、伊朗、阿富汗。

Mylabris (Lachn.) mannerheimi Gebl. 曼氏斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞。

Mylabris (Chalc.) monozona Wellm 單紋斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦。

Mylabris (Arg.) ocellata Pallas 瞳點斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞。

Mylabris phalerata Pallas 大斑芫菁 (ASZI, 1986, 1:487; ASZI et al., 1978:167; He et al., 1991:111; Hun., 1992:418; Sun et al., 1984:111; Tan, 1981:407; 1988:289; 1992:577; Yunn., 1987:637; Zhang, 1987[ed.] 2:20)

Mylabris phalerata Pallas, 1781:

捕 食：幼蟲捕食性，取食蝗蟲卵；成蟲爲害油桐、油茶、瓜類、茄、豆類、刺莧、番茄、綠豆、大豆、花生、向日葵、芝麻、棉花等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(墨脫、察隅)、浙江、江蘇、湖北、河南、山東；印度。

Mylabris (Tigr.) polymorpha Pallas 花斑芫菁 (Hunag et al., 1995:64)

捕 食 性。

分 佈：新疆；西西伯利亞、哈薩克斯坦、小亞細亞、土庫曼、高加索、南烏拉爾、敘利亞、阿爾及利亞、南歐、蘇聯歐洲部分南部。

Mylabris przewalskyi Dokhtouroff 高原斑芫菁 (Tan, 1981:405; 1992:577)

Mylabris przewalskyi Dokhtouroff, 1887:

捕 食：藏黃芪、野豌豆、鳶尾。

分 佈：西藏[青藏高原特有種]、四川。

Mylabris (Chalc.) pulchella Fald. 美斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；蒙古、哈薩克斯坦。

Mylabris (Micr.) pusilla Ol. 小斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、浙江、江蘇、安徽、湖北、河北、新疆；蒙古、西伯利亞、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯、巴爾幹半島、蘇聯歐洲部分南部、意大利。

Mylabris pustulata Thunberg 擬大斑芫菁 (Yunn., 1987:637)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Mylabris (s. str.) **quadripunctata** Linnaeus 四點斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；蒙古西南部、哈薩克斯坦東南部、中亞細亞、阿富汗、伊朗。

Mylabris (Micr.) quadrisignata Fischer 四紋斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦(天山山脈)。

Mylabris (Tigr.) quatuordecimpunctata Pallas 十四點斑芫菁 (Hunag et al., 1995:64)

捕 食 性。

分 佈：新疆；西伯利亞西部和中部草原、北高加索、蘇聯歐洲部分南部和東部。

Mylabris (Tigr.) scabiosae Ol. 山蘿蔔斑芫菁 (Hunag et al., 1995:64)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞、小亞細亞、高加索、巴爾幹半島、蘇聯歐洲部分東南部。

Mylabris schonherri Billberg 曲斑芫菁 (Zhang, 1987[ed.] 2:20)

捕 食：蝗(卵)；成蟲爲害南瓜、絲瓜、花生、大豆、綠豆、菜豆。

分 佈：江西。

Mylabris schrencki Gebl. 什任克斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克、土庫曼、烏茲別克斯坦、伊朗、阿富汗。

Mylabris (Arg.) sedecimpunctata Gebl. 十六點斑芫菁 (Hunag et al., 1995:62)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞、阿富汗、伊朗、埃及。

Mylabris (Micr.) sibirica Fischer 西伯利亞斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古；西伯利亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦；蘇聯歐洲部分東南部。

Mylabris splendidula Pallas 小斑芫菁 (He et al., 1991:111)

捕 食：蝗(卵)

分 佈：廣西。

Mylabris (Micr.) steppensis Dokht. 乾草原斑芫菁 (Huang et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克、烏茲別克、塔吉克、吉爾吉斯斯坦。

Mylabris (Chrys.) trifascis Pallas 三帶斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞、阿富汗、伊朗。

Mylabris (Mon.) undecimpunctata Fischer 十一點斑芫菁 (Hunag et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、中亞細亞。

Mylabris (s. str.) **variabilis** Pallas 變色斑芫菁 (Huang et al., 1995:63)

捕 食 性。

分 佈：新疆；哈薩克斯坦、土庫曼、小亞細亞、北非、南歐、伊朗、蘇聯歐洲部分南部。

Oreomeloe spinulus Tan 針爪高山芫菁 (Tan, 1981:411)

Oreomeloe spinulus Tan, 1981:411.

捕 食 性。

分 佈：西藏(西絨寺、聶拉木)。

Stenodera foveicollis Fairmaire 黑頸紅芫菁 (Zhang, 1987[ed.] 2:21)

捕 食：蝗(卵)；成蟲爲害油菜花、梨花。

分 佈：江西。

Zonitis bomiensis Tan 波密帶櫛芫菁 (Tan, 1988:290)

Zonitis bomiensis Tan, 1988:290.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密、林芝)。

Pyrochroidae 赤翅甲科

Phyllocladus magnificus Blromichi 紅葉赤翅甲 (Ma, 1997:739)

Phyllocladus magnificus Blromichi, 1929:

捕 食 性。

分 佈：湖北；緬甸。

Pseudopyrochroa taiwana Kono 脊偽赤翅甲 (Ma, 1997:739)

Pseudopyrochroa taiwana Kono, 1929:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖北。

Pyrochroa serraticornis Scopoli 櫛赤翅甲 (Ma, 1997:739)

Pyrochroa serraticornis Scopoli, 1922:

捕 食 性。

分 佈：湖北；歐洲。

Anthicidae 蟻形甲科

Anthicus floralis (Linnaeus) 穀蟻形甲 (Hun., 1992:375)

捕 食：取食腐植質、真菌，也捕食蟎類和小昆蟲，還在穀倉、草堆、栗、薯類等貯藏物中發現。

分 佈：湖南。

Anthicus sp. 赤胸蟻形甲 (Gu, 1988:175)

捕 食：寄居于木棉花、捕食性。

分 佈：廣東。

Cetoniidae 花金龜科

Campsiura mirabilis (Faldermann) 黃邊食蚜花金龜 (Zhang et Lü, 1987:82-83)

捕 食：(成蟲捕食)*Aphis glycines* Matsumura 大豆蚜

Aphis pomi De Geer 蘋蚜

Aphis gossypii Glover 棉蚜

Aphis laburni Kaltenbech 槐蚜

Aphis sacchari (Zehntner) 高粱蚜

Hyalopterus arundinis (Fabricius) 桃粉蚜

Lachnus tropicalis vander Goot 楝大蚜

Macrosiphum granarium (Kirby) 麥長管蚜

Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜

Prunomyzus sakurae Matsumura 蘋果疣蚜

Rhopalosiphum pseudobrassicae (Davis) 蘿蔔蚜

Rhopalosiphum maidis Fitch 玉米蚜

Rhopalosiphum prunifolicae (Fitch) 黍縊蚜

Schizaphis graminum (Rondani) 麥二叉蚜

Schizaphis piricola Matsumura 梨二叉蚜

Tetraneura ulmi (Linnaeus) 榆四條綿蚜。

分 佈：雲南、四川、遼寧。

Cerambycidae 天牛科

Oberea ? erythrocephala Shrank 乳漿大戟草天牛 (Pemberon et Wang, 1989:64-67)

寄 主：*Euphorbia esula* 乳漿大戟草(大戟科 Euphorbiaceae)

分 佈：內蒙古。

Chrysomelidae 葉甲科

Agasicles hygrophila Selman et Vogt. 空心蓮子草葉甲 (Ding, 1995, 11(3):129-133; Li et Wang, 1994, 10(1):11-14 Wang et Wang, 1987: ; Wang et al., 1988:14-17; Wu, 1994:43-46; Wu, 1994:47-51; Wu et al., 1994:98-100; Wu et al., 1993:127128; Wu et al., 1994:46-50; 413-418; Wu et Zeng, 1994:37-42;)

Agasicles hygrophila Selman et Vogt.,

寄 主：*Alternanthera philoxeroides* (Mart) Gris 空心蓮子草(莧科，多年生惡性雜草，農業及水產養殖業大危害)。

分 佈：臺灣、福建、南方各省；南美(原產)。

Anadimonia potanini Ogloblin 凹胸螢葉甲 (Lin, 1990:95)
寄 主：*Rumex patientia* Linnaeus　巴天酸模(田園雜草)。
分 佈：安徽。

Aphihona chinchihi Chen 乳漿大戟草葉甲 (Pemberon et Wang, 1989:64-67)
寄 主：*Euphorbia esula*　乳漿大戟草(大戟科 Euphorbiaceae)。
分 佈：內蒙古。

Aphihona seriata Chen 葉甲 (Pemberon et Wang, 1989:64-67)
寄 主：*Euphorbia esula*　乳漿大戟草(大戟科 Euphorbiaceae)。
分 佈：內蒙古。

Altica cirsicola　薊跳甲 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)
寄 主：*Cirsium arense* (L.) Scop.　薊(葉、莖)。
分 佈：新疆。

Gastrophsa atrocyanea Motschulsky 萹蓄角脛葉甲 (Lei et al., 1994, 16(2):51-55; Lin, 1985(2):52; Lin 1990, 6(2):95; Wang, 1983, (2):47-48; Wang et Chen, 1988, 4(4):184-185)
Gastrophsa atrocyanea Motschulsky
別 名：*羊蹄齒脛葉甲*。
寄 主：*Rumex patientia* Linnaeus　巴天酸模(田園雜草)
萹蓄(麥田萹蓄科雜草)。
分 佈：江蘇、安徽。

Lema scutellaris (Kraatz) 尖盾負泥蟲 (Lin, 1985(2):52; Liu et al., 1999, 15(1):45, Ma et al., 1996, 12(4):174-177; Zhang et al., 1994, 20(3):50; Zhang et al., 1996, 23(3):283-284)
Lema scutellaris (Kraatz)
寄 主：*Commelina cammunis* Linnaeus　鴨跖草(大豆、小麥田雜草)。
分 佈：黑龍江(建三江)。

Ophraella communa LeSage 臺灣豬草葉甲 (Wang et Chiang, 1998:185)
Ophraella communa LeSage, 1986:
寄 主：豬草(*Ambrosia artemisiifolia* Linnaeus)
豬草 *Ambrosia psilostachya* DC.
豬草 *Ambrosia confertiflora* DC.
草 *Iva axillaris* Pursh
草 *Ratoboda pinnata* (Vent.) Barnh.
蒼耳(*Xanthium strumarium* Linnaeus)
銀膠菊(*Parthenium hysterophorus* Linnaeus)
向日葵(*Helianthus annuus* Linnaeus)。
分 佈：臺灣(包括金門)；美洲(原產)。

Zygogramma suturalis (Fabricius) 豚草條紋葉甲 (Guan, 1987:175-178; Huang, 1985:62-65; 1987: ; Wan et Wang, 1988:24-25; Wan et Wang, 1989:71-75; Wan et Wang, 1990:8-12; 64-67; 145-147; Wan et al., 1989:20-23)

Zygogramma suturalis (Fabricius)

寄 主：*Ambrosia artemisiifolia* Linnaeus 豚草

菊科，農田雜草，其花粉能引起人類的過敏反應症，成爲世界性公害。我國的江西、江蘇、湖北、山東、河北、吉林、遼寧等省蔓延爲害。

分 佈：1986 中國農科院生防室從蘇聯、加拿大引進；墨西哥(原產)、美國、加拿大。

Curculionidae 象甲科

Bagous sp. 萍象甲 (Lin, 1986[ed.]:308)

寄 主：萍芽。

分 佈：浙江。

Cixus acutipennis 尖筒喙象 (Lin, 1985(2):52)

Cixus acutipennis

寄 主：黃花蒿(棉田雜草)。

分 佈：江蘇(沿海)。

Cleonus piger 歐洲方喙象 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)

寄 主：*Cirsium arense* (L.) Scop. 薊(根)。

分 佈：新疆。

Larinus planus 菊花象甲 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88; Jiang, 1994, 10(1):10)

寄 主：*Cirsium segelum* Bunge 小薊種子、地下莖

Cirsium arense (L.) Scop. 薊(花)。

分 佈：河南、新疆。

Larinus tarbinatas 薊花象甲 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)

寄 主：*Cirsium arense* (L.) Scop. 薊(花)。

分 佈：新疆。

Lemascut uaris 小爪象甲 (Lin, 1985(2):52)

Lemascut uaris

寄 主：菟絲子(大豆)。

分 佈：湖南、江蘇。

Lixus depressipennis 扁翅筒喙象 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)

寄 主：*Cirsium arense* (L.) Scop. 薊(莖)。

分 佈：新疆。

Neochetina eichhorniae Warner 布袋蓮象甲 (Chiang, 1996:159; Ding et al., 1994, 9(2):49-51; Ding et al., 1998, 14(1):7-10; Shih et al., 1994:207-216)

Neochetina eichhorniae Warner
寄 主：*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms. 布袋蓮，水葫蘆(原產巴西)。
分 佈：臺灣；巴西。

Sphenophorus sp. 蒲草楔象 (Yang et Zhang, 1987:44)
寄 主：蒲草(*Typha angustifolia* Linnaeus)(稻、麥田主要雜草)。
分 佈：新疆(阿勒泰地區額爾齊期河沿岸水旱輪作區)。

Anthribidae 長角象科

Anthribus lajievorus Chao 蠟蚧長角象 (Hun., 1992:616; Wang, 1987[ed.]:360-361; Yunn., 1987:796; Zhang, 1997:948)
捕 食：幼蟲捕食白蠟蟲(*Ericerus pela* Chavannes)卵。
分 佈：湖南、雲南、四川、貴州、浙江。

Anthribus niveovariegatus (Roelofs) 白蠟蚧長角象 (Chao, 1982:94)
寄 主：*Eroceris pela* (Chavannes) 白蠟蟲
Kermes vastus Kuwana 大絳蚧。
分 佈：四川。

Scolytidae 小蠹科

Thamnurgus cauccsicus 小蠹(Ding et al., 1994, 10(2):87-88)
寄 主：*Cirsium arense* (L.) Scop. 薊(根)。
分 佈：新疆。

STREPSIPTERA 撚翅目

Xenidae 大蜂蝙科

Vespaexenos moutoni (Buysson) (Yang, 1955:527)
Vespaexenos moutoni (Buysson, 1903:)
寄 主：*Vespa mandarina* Smith
Vespa magnifica Smith
Vespa nigrans Buysson.
分 佈：雲南、安徽。

Stylopidae 蜂蝙科

Stylops (Prostylps) pilipedis Pierce (Yang, 1955:527)
Stylops (*Prostylps*) *pilipedis* Pierce, 1911:
寄 主：*Andrena pilipes* Fabricius.
分 佈：北京。

Elenchidae 跗蝙科

Elenchinus japonicus Esaki et Hashimoto 稻虱跗蝙 (ASZI, 1986, 1:749; Gu et al., 1990:174-181; 1994: 317-322; He et al., 1991:69; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Sun et al., 1980(4):22)

寄 主：*Nilaparvata lugens* (Stål) 褐飛虱(成蟲、若蟲)
Sogatella furcefera (Horvàth) 白背飛虱(成蟲、若蟲)
Laedelphax striatella (Fallén) 斑飛虱(成蟲、若蟲)。

分 佈：福建、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、安徽、湖北、陝西；日本。

Halictophagidae 櫛蝙科

Halictophagus bipunctatus Yang 二點櫛蝙 (ASZI, 1986, 1:747; ASZI et al., 1978:272; He et al., 1991:69; Sun et al., 1980(4):22; Yang, 1955:328; Zhang, 1987[ed.] 2:3)

寄 主：*Nephotettix virescens* (Distant) 原黑尾葉蟬(成蟲、若蟲)
Nephotettix cincticeps (Uhler) 僞黑尾葉蟬(成蟲、若蟲)。

分 佈：福建、江西、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西。

Halictophagus chinensis Bohart 中國櫛蝙 (ASZI et al., 1978:273; Zhang, 1987[ed.] 2:3)

Halictophagus chinensis Bohart, 1943:

寄 主：*Cicadella ferruginea* Fabricius 黑尾大葉蟬。

分 佈：江西、廣東、廣西、浙江。

Halictophagus gressitti Bohart 葛利斯櫛蝙 (Yang, 1955:527)

Halictophagus gressitti Bohart, 1943:

寄 主：*Tituria chinensis* Distant

分 佈：海南。

Halictophagus indicus Bohart 印度櫛蝙 (ASZI, 1986, 1:747)

寄 主：檬果葉蟬。

分 佈：海南；印度。

Halictophagus spectrus Yang 透斑櫛蝙 (ASZI, 1986, 1:747; ASZI et al., 1978；273; He et al., 1991:69)

=*Halictophagus helleri* Kinzelbach

寄 主：白大葉蟬。

分 佈：廣西、雲南、四川；斯里蘭卡。

Halictophagus sp. 白翅葉蟬櫛蝙 (He et al., 1991:70)

寄 主：*Thaia subrufa* (Motschulsky) 黃稻白翅葉蟬。

分 佈：福建、雲南。

Tridactylophagus sinensis Yang 中華蚤螻蝙 (ASZI et al., 1978:273; Yang, 1964:607)

Tridactylophagus sinensis Yang, 1964:407.

寄 主：*Tridactylus japonicus* De Haan 蚤螻。

分 佈：北京。

Tridactyloxenos coniferus Yang 擬蚤螻蝙 (ASZI, 1986, 1:748; ASZI et al., 1978:274; Yang, 1964:608)

Tridactyloxenos coniferus Yang, 1964:608.

寄 主：*Tridactylus japonicus* De Haan　蚤螻

Tridactylus sp.　蚤螻。

分 佈：河北、北京。

MECOPTERA 長翅目

Bittacidae 蚊蛉科

Bittacus appendiculatus Esb.-Pet. 雲南蚊蛉 (Yunn., 1987:508)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Bittacus piel Navás 蚊褐蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:64)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Bittacus sinensis Walker 中華蚊蛉 (ASZI, 1986, 1:766; Ma et Xu, 1995:275)

捕 食：盲蝽

菜蛾。

分 佈：浙江、江蘇；朝鮮。

Panorpidae 蝎蛉科

Neopanorpa abstrusa Zhou et Wu 暗新蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:275)

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Neopanorpa brevivalvae Chou et Wang 短瓣蝎蛉 (Chou et al., 1988:38)

Neopanorpa brevivalvae Chou et Wang, 1988:38.

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Neopanorpa brisi (Navás) 布縷新蝎蛉 (Yunn.1987:508)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neopanorpa carpenteri Cheng 卡本特新蝎蛉 (Chou et al., 1988:39)

Neopanorpa carpenteri Cheng

捕 食 性。

分 佈：廣東、湖南。

Neopanorpa caveata Cheng 網翅新蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:275)

捕 食 性。

分 佈：福建、浙江。

Neopanorpa clara Chou et Wang 顯斑新蝎蛉 (Chou et al., 1988:37)

Neopanorpa clara Chou et Wang, 1988:37.

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Neopanorpa dimidiata Navás 半斑新蝎蛉 (Yunn.1987:508)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neopanorpa dubis Chou et Wang 疑似小新蝎蛉 (Chou et al., 1988:34; Yao et Yang, 1997:974)

Neopanorpa dubis Chou et Wang, 1988:34.

捕 食 性。

分 佈：湖南(莽山)、四川。

Neopanorpa huangshana Cheng 黃山新蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:274)

捕 食 性。

分 佈：浙江、安徽。

Neopanorpa lacunaris Navás 窗點新蝎蛉 (Yunn., 1987:508)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neopanorpa lui Chou et Ran 路氏新蝎蛉 (Chou et al., 1981:17)

Neopanorpa lui Chou et Ran, 1981:17.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Neopanorpa magna Chou et Wang 大新蝎蛉 (Chou et al., 1988:34)

Neopanorpa magna Chou et Wang, 1988:34.

捕 食 性。

分 佈：湖南(莽山、東安)。

Neopanorpa mangshanensis Chou et Wang 莽山新蝎蛉 (Chou et al., 1988:36)

Neopanorpa mangshanensis Chou et Wang, 1988:36.

捕 食 性。

分 佈：湖南(莽山)。

Neopanorpa minuta Chou et Wang 小新蝎蛉 (Chou et al., 1988:31)

Neopanorpa minuta Chou et Wang, 1988:31.

捕 食 性。

分 佈：湖南(莽山)。

Neopanorpa moganshanensis Zhou et Wu 莫干山新蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:275)

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Neopanorpa mutabilis Cheng 萌帶新蝎蛉 (ASZI, 1986, 1:765)

捕 食 性。

分 佈：福建。

Neopanorpa ovata Cheng 卵翅新蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:274)

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Neopanorpa puripennis Chou et Wang 淨翅新蝎蛉 (Chou et al., 1988:32)

Neopanorpa puripennis Chou et Wang, 1988:32.

捕 食 性。

分 佈：湖南(道縣)。

Neopanorpa retina Chou et Li 網紋新蝎蛉 (Chou et al., 1988:35)

Neopanorpa retina Chou et Li, 1988:35.

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Neopanorpa tienmushana Cheng 天目新蝎蛉 (ASZI, 1986, 1:764; Ma et Xu, 1995:275)

捕 食：竹粉蝨
竹蚜
竹蚧
竹螟。

分 佈：浙江。

Neopanorpa tienpingshana Chou et Wang 天平山新蝎蛉 (Chou et al., 1988:33; Yao et Yang, 1997:974)

Neopanorpa tienpingshana Chou et Wang, 1988:33.

捕 食 性。

分 佈：湖南(天平山、莽山)、湖北。

Neopanorpa sp. 新蝎蛉 (Chen, 1996, 18(1):21)

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Panorpa anrenensis Chou et Wang 安仁蝎蛉 (Chou et al., 1987:204)

Panorpa anrenensis Chou et Wang, 1987:204.

捕 食 性。

分 佈：湖南(安仁)。

Panorpa aurea Cheng 金身蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:274)

捕 食 性。

分 佈：福建、浙江。

Panorpa bicornifera Chou et Wang 二角蝎蛉 (Chou et al., 1981:16)

Panorpa bicornifera Chou et Wang, 1981:16.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa bifasciata Chou et Wang 雙帶蝎蛉 (Chou et al., 1981:10)

Panorpa bifasciata Chou et Wang, 1981:10.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa chengi Chou 鄭氏蝎蛉 (Chou et al., 1981:16)

Panorpa chengi Chou, 1981:16.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa decolorata Chou et Wang 淡色蝎蛉 (Chou et al., 1981:10)

Panorpa decolorata Chou et Wang, 1981:10.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panor a dubia Chou et Wang 擬華山蝎蛉 (Chou et al., 1981:13)

Panorpa dubia Chou et Wang, 1981:13.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa emarginata Cheng 華山蝎蛉 (ASZI, 1986, 1:764; Chou et al., 1981:12)

Panorpa emerginata Cheng, 1948:140.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa filina Chou et Wang 女兒蝎蛉 (Chou et al., 1987:203)

Panorpa filina Chou et Wang, 1987:203.

捕 食 性。

分 佈：湖南(道縣)。

Panorpa fulvastra Chou 淡黃蝎蛉 (Chou et al., 1981:4)

Panorpa fulvastra Chou, 1981:4.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa guidongensis Chou et Li 桂東蝎蛉 (Chou et al., 1987:208)

Panorpa guidongensis Chou et Li, 1987:208.

捕 食 性。

分 佈：湖南(八面山)。

Panorpa kimminsi Carpenter 濟民蝎蛉 (ASZI, 1986, 1:762)

捕 食 性。

分 佈：四川。

Panorpa leei Cheng 李氏蝎蛉 (Chou et al., 1981:11)

Panorpa leei Cheng, 1949:147.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa lutea Carppenter 黃翅蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:174)

捕 食 性。

分 佈：浙江、安徽。

Panorpa magna Chou 大蝎蛉 (Chou et al., 1981:3)

Panorpa magna Chou, 1981:3.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa mangshanensis Chou et Wang 莽山蝎蛉 (Chou et al., 1987:205)

Panorpa mangshanensis Chou et Wang, 1987:205.

捕 食 性。

分 佈：湖南(莽山)。

Panorpa nanwutaina Chou 南五臺褐蛉 (Chou et al., 1981:15)

Panorpa nanwutaina Chou, 1981:15.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa neospinosa Chou et Wang 新刺蝎蛉 (Chou et al., 1981:7)

Panorpa neospinosa Chou et Wang, 1981:7.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa obliquifascia Chou et Wang 斜帶蝎蛉 (Chou et al., 1987:206)

Panorpa obliquifascia Chou et Wang, 1987:206.

捕 食 性。

分 佈：湖南(莽山)。

Panorpa obtusa Cheng 太白蝎蛉 (Chou et al., 1981:14)

Panorpa pbtusa Cheng, 1949:142.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa pingjiangensis Chou et Wang 平江蝎蛉 (Chou et al., 1987:207)

Panorpa pingjiangensis Chou et Wang, 1987:207.

捕 食 性。

分 佈：湖南(平江)。

Panorpa qinlingensis Chou et Ran 秦嶺蝎蛉 (Chou et al., 1981:9)

Panorpa qinlingensis Chou et Ran, 1981:9.

捕 食 性。

分 佈：陝西(秦嶺)。

Panorpa quadrifasciata Chou et Wang 四帶蝎蛉 (Chou et al., 1987:201)

Panorpa quadrifasciata Chou et Wang, 1987:201.

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Panorpa reni Chou 任氏蝎蛉 (Chou et al., 1981:4)

Panorpa reni Chou, 1981:4.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa sexspinosa Cheng 六刺蝎蛉 (ASZI, 1986, 1:763; Chou et al., 1981:5)

Panorpa sexspinosa Cheng, 1949:145.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa sexspinosa zhongnanensis Chou et Ran 六刺蝎蛉(終南亞種)(Chou et al., 1981:6)

Panorpa sexspinosa zhongnanensis Chou et Ran, 1981:6.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa shanyangensis Chou et Wang 山陽蝎蛉 (Chou et al., 1981:8)

Panorpa shanyangensis Chou et Wang, 1981:8.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Panorpa subambra Chou et Tong 淡珀蝎蛉 (Chou et al., 1987:202)
Panorpa subambra Chou et Tong, 1987:202.
捕 食 性。
分 佈：湖南(天平山)。

Panorpa subaurea Chou et Li (Chou et al., 1987:203)
Panorpa subaurea Chou et Li, 1987:203.
捕 食 性。
分 佈：湖南(莽山)。

Panorpa tetrazonia Navás 四段蝎蛉 (Ma et Xu, 1995:274; Zhang, 1987[ed.] 2:64)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：江西、浙江。

Panorpa tincta Navás 染翅蝎蛉 (ASZI, 1986, 1:762; Chou et al., 1981:2)
捕 食 性。
分 佈：陝西、甘肅。

Panorpa tjederi Carpenter 雲南蝎蛉 (Yunn., 1987:508)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Panorpa tritaenia Chou et Wang 三帶蝎蛉 (Chou et al., 1987:207)
Panorpa tritaenia Chou et Wang, 1987:207.
捕 食 性。
分 佈：湖南(天平山)。

Panorpa yangi Chou 楊氏蝎蛉 (Chou et al., 1981:8)
Panorpa yangi Chou, 1981:8.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Panorpa sp. 斑翅蝎蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:64)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Panorpa sp. 三帶蝎蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:64)
捕 食 性。
分 佈：江西。

MEGALOPTERA 廣翅目

Corydalidae 齒蛉科

Acanthacorydalis fruhstorferi Weele 滇越巨齒蛉 (Hun., 1992:642; Yang, 1995:273; Yang et Yang, 1992:407)
Acanthacorydalis fruhstorferi Weele, 1907:
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、雲南、浙江；越南。

Acanthacorydalis orientalis (MacLachlan) 東方巨齒蛉 (ASZI et al., 1978:256; He et al., 1991: 89; Yang et Yang 1989:9; 1992:407; Zhang, 1987[ed.] 2:1)
捕 食：(稻田)水生昆蟲。
分 佈：福建、湖南、雲南、四川、湖北、陝西、山西、河北、北京、陝西、甘肅。

Acanthacorydalis sinensis Yang et Yang 中華巨齒蛉 (Yang et Yang, 1986:86)
Acanthacorydalis sinensis Yang et Yang, 1986:86.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Acanthacorydalis unimaculata Yang et Yang 單斑巨齒蛉 (Hun., 1992:642; Yang et Yang, 1986:85)
Acanthacorydalis unimaculata Yang et Yang, 1986:85.
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、廣西、貴州、浙江、安徽。

Anachauliodes sinensis Yang et Yang 中華臀魚蛉 (Yang et Yang, 1992:436)
Anachauliodes sinensis Yang et Yang, 1992:436.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Anachauliodes tonkinicus Kimmins 越南臀魚蛉 (Yang et Yang, 1991:75)
捕 食 性。
分 佈：貴州；越南。

Ctenochauliodes abnormis Yang et Yang 異斑櫛魚蛉 (Yang et Yang, 1986:92)
Ctenochauliodes abnormis Yang et Yang, 1986:92.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Ctenochauliodes forcipatus Kimmins 鉗突櫛魚蛉 (Yang, 1997:574)
Ctenochauliodes forcipatus Kimmins, 1954:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Ctenochauliodes meridionalis Yang et Yang 南方櫛魚蛉 (Yang et Yang, 1986:93)
Ctenochauliodes maridionalis Yang et Yang, 1986:93.

捕 食 性。
分 佈：廣西。

Ctenochauliodes nigrovenosus (Weele) 暗脈泥蛉 (Yang et Yang, 1992:407; Zhang, 1987[ed.] 21)
別 名：*屬模櫛魚蛉*。
捕 食 性。
分 佈：江西、廣西、貴州；越南。

Neochauliodes bowringi (MacLachlan) 緣點斑魚蛉 (Hun., 1992:642; Yang et Yang, 1989:10)
Neochauliodes bowringi (MacLachlan, 1853:)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、香港、廣西、貴州、陝西；越南。

Neochauliodes diseretus Yang et Yang 碎斑魚蛉 (Yang et Yang, 1993:246)
Neochauliodes diseretus Yang et Yang, 1993:246-247.
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州、湖北、陝西、甘肅。

Neochauliodes fraternus Maclachlan 污翅斑魚蛉 (Hun., 1992:642; Yang et Yang, 1992:407)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、山東、河北。

Neochauliodes frucatus Yang et Yang 叉突斑魚蛉 (Yang et Yang, 1986:91)
Neochauliodes frucatus Yang et Yang, 1986:91.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Neochauliodes griseus Yang et Yang 灰翅斑魚蛉 (Hun., 1992:643)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江。

Neochauliodes orientalis Yang et Yang 東方斑魚蛉 (Yang et Yang, 1991:74)
Neochauliodes orientalis Yang et Yang, 1991:74.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Neochauliodes sinensis (Walker) 中華斑魚蛉 (ASZI et al., 1978:255; He et al., 1991:89; Yang et Yang, 1993:246; Zhang, 1987[ed.] 2:1)
捕 食：(稻田)水生昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、河北、北京、甘肅；蒙古、印度。

Neochauliodes wuminganus Yang et Yang 武鳴斑魚蛉 (Yang et Yang, 1986:91)

Neochauliodes wuminganus Yang et Yang, 1986:91.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Neoneuromus ignobilis Navás 普通齒蛉 (Yang, 1995:273; Yang et Yang, 1989:9; 1992:407; 1992:435)

Neoneuromus ignobilis Navás, 1932:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、山西。

Neoneuromus latratus MacLachlan 褐背魚蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:1)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Neoneuromus maclachlani (Weele) 麥克齒蛉 (Yang et Yang, 1992:435)

Neoneuromus maclachlani (Weele, 1907:)

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南、四川。

Neurhermes differentialis Yang et Yang 異角黑齒蛉 (Yang et Yang, 1986:90)

Neurhermes differentialis Yang et Yang, 1986:90.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Neurhermes guangxiensis Yang et Yang 廣西黑齒蛉 (Hun., 1992:641)

捕 食 性。

分 佈：廣西、湖南。

Neurhermes tonkinensis (Weele) 黃胸黑齒蛉 (Yang et Yang, 1986:89)

捕 食 性。

分 佈：廣西、雲南、貴州；越南。

Neuromus sinensis Yang et Yang 中華脈齒蛉 (Yang et Yang, 1986:87)

Neuromus sinensis Yang et Yang, 1986:87.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Parachauliodes sp. 大蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:1)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Protohermes costalis (Walker) 花邊星齒蛉 (ASZI et al., 1978:255; He et al., 1991:89; Sun et al., 1980(4): 24; Yang, 1997:573; Yang et Yang, 1992:408; 1993:246; Zhang, 1987[ed.] 2:1)
Protohermes costalis (Walker, 1853:)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、安徽、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅；越南、印度、錫金、不丹。

Protohermes davidi Weele 大衛星齒蛉 (Yang et Yang, 1992:435)
Protohermes davidi Weele, 1909:
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Protohermes guangxiensis Yang et Yang 廣西星齒蛉 (Hun., 1992:640; Yang, 1997:572; Yang et Yang, 1986:88)
Protohermes guangxiensis Yang et Yang, 1986:88.
捕 食 性。
分 佈：廣西、四川、湖南。

Protohermes hunanensis Yang et Yang 湖南星齒蛉 (Hun., 1992:641; Yang et Yang, 1992:408)
Protohermes hunanensis Yang et Yang., 1992:408.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Protohermes parcus Yang et Yang 寡斑星齒蛉 (Yang et Yang, 1992:435)
Protohermes parcus Yang et Yang, 1988:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Protohermes similis Yang et Yang 滇蜀星齒蛉 (Yang et Yang, 1992:407)
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、四川。

Protohermes sinensis Yang et Yang 中華星齒蛉 (Hun., 1992:640)
Protobermes sinensis Yang et Yang, 1992:640.
捕 食 性。
分 佈：湖南、浙江。

Protohermes tibetanus Yang et Yang 西藏星齒蛉 (Yang, 1988:207)
Protohermes tibetanus Yang et Yang, 1988:207.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Protohermes weelei Navás 陝西星齒蛉 (Yang et Yang, 1989:10)
捕 食 性。

分 佈：陝西。

Protohermes xanthodes Navás 淡黃星齒蛉 (Hun., 1992:640; Yang, 1997:573; Yang et Yang, 1992:408; 1992:435)

Protohermes xanthodes Navás, 1913:

捕 食 性。

分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅。

Sialidae 泥蛉(魚蛉)科

Sialis sibirica MacLachlan 古北泥蛉 (ASZI et al., 1978:256)

捕 食 性。

分 佈：東北；日本、蘇聯、歐洲北部。

Sialia sp. 黑翅泥蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:1)

捕 食 性。

分 佈：江西。

NEUNOPTERA 脈翅目

Raphidiidae 蛇蛉科

Agulla xiyue Yang et Chou 西岳蛇蛉 (ASZI et al., 1978:257)

捕 食：生活松柏樹上捕食小蟲。

分 佈：陝西(華山)

Inocelliidae 盲蛇蛉科

Inocellia sinensis Navás 中華盲蛇蛉 (Ma et Xu, 1995:274)

捕 食 性。

分 佈：浙江、江蘇。

Sininocellia gigantos Yang 碩華盲蛇蛉 (Yang, 1985:26)

Sininocellia gigantos Yang, 1985:26-27.

捕 食 性。

分 佈：福建(武夷山區)。

Coniopterygidae 粉蛉科

Coniocampsa furcata Banks 中叉曲粉蛉 (Yang, 1951:341; 1964:284)

Coniocampsa furcata Banks, 1937:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Coniocampsa postmaculata Yang 後斑曲粉蛉 (ASZI, 1986, 1:752; ASZI et al., 1978:258; Yang, 1964: 284)
Coniocampsa postmaculata Yang, 1964:284.
捕 食 性。
分 佈：浙江(杭州西湖靈隱)。

Coniocampsa sp. 曲粉蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:1)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Coniopteryx (s. str.) **aspocki** Kis 阿氏粉蛉 (Liu et Yang, 1997:575)
Coniopteryx (s. str.) *aspocki* Kis, 1967:
捕 食 性。
分 佈：中國廣布；歐洲。

Coniopteryx (s. str.) **bispinalis** Liu et Yang 雙刺粉蛉 (Liu et Yang, 1993:255)
Coniopteryx (s. str.) *bispinalis* Liu et Yang, 1993:225.
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州。

Coniopteryx (s. str.) **plagiotropa** Liu et Yang 斜突粉蛉 (Liu et Yang, 1997:576)
Coniopteryx (s. str.) *plagiotropa* Liu et Yang, 1997:576.
捕 食 性。
分 佈：湖北、甘肅。

Coniopteryx protrufrons Yang et Liu 突額粉蛉 (Yang et al., 1995:283)
Coniopteryx protrufrons Yang et Liu
捕 食 性。
分 佈：福建、海南、浙江。

Coniopteryx pulverulenta Enderlein (Yang, 1951:344)
Coniopteryx pulverulenta Enderlein
捕 食 性。
分 佈：北京。

Coniopteryx sp. 粉蛉 (Yang et al., 1995:283)
Coniopteryx sp. Yang et al., 1995:283.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Conwentzia fraternalis Yang 中越齒粉蛉 (Yang, 1974:89)
Conwentzia fraternalis Yang, 1974:89.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Conwentzia orthotibia Yang 直脛嚙粉蛉 (Liu et Yang, 1997:576; Yang, 1974:88; Yunn., 1987:511)

Conwentzia orthotibia Yang, 1974:88.
捕 食：葉蟎、蚜蟲、蚧蟲等。
分 佈：雲南、甘肅，中國廣布。

Conwentzia sinica Yang 中華齒粉蛉 (ASZI, 1986, 1:751; ASZI et al., 1978:257; Yang, 1974:84)

Conwentzia sinica Yang, 1974:84.
捕 食：蚜蟲
分 佈：陝西。

Conwentzia yunguiana Liu et Yang 雲貴齒粉蛉 (Liu et Yang, 1993:256)

Conwentzia yunguiana Liu et Yang, 1993:256-257.
捕 食 性。
分 佈：雲南、貴州。

Cryptoscenea orientalis Yang et Liu 東方隱粉蛉 (Yang et Liu, 1993:249)

Cryptoscenea orientalis Yang et Liu, 1993:249-250.
捕 食 性。
分 佈：海南、廣西、貴州。

Hemisemidalis sinensis Liu 中華半粉蛉 (Liu, 1995:37)

Hemisemidalis sinensis Liu, 1995:37.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Heteroconis picticornis (Banks) 彩角異粉蛉 (ASZI, 1986, 1:751; ASZI et al., 1978:258)

捕 食：果樹上蚧蟲
葉蟎。
分 佈：海南、廣東沿海；美國(自香港引進)。

Semidalis nr. **albata** Enderlein (Yang, 1951:342)

Semidalis nr. *albata* Enderrlein, Yang, 1951:342.
捕 食：複葉槭葉上蚧蟲。
寄生蜂：一種小蜂寄生於體內，寄生率約 36%
分 佈：北京。

Semidalis aleyrodiformis (Stephens) 重慶粉蛉 (Liu et Yang, 1997:577; Shi et al., 1989-90:81)

Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836:)
寄 主：*Dialeurodes citri* Ashmead 柑橘粉虱。
寄生蜂：*Isodromus* sp. 粉蛉跳小蜂
Aphanogmus sp. 粉蛉黑蜂。
分 佈：四川、上海、湖北，中國廣布。

Semidalis anehoroides Liu et Yang 錨突重粉蛉 (Liu et Yang, 1993:257)

Semidalis anehoroides Liu et Yang, 1993:257-258.

捕 食 性。

分 佈：雲南、貴州。

Semidalis bicornis Liu et Yang 雙角重粉蛉 (Liu et Yang, 1993:258)

Semidalis bicornis Liu et Yang, 1993:258-259.

捕 食 性。

分 佈：雲南、貴州。

Semidalis macleodi Meinander (Liu et Yang, 1997:577)

Semidalis macleodi Meinander

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Semidalis sanxiana Liu et Yang 三峽重粉蛉 (Liu et Yang, 1997:577)

Semidalis sanxiana Liu et Yang, 1997:577.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Semidalis sp. 重粉蛉 (Wei et al., 1980(4):37; Yang et al., 1995:283)

Semidalis sp. Wei et al., 1980(4):37.

棲 息：甜橙、黃皮、龍眼、荔枝、蒲桃、橄欖、白玉蘭、珊瑚樹、竹、茉莉、米仔蘭。

捕 食：葉蟎、蚧蟲、粉蝨。

分 佈：廣東(廣州)、浙江。

Spiloconis picticornis Banks (Yang, 1951:341)

Spiloconis picticornis Banks, 1939:

捕 食 性。

分 佈：海南。

Spiloconis sexguttata Enderlein 六斑瑕粉蛉 (Yang, 1951:341; Zhang, 1987[ed.] 2:1)

Spiloconis sexguttata Enderlein, 1907:

捕 食：蟎類、蚜蟲、蚧蟲、粉蝨。

分 佈：臺灣、江西。

Spiloconis sp. 瑕粉蛉 (Yang et al., 1995:283)

Spiloconis sp. Yang et al., 1995:283.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Thecosemidalis yangi Liu 楊氏匣粉蛉 (Liu, 1995:35)

Thecosemidalis yangi Liu, 1995:35.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Mantispidae 螳蛉科

Climaciella habutsuella Okamoto 斑翅螳蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:3)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Climaciella quadrituberculata (Westwood) 四瘤蜂螳蛉 (ASZI et al., 1978:259; He et al., 1991: 89)
捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：臺灣、海南、江蘇；日本、菲律賓、越南、印尼、印度。

Eumantispa fusciolla Yang 褐頸優螳蛉 (Yang, 1992:445)
Eumantispa fusciolla Yang, 1992:445.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Eumantispa harmandi (Navás) 漢優螳蛉 (Hun., 1992:644; Yang, 1997:609)
Eumantispa harmandi (Navás, 1909:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、湖北、北京、朝鮮、日本。

Eumantispa tibetana Yang 西藏優螳蛉 (Yang, 1988:205)
Eumantispa tibetana Ynag, 1988:205.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫、波密)。

Mantispa japonica MacLachlan 日本螳蛉 (Hun., 1992:644; Yang, 1997:609; Yunn., 1987:513)
Mantispa japonica MacLachlan, 1875:
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川、湖北、東北；朝鮮、日本。

Osmylidae 溪蛉科

Heterosmylus flavidus Yang 淡黃異溪蛉 (Yang, 1992:440)
Heterosmylus flavidus Yang, 1992:440.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Heterosmylus limulus Yang 斜紋異溪蛉 (Yang, 1988:194)
捕 食 性。

分 佈：西藏(亞東、墨脫)。

Heterosmylus shennonganus Yang 神農異溪蛉 (Yang, 1997:581)

Heterosmylus shennonganus Yang, 1997:581-582.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Heterosmylus wolonganus Yang 臥龍異溪蛉 (Yang, 1992:440)

Heterosmylus wolonganus Yang, 1992:440.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Heterosmylus yunnanus Yang 雲南異溪蛉 (Yunn., 1987:511)

Heterosmylus yunnanus Yang, 1986:

捕 食：小蛾類等小蟲。

分 佈：雲南。

Heterosmylus zhamanus Yang 樟木異溪蛉 (Yang, 1988:195)

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Lysmus qingyeanus Yang 慶元離溪蛉 (Yang et al., 1995:281)

Lysmus qingyeanus Yang, 1995, *In* Yang et al. :281-282.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Lysmus vicius Yang 勝利離溪蛉 (Yang, 1997:581)

Lysmus vicius Yang, 1997:581.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Lysmus zanganus Yang 藏離溪蛉 (Yang, 1988:196)

Lysmus zanganus Yang, 1988:196.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Osmylus fuberosus Yang 偶瘤溪蛉 (Yang, 1997:580)

Osmylus fuberosus Yang, 1997:580-581.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Osmylus megistus Yang 溪蛉 (Yang, 1988:193)

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Osmylus xizangensis Yang 西藏溪蛉 (Yang, 1988:193)

Osmylus xizangensis Yang, 1988:193.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Parosmylus jombai Yang 江巴近溪蛉 (Yang, 1988:194)

捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Parrosmylus tibetanus Yang 西藏近溪蛉 (Yang, 1992:438)

Parrosmylus tibetanus Yang, 1987:
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Plathosmylus atomatus Yang 細點豐溪蛉 (Yang, 1988:194)

Plathosmylus atomatus Yang, 1988:194.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Sinosmylus hengduanus Yang 橫斷華溪蛉 (Yang, 1992:438)

Sinosmylus hengduanus Yang, 1992:438-439.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Spilosmylus ludinganus Yang 瀘定瑕溪蛉 (Yang, 1992:439)

Spilosmylus ludinganus Yang, 1992:439-440.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Spilosmylus tuberculatus (Walker) 瘤斑瑕溪蛉 (Yunn., 1987:511)

捕 食：小蛾類等小蟲。
分 佈：臺灣、雲南；日本。

Thyridosmylus laetus Yang 明窗溪蛉 (Yang, 1988:195)

Thyridosmylus laetus Yang, 1988:195.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Thyridosmylus maolanus Yang 茂蘭窗溪蛉 (Yang, 1993:261)

Thyridosmylus maolanus Yang, 1993:261-262.
捕 食 性。

分 佈：貴州。

Thyridosmylus medoganus Yang 墨脫窗溪蛉 (Yang, 1988:195)

Thyridosmylus medoganus Yang, 1988:195.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Thyridosmylus minor Kimmins 小窗溪蛉 (Yang, 1988:196)

捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Thyridosmylus pulchrus Yang 麗窗溪蛉 (Yang, 1988:196)

Thyridosmylus pulchrus Yang, 1988:196.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Thyridosmylus qianus Yang 黔窗溪蛉 (Yang, 1993:262)

Thyridosmylus qianus Yang, 1993:262-263.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Thyridosmylus similaminor Yang 肖小窗溪蛉 (Yang, 1992:440)

Thyridosmylus similaminor Yang, 1992:440-441.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Thyridosmylus trifasciatus Yang 三帶窗溪蛉 (Yang, 1993:262)

Thyridosmylus trifasciatus Yang, 1993:262.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Thyridosmylus triypsiloneurus Yang 三 Y 窗溪蛉 (Yang et al., 1995:282)

Thyridosmylus triypsiloneurus Yang, *In* Yang et al., 1995:282.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Dilaridae 櫛角蛉科

Dilar aspersus Yang 散斑櫛角蛉 (Yang, 1988:197)

Dilar aspersus Yang, 1988:197.
捕 食 性。
分 佈：西藏(林芝)。

Dilar dongchuanus Yang 東川櫛角蛉 (Yunn., 1987:512)
捕 食：蛀木害蟲。
分 佈：雲南。

Dilar japonica MacLachlan 日本櫛蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Dilar megalopterus Yang 廣翅櫛角蛉 (Yunn., 1987:512)
捕 食：蛀木害蟲。
分 佈：雲南。

Dilar montanus Yang 山地櫛角蛉 (Yang, 1992:441)
Dilar montanus Yang, 1992:441.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Dilar pusillus Yang 小櫛角蛉 (Yang, 1988:197)
Dilar pumilus Yang, 1988:197.
Dilar pusillus Yang, 1992:379. (n. n. for *Dilar pusilus* Yang, 1988, *nec* Navás, 1909)
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Dilar septentrionalis Navás 北部櫛蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)
捕 食 性。
分 佈：江西(牯嶺)。

Dilar tibetanus Yang 西藏櫛角蛉 (Yang, 1988:197)
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Dilar wangi Yang 王氏櫛角蛉 (Yang, 1992:441)
Dilar wangi Yang, 1992:441.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Dilar yunnanus Yang 雲南櫛角蛉 (Yunn., 1987:512)
捕 食：蛀木害蟲。
分 佈：雲南。

Berothidae 鱗蛉科

Berotha zhejiangana Yang et Liu 浙江鱗蛉 (Yang et al., 1995:280)

Berotha zhejiangana Yang et Liu, 1995:280.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Berothella bannana Yang 版納鱗蛉 (Yunn., 1987:512)
捕 食：樹皮下小蟲。
分 佈：雲南。

Isoscelipteron dictyophilum Yang et Liu 喜網等鱗蛉 (Yang et al., 1995:280)
Isoscelipteron dictyophilum Yang et Liu, 1995:280-281.
捕 食 性。
分 佈：

Hemerobiidae 褐蛉科

Allemerobius flaveotus Banks 黃鐮褐蛉 (Yang, 1981:315; 1992:445; 1997:588)
Allemerobius flaveotus Banks, 1940:
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木)、四川。

Drepanacra yunnanica Yang 雲南鈎褐蛉 (Yunn., 1987:514)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Eumicromus sauteri Esben-Peterson 紹德褐蛉
捕 食：蚜蟲等。
分 佈：臺灣。

Hemerobius angustipennis Yang 狹翅褐蛉(Yang, 1992:444)
Hemerobius angustipennis Yang, 1992:444-445.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Hemerobius atrocorpus Yang 黑體褐蛉 (Yang, 1997:589)
Hemerobius atrocorpus Yang, 1997:589.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Hemerobius bispinus Banks 雙刺褐蛉 (Yang, 1981:312; 1988:201; 1997:589)
Hemerobius bispinus Banks, 1940:
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Hemerobius daxueshanus Yang 大雪山褐蛉 (Yang, 1992:444)

Hemerobius daxueshanus Yang, 1992:444.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Hemerobius expteris Navás 埃褐蛉 (Yang, 1981:193; Zhang, 1987[ed.] 2:1)

Hemerobius expteris Navás, 1936:

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)、江西(牯嶺)。

Hemerobius hengduanus Yang 橫斷褐蛉 (Yang, 1981:314; 1992:443)

Hemerobius hengduanus Yang, 1981:314.

捕 食 性。

分 佈：西藏(江達、察雅、橫斷山脈)、四川。

Hemerobius humuli Linnaeus 全北褐蛉 (ASZI, 1986, 1:754; ASZI et al., 1978:262; Chao et Chang, 1978: 271-278; He et al., 1991:90; Yang, 1981:193; Yang, 1981:312; 1988:201; 1997:589; Yang et al., 1995:228; Yunn., 1987:515; Zhang, 1987[ed.] 2:1; Zong et al., 1984:248)

捕 食：蚜蟲

蚧蟲。

分 佈：福建、江西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山西、河北、內蒙古、遼寧，中國南北各省區；日本、蘇聯、歐洲、北美，全北區。

Hemerobius lacunaris Navás 平湖褐蛉 (Yang, 1981:193; 1997:589; Yang et al., 1995:278; Yunn., 1987:515; Zhang, 1987[ed.] 2:1; Zong et al., 1984:248)

Hemerobius lacunaris Navás, 1933:

別 名：*溝紋褐蛉*。

棲 息：松。

捕 食：*Mythimna separata* (Walker) 粘蟲。

分 佈：福建(三港)、江西、雲南、四川、湖北。

Hemerobius lii Yang 西藏褐蛉 (Yang, 1981:313; 1988:201)

Hemerobius lii Yang, 1981:313.

捕 食 性。

分 佈：西藏(林芝、米林)。

Hemerobius mangkamanus Yang 芒康褐蛉 (Yang, 1981:314; 1992:444)

Hemerobius mangkamanus Yang, 1981:314.

捕 食 性。

分 佈：西藏(芒康)。

Hemerobius (Brauerobius) marginatus Stephens 緣布褐蛉 (Yang et Yan, 1990:222)

Hemerobius marginatus Stephens, 1836:109.

捕 食 性。

分 佈：河北、內蒙古；亞洲、歐洲(廣佈種)。

Hemerobius namjagbarwanus Yang 南峰褐蛉 (Yang, 1988:201)

Hemerobius namjagbarwanus Yang, 1988:201.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Hemerobius poppii Esb.-Petersen 波褐蛉 (Yang, 1981:314; 1992:443)

捕 食 性。

分 佈：西藏(江達、察雅)、四川、甘肅；西伯利亞。

Hemerobius xizangensis Yang 西藏褐蛉 (Yang, 1981:312; 1988:201; 1992:443)

Hemerobius xizangensis Yang, 1981:312.

捕 食 性。

分 佈：西藏(林芝、波密，廣布西藏)。

Idiomicromus zanganus Yang 藏異脈褐蛉 (Yang, 1981:303; 1988:199)

Idiomicromus zanganus Yang, 1981:303.

捕 食 性。

分 佈：西藏(林芝、波密、亞東)。

Kimminsia acuminata Yang 尖頂齊褐蛉 (Yang, 1980:61; 1981:311; 1996:100)

Kimminsia acuminata Yang, 1980:61.

捕 食 性。

分 佈：西藏(日土)、河北、遼寧。

Kimminsia baikalensis (Navás) 貝加爾齊草蛉 (Yang, 1996:100)

Hemerobius (*Boriomyia*) *baikalensis* Navás, 1928:

=*Wesmaelius* (*Kimminsia*) *pseudofurcatus* Makarkin, 1987:

捕 食 性。

分 佈：新疆；俄羅斯。

Kimminsia bihamita Yang 雙鈎齊褐蛉 (ASZI, 1986, 1:754; Yang, 1980:57; 1981:312; 1992:443; 1996:100; Yunn., 1987:514)

Kimminsia bihamita Yang, 1980:57.

捕 食：蚜蟲(杏、梨、核桃等果樹上)。

分 佈：雲南、西藏、四川、陝西、寧夏、河北、北京。

Kimminsia neimenica Yang 內蒙齊褐蛉 (Yang, 1980:60; 1997:590)

Kimminsia neimenica Yang, 1980:60.

捕 食 性。

分 佈：湖北、內蒙古(自治區巴彥淖爾盟)。

Kimminsia pekinensis Yang 北京齊褐蛉 (ASZI, 1986, 1:754; Yang, 1980:59; 1996:100)

Kimminsia pekinensis Yang, 1980:59.
捕 食：蚜蟲。
分 佈：北京、青海、新疆。

Kimminsia sinica (Tjeder) 中華齊褐蛉 (Yang, 1980:62; 1996:100; 1997:589)
Boriomyia sinica Tjeder, 1936:10-12.
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、青海、甘肅、寧夏、新疆。

Kimminsia subnebulosus (Stephens) 廣鈎齊褐蛉 (Yang, 1992:443)
Kimminsia ssubnebulosus (Stephens, 1836:)
捕 食 性。
分 佈：廣布全北區。

Kimminsia sufuensis (Tjeder) 疏附齊褐蛉 (Yang, 1980:59)
Wesmaelius sufuensis Tjeder, 1968:137-140.
捕 食 性。
分 佈：新疆(喀什)。

Kimminsia trivenulata Yang 異脈齊褐蛉 (Yang, 1980:62; 1981:312; 1992:443)
Kimminsia trivenulata Yang, 1980:62.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(江達)、四川。

Kimminsia ulingensis Yang 霧靈齊褐蛉 (Yang, 1980:59)
Kimminsia ulingensis Yang, 1980:59.
捕 食 性。
分 佈：河北(興隆縣霧靈山)。

Megalomus arytaenoideus Yang 勺突廣褐蛉 (Yang, 1997:587)
Megalomus arytaenoideus Yang, 1997:587-588.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Megalomus elephiscus Yang 若象廣褐蛉 (Yang, 1997:588)
Megalomus elephiscus Yang, 1997:588.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Megalomus tibetanus Yang 西藏廣褐蛉 (Yang, 1988:201)
Megalomus tibetanus Yang, 1988:201.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Megalomus yunnanus Yang 雲南廣褐蛉 (Yang, 1992:442;Yunn., 1987:514)

Megalomus yunnanus Yang, 1986:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Mesohemerobius sp. 紋褐蛉 (Yang, 1981;193)

Mesohemerobius sp. Yang, 1981:193.

捕 食 性。

分 佈：福建(挂墩)。

Micromus angulatus (Stephens) 角紋脈褐蛉 (Yang, 1997:585; Yang et al., 1995:278; Yunn., 1987:514)

Micromus angulatus (Stephens, 1836:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南、浙江、湖北、陝西、河北、北京、內蒙古、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲、北美。

Micromus deensimaculosus Yang et Liu 密斑脈褐蛉 (Yang et al., 1995:279)

Micromus deensimaculosus Yang et Liu, 1995:279.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Micromus minimus Yang 稚脈褐蛉 (Yang, 1988:199)

Micromus minimus Yang, 1988:199.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Micromus mirimaculatus Yang et Liu 奇斑脈褐蛉 (Yang et al., 1995:278)

Micromus mirimaculatus Yang et Liu, 1995:278-279.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Micromus multipunctatus Matsumura 點線脈褐蛉 (ASZI, 1986, 1:752; ASZI et al., 1978:259; He et al., 1991:90; Hun., 1992:644; Song, 1984:84; Yang, 1981:191; Yang, 1981:302; 1988:198; 1997:585; Yunn., 1987:513; Zhang, 1987[ed.] 2:1)

Micromus multipunctatus Matsumura, 1907:

捕 食：蚜蟲

葉蟬。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西；日本、庫頁島、俄羅斯、歐洲。

Micromus myriostictus Yang 密點脈褐蛉 (Yang, 1988:198)

Micromus myriostictus Yang, 1988:198.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Micromus (Neosmicromus) paganus (Linnaeus) 濃脈褐蛉 (Yang et Yan, 1990:223)

Hemerobius paganus Linnaeus, 1767:912.

捕 食 性。

分 佈：河北、北京、內蒙古；亞洲、歐洲

Micromus perelegans Tieder 頗麗脈褐蛉 (Yang et al., 1995:278)

Micromus perelegans Tieder, 1936:

捕 食 性。

分 佈：浙江、陝西、甘肅。

Micromus ramosus Navás 多支脈褐蛉 (Yang et al., 1995:278)

Micromus ramosus Navás, 1934:

捕 食 性。

分 佈：江西、廣西、浙江、江蘇、安徽。

Micromus striolatus Yang 細紋脈褐蛉 (Yang, 1997:586)

Micromus striolatus Yang, 1997:586.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Micromus timidus Hagen 梯階脈褐蛉 (ASZI, 1986, 1:753; ASZI et al., 1978:260; He et al., 1991:90; Wei et al., 1980(4):37 Yang, 1981:191; Yunn., 1987:514)

Micromus timidus Hagen, 1853:

棲 息：甜橙、黃皮、龍眼、荔枝、桃、蒲桃、番石榴、橄欖、白玉蘭、長豇豆、節瓜、絲瓜、茄、一品紅、米仔蘭、紅花夾竹桃。

捕 食：葉蟬

Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜

Hyalopterus arundinis (Fabricius) 桃粉蚜

Aphis citricidus (Kirkaldy) 橘蚜

橘二叉蚜

Aphis cracivora Koch 豆蚜

Aphis gossypii Glover 棉蚜

甘蔗綿蚜

蚧蟲

薊馬

葉螨。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南；日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、印度、西非、中南非、澳洲、大洋洲、薩摩亞群島。

Micromus variegatus (Fabricius) 花斑脈褐蛉 (Hun., 1992; :645; Yang, 1979:110; Yang, 1997:585)

Micromus variegatus (Fabricius, 1793:)

捕 食 性。

分 佈：湖南、浙江、陝西；日本、歐洲。

Micromus xia Yang 瑕脈褐蛉 (Yang, 1981:302; 1988:198)

Micromus xia Yang, 1981:302.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫、亞東)、浙江。

Micromus sp. 褐蛉 (Wei et al., 1980(4):37)

棲 息：甜橙。

捕 食：橘蚜、蚧蟲。

分 佈：廣東(廣州)。

Micromus sp. 擬階脈褐蛉 (Yang, 1981:191)

Micromus sp. Yang, 1981:191.

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)。

Neuronema decisum (Walker) 屬模脈線蛉 (Yang, 1981:304)

捕 食 性。

分 佈：西藏(樟木)。

Neuronema huangi Yang 黃氏脈線蛉 (Yang, 1981:305)

Neruronema huangi Yang, 1981:305.

捕 食 性。

分 佈：西藏(錯那麻瑪)。

Neuronema kulinga Yang 牯嶺脈線蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:1)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Neuronema laminata Tjeder 薄葉脈線蛉 (ASZI, 1986, 1:753; ASZI et al., 1978:261; Hun., 1992:645; Yang, 1992:442; 1997:586)

Neuronema laminata Tjeder, 1936:

捕 食：蚜蟲。

分 佈：湖南、四川、湖北、陝西、山西、河北、甘肅、寧夏、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Neuronema liana Yang 麗江脈線蛉 (Yang, 1992:442; Yunn., 1987:514)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neuronema medogense Yang 墨脫脈線蛉 (Yang, 1988:199)

Neuronema mdogense Yang, 1988:199.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Neuronema omeishana Yang 峨嵋脈線蛉 (ASZI et al., 1978:261)
捕 食 性。
分 佈：四川。

Neuronema pielina (Navás) 壁氏脈線蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:1)
捕 食 性。
分 佈：江西(牯嶺)。

Neuronema tienmushana Yang 天目脈線蛉 (ASZI et al., 1978:260)
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Neuronema unipuncta Yang 黑點脈線蛉 (ASZI et al., 1978:261; Yang, 1981:192; 1997:586; Yang et al., 1995:278; Zhang, 1987[ed.] 2:1)
Neuronema unipuncta Yang, 1964:
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣西、浙江、湖北。

Notiobiella sanxiana Yang 三峽綠褐蛉 (Yang, 1997:590)
Notiobiella sanxiana Yang, 1997:590.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Notiobiella sp. 綠褐蛉 (Yang, 1997:590; Yunn., 1987:515; Zhang, 1987[ed.] 2:1)
捕 食 性。
分 佈：江西、雲南、湖北。

Paramicromus yunnanus (Navés) 雲連脈褐蛉 (Yunn., 1987:513)
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Psectra iniqua (Hagen) 陰啬褐蛉 (ASZI et al., 1978:260; Wei et al., 1980(4):38; Yunn., 1987:515)
棲 息：荔枝。
捕 食：肉食性。
分 佈：臺灣、廣東、廣西、雲南；日本(琉球)、泰國、印度、斯里蘭卡。

Psectra yunü Yang 玉女啬褐蛉 (Yang, 1981:194)
Psectra yunü Yang, 1981:194.
捕 食 性。
分 佈：福建(武夷山區)。

Semohemerobius subacutus (Nakahara) (Yang, 1983:128)

Mesohemerobius subacutus Nakahara, 1966:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Semohemerobius sp. 紋褐蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:1)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Sineuronema angusticolla Yang 細頸華脈線蛉 (Yang, 1997:586)

Sineuronema angusticolla Yang, 1997:586-587.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Sineuronema bomeana Yang 波密華脈線蛉 (Yang, 1981:306; 1988:200)

Sineuronema bomeana Yang, 1981:306.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Sineuronema gyirongana Yang 吉隆華脈線蛉 (Yang, 1981:309)

Sineuronema gyirongana Yang, 1981:309.

捕 食 性。

分 佈：西藏(吉隆)。

Sineuronema hani Yang 韓氏華脈線蛉 (Yang, 1988:200)

Sineuronema hani Yang, 1988:200.

捕 食 性。

分 佈：西藏(墨脫)。

Sineuronema magmangana Yang 麻瑪華脈線蛉 (Yang, 1981:307)

Sineuronema magmangnana Yang, 1981:307.

捕 食 性。

分 佈：西藏(錯那麻瑪)。

Sineuronema nyingchiana Yang 林芝華脈線蛉 (Yang, 1981:305; 1988:200)

Sineuronema nyingchiana Yang, 1981:305.

捕 食 性。

分 佈：西藏(林芝)。

Sineuronema quxamana Yang 曲香華脈線蛉 (Yang, 1981:310; 1988:201)

Sineuronema quxamana Yang, 1981:310.

捕 食 性。

分 佈：西藏(樟木、波密)。

Sineuronema shensiensis Yang 陝華脈線蛉 (ASZI et al., 1978:262)
捕 食 性。
分 佈：陝西(太白山)。

Sineuronema similis (Banks) 肖華脈線蛉 (Yang, 1992:442)
Sineuronema similis (Banks, 1940:)
捕 食 性。
分 佈：四川。

Sineuronema sinensis (Tjeder) 中華脈線蛉 (Yang, 1992:442)
Sineuronema sinensis (Tjeder, 1936:)
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅。

Sineuronema yadongana Yang 亞東華脈線蛉 (Yang, 1981:308)
Sineuronema yadongana Yang, 1981:308.
捕 食 性。
分 佈：西藏(亞東)。

Sineuronema yajiangana Yang 雅江華脈線蛉 (Yang, 1992:443)
Sineuronema yajiangana Yang, 1992:443.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Sineuronema yunica Yang 雲華脈線蛉 (Yunn., 1987:514)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Sineuronema zhamana Ynag 樟木華脈線蛉 (Yang, 1981:309)
Sineuronema zhamana Yang, 1981:309.
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木)。

Sympherobius matsucocciphagus Yang 松蚧益蛉 (ASZI, 1986, 1:753)
捕 食：松幹蚧(卵)。
分 佈：遼寧。

Sympherobius peceaticus Yang et Yan 雲杉益蛉 (Yang et Yan, 1990:221)
Sympherobius peceaticus Yang et Yan, 1990:221.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(土默特左旗大青山 2300 m)。

Sympherobius ueisong Yang 衛松益蛉 (Yang, 1981:193; Zhang, 1987[ed.] 2:1)

Sympherobius ueisong Yang, 1980:
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、浙江。

Sympherobius weisong Yang 衛松益蛉 (Wang, 1984:95)
Sympherobius weisong Yang
捕 食：*Matsucoccus massonianae* Young et Hu 馬尾松幹蚧
Matsucoccus matsumurae (Kuwana) 日本松幹蚧
Matsucoccus sinensis Chen 中華松梢蚧
Cinara pinea Mordwiko 松蚜
白櫟蚜。
天 敵：黑蟻
Chrysopa kulingensis Navás 牯嶺草蛉
Chrysopa pallens (Rambur) 大草蛉
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲。
分 佈：浙江。

Sympherobius wuyianus Yang 武夷益蛉 (Yang, 1981:192)
Sympherobius wuyianus, Yang, 1981:192.
捕 食 性。
分 佈：福建。

Sympherobius yunpinus Yang 雲松益蛉 (Yunn., 1987:514)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Sympherobius sp. 益蛉 (Yang, 1981:193)
Sympherobius sp. Yang, 1981:193.
捕 食 性。
分 佈：福建(大竹嵐)。

Wesmaelius asiaticus Yang 亞洲叢褐蛉 (Yang, 1980:56)
Wesmaelius asiaticus Yang, 1980:56.
捕 食：(落葉松上)。
分 佈：河北(興隆縣霧靈山蓮花池)。

Zachobiella striata Nakahara 條斑寡脈褐蛉 (Yunn., 1987:513)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南。

Psychopsidae 蝶蛉科

Balmes birmana (MacLachlan) 滇蜀蝶蛉 (ASZI et al., 1978:265; Yang, 1992:446; Yunn., 1987:517)

捕 食：蛾類幼蟲。
分 佈：雲南、四川；緬甸。

Orientichopsis formosa (Kuwayama) 麗東蝶蛉 (Hun., 1992:645)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南。

Ascalaphidae 蝶角蛉科

Acheron trux (Walker) 鋸角蝶角蛉 (Hun., 1992:648; Yang et Wang, 11997:611; Yang et al., 1995:276; Yunn., 1987:520; Zhang, 1987[ed.] 2:3)
Ascalaphus trux Walker, 1853:
=*Ascalaphus longus* Walker
=*Helicomitus ctenocerus* Gerstaecker
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、浙江、江蘇、湖北、陝西；東南亞、印度。

Ascalephus sibiricus Evermann 黃花蝶角蛉 (ASZI et al., 1978:268; He et al., 1991:91)
捕 食：小蟲。
分 佈：陝西、山東、山西、河北、內蒙古、東北。

Helicomitus dicax (Walker) 亥蝶角蛉 (Yang et Wang, 1997:612; Zhang, 1987[ed.] 2:3)
Helicomitus dicax (Walker, 1853:)
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、湖北；東南亞廣布。

Hybris subjacens (Walker) 黃脊蝶角蛉 (ASZI, 1986, 1:760; ASZI et al., 1978:268; He et al., 1991:91; Hun., 1992:648; Sun et al., 1980(4):24; Yang et Wang, 1997:611; Yunn., 1987:520; Zhang, 1987[ed.] 2:3)
Ascalaphus subjacens Walker
捕 食：幼蟲在植物上捕食小蟲及蛾蝶類幼蟲(稻田)。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、湖北、東北；朝鮮、日本、越南。

Idricerus xianganus Yang 湘完眼蝶角蛉 (Hun., 1992:649)
Idricerus xianganus Yang, 1992:649.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Protidricerus elwesi (MacLachlan) 寬完眼蝶角蛉 (Hun., 1992:649; Yang, 1992:446)
Idricerus elwesi MacLachlan, 1891:
捕 食 性。
分 佈：四川、湖南；印度。

Protidricerus exilis (MacLachlan) 完眼蝶角蛉 (Yang, 1988:207; 1992:446; Yang et Wang, 1997:612; Yunn., 1987:520)

捕 食 性。

分 佈：雲南、西藏、四川、湖北、陝西。

Protidricerus japonica (MacLachlan) 日完眼蝶角蛉 (Yang, 1992:446)

Protidricerus japonica (MacLachlan, 1891:)

捕 食 性。

分 佈：西藏、四川；日本。

Suphalasca longialata Yang 長翅蝶角蛉 (Hun., 1992:649)

Suphalacsa longialata Yang, 1992:649.

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Suphalasca umbrosa Peterson 狹翅蝶角蛉 (Yunn., 1987:521)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南。

Suphalomitus lutemaculatus Yang 黃斑蝶角蛉 (Hun., 1992:650)

Suphalomitus lutemaculatus Yang, 1992:650.

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南。

Suphalomitus rufimaculatus Yang 紅斑蝶角蛉 (Yunn., 1987:520)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Suphalomitus sp. 土斑蝶角蛉 (Yang et Wang, 1997:612; Yang et al., 1995:276)

Suphalomitus sp.

捕 食 性。

分 佈：浙江、湖北。

Nemopteridae 旌蛉科

Nemopistha sinica Yang 中華旌蛉 (Yang, 1992:448; Yunn., 1987:521)

Nemopistha sinica Yang, 1986:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Myrmeleontidae 蟻蛉科

Asialeon validum Yang 強亞蟻蛉 (Yang, 1997:614)

Asialeon validum Yang, 1997:614-615.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Botuleon maculatus Yang 小斑臘腸蟻蛉 (Yunn., 1987:518)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Botuleon maculosus Yang 多斑臘腸蟻蛉 (Yang, 1992:447; Yunn., 1987:518)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Cymatala pallora Yang 淺波翅蟻蛉 (Yang, 1992:447; Yunn., 1987:519)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Dendroleon decorillus Yang 小華樹蟻蛉 (Yang, 1997:615)
Dendroleon decorillus Yang, 1997:615.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Dendroleon javanus Banks 長裳樹蟻蛉 (Hun., 1992:646; Yang, 1997:615; Yang et al., 1995:277; Yunn., 1987:519)
Dendroleon javanus Banks, 1914:
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、雲南、四川、浙江、湖北、陝西；爪哇。

Dendroleon melanocoris Yang 黑角樹蟻蛉 (Yang, 1997:616)
Dendroleon melanocoris Yang, 1997:616.
捕 食 性。
分 佈：福建、湖北。

Dendroleon pantherius (Fabricius) 褐紋樹蟻蛉 (ASZI et al., 1978:266; He et al., 1991:91; Yang, 1997:615; Yang et 1995:277; Zhang, 1987[ed.] 2:2)
Dendroleon pantherius (Fabricius, 1787:)
捕 食：鱗翅目等多種小蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、河北、北京；歐洲。

Dendoleon decorosus Yang 華美樹蟻蛉 (Yang, 1988:207)
Dendoleon decorosus Yang, 1988:207.
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Deutoleon lineatus (Fabricius) 條斑次蟻蛉 (ASZI, 1986, 1:758; ASZI et al., 1978:266)

捕 食 性。
分 佈：山東、山西、河北、內蒙古、遼寧、吉林；韓國、蘇聯、土耳其、羅馬尼亞。

Distoleon nigricans (Okamoto) 黑斑離蟻蛉 (Hun., 1992:646; Yang, 1997:617)
Distoleon nigricans (Okamoto, 1910:)
捕 食 性。
分 佈：福建、湖南、湖北、東北；朝鮮、日本、歐洲。

Distoleon tesselatus Yang 棋腹離蟻蛉 (Hun., 1992:646; Yunn., 1987:519)
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南。

Distoleon subtentus Yang 襯斑離蟻蛉 (Yunn., 1987:520)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Distoleon symphineurus Yang 紊脈離蟻蛉 (Yang, 1992:445; Yunn., 1987:520)
Distoleon symphineurus Yang, 1992:446.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Distoleon tibetanus Yang 西藏離蟻蛉 (Yang, 1988:206)
Distoleon tibetanus Yang, 1988:206.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Distoleon yunnanus Yang 雲南離蟻蛉 (Yunn., 1987:519)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Epacanthaclisis batangana Yang 巴塘蟻蛉 (Yang, 1992:447)
Epacanthaclisis batangana Yang, 1992:447.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Epicanthaclisis continentalis Petersen 陸溪蟻蛉 (Yang, 1988:206; Yunn., 1987:518)
Epicanthaclisis continentalis Petersen
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Epicanthaclisis sp. 蟻蛉 (Yang et al., 1995:277)
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Euroleon sinicus (Navás) 中華東蟻蛉 (ASZI, 1986, 1:759; ASZI et al., 1978:266; He et al., 1991:91)

捕 食：鱗翅目

鞘翅目(幼蟲)。

分 佈：湖南、四川、陝西、山西、河北、北京、內蒙古；蒙古。

Eureleon sanxianus Yang 三峽東蟻蛉 (Yang, 1997:618)

Eureleon sanxianus Yang, 1997:618.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Glenuroides japonicus (MacLachlan) 白雲蟻蛉 (ASZI et al., 1978:267: Hun., 1992:647; Yang, 1997:616; Yang et al., 1995:277; Zhang, 1987[ed.] 2:2)

Glenuroides japonicus (MacLachlan, 1867:)

捕 食：小蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、湖北、河北、北京；朝鮮、日本。

Glenuroides pumilus Yang 小白雲蟻蛉 (Yang, 1997:616)

Glenuroides pumilus Yang, 1997:616-617.

捕 食 性。

分 佈：福建、湖北。

Glenuroides sp. (Wei et al., 1980(4):39)

Glenuroides sp. Wei et al., 1980(4):39.

棲 息：白玉蘭。

捕 食：肉食性。

分 佈：廣東。

Glenurus atomatus Yang 微點織蟻蛉 (Yang, 1992:446; Yunn., 1987:519)

Glenurus atomatus Yang, 1986:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Glenurus fuscilomus Yang 棕邊織蟻蛉 (Yunn., 1987:519)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Grocus sagax (Walker) 蟻蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)

捕 食 性。

分 佈：江西。

Grocus sp. 蟻蛉 (He et al., 1991:91)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：北京。

Grocus sp. 小褐蟻蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)
捕 食：蟻。
分 佈：江西。

Hagenomyia asakurae Okamoto 四斑蟻蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Hagenomyia brunneipennis Petersen 褐翅哈蟻蛉 (Yang et al., 1995:277)
Hagenomyia brunneipennis Petersen, 1913:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、浙江。

Hagenomyia micans (MacLachlan) 閃爍哈蟻蛉 (Yunn., 1987:520; Zhang, 1987[ed.] 2:3)
別 名：*耀蟻蛉*。
捕 食 性。
分 佈：江西、雲南。

Heoclisis japonica (MacLachlan) 追擊大蟻蛉 (ASZI, 1986, 1:759; ASZI, et al., 1978:267; He, et al., 1991:91; Hun., 1992:647; Zhang, 1987[ed.] 2:3)
捕 食：金龜子
螻蛄
等大型昆蟲均能捕食
(稻田)。
分 佈：江西、湖南、江蘇、河南、山東、河北、北京、遼寧；韓國、日本。

Heoclisis sp. (Wei et al., 1980(4):39)
Heoclisis sp. Wei et al., 1980(4):39.
棲 息：甜橙。
捕 食：肉食性。
分 佈：廣東。

Hyloleon phodocerus Navás 條斑蟻蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:3)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Myrmeleon bore (Tjeder) 鈎臀穴蟻蛉 (Yang, 1992:447; 1997:618)
Myrmeleon bore (Tjeder, 1941:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川、湖北、陝西；日本、歐洲。

Myrmeleon formicarius Linnaeus 泛蟻蛉 (Yunn., 1987:520)

捕 食 性。

分 佈：雲南；亞洲、歐洲。

Myrmeleon (Morter) sagax (Walker) 穴蟻蛉 (Zhou et al., 1992, 14(1):42-46; 1994, 16(3):141-147)

捕 食 性。

分 佈：廣東。

Myrmeleon zanganus Yang 藏蟻蛉 (Yang, 1988:206)

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Myrmeleon sp. 攀天閣蟻蛉 (Yang, 1992:447)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Neochauliodes meridionalis Weele 南方斑齒蛉 (Yang et Yang, 1992:435)

Neochauliodes meridionalis Weele, 1909:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、廣東、貴州、雲南、四川、浙江、山東；越南、寮國。

Neochauliodes sinensis (Walker) 中華斑齒蛉 (Yang et Yang, 1992:435)

Neochauliodes sinensis (Walker, 1853:)

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川、浙江、湖北。

Neochauliodes sp. (Wei et al., 1980(4):39)

Neochauliodes sp. Wei et al., 1980(4):39.

棲 息：甜橙。

捕 食：肉食性。

分 佈：廣東。

Palpares sinicus Yang 中華長須蟻蛉 (Yunn., 1987:518)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Pantheroleon longicruris Yang 長腿豹蟻蛉 (Yunn., 1987:519)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Pseudoformicaleo jacobsoni Weele 杰齊脈蟻蛉 (Hun., 1992:648)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、華北；日本。

Pseudoformicaleo pallidius Yang 淡齊脈蟻蛉 (Yunn., 1987:519)

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Yunleon fluctosus Yang 紋腹雲蟻蛉 (Yang, 1988:206)

Yunleon fluctosus Yang, 1988:206.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Yunleon longicorpus Yang 長腹雲蟻蛉 (Yang, 1992:446; Yunn., 1987:519)

Yunleon longicorpus Yang, 1986:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Chrysopidae 草蛉科

(Chen et al., 1996, 12(1):39-42; Fan et al., 1990:158-163; Shi, 1980[ed.]:116-119; Xie et Sterling, 1987, 14(3):154; Yan et Mei, 1996, 22(5):24-25; Yang, 1988:131-136; Yue, 1989:149-159)

Ancylopteryx octopunctata (Fabricius) 八斑絹草蛉 (ASZI, et al., 1978:264; He, et al., 1991:90; Hun., 1992:652; Pan et al., 1987:186; Wei et al., 1985(2):55; Wei et al., 1987:21; Yang et Yang 1993:265; Yunn., 1987:515; Zhang, 1987[ed.] 2:1; Zhao, 1989:107-113, 231)

Ankyloptryx octopunctata (Fabricius, 1793:)

棲 息：甜橙、黃皮、檸檬、龍眼、荔枝、檬果、沙梨、桃、蒲桃、人心果、橄欖、石栗粟、白玉蘭、白千層、羊蹄夾、珊瑚樹、黃槐、米仔蘭、長豇豆、竹。

捕 食：葉蟬

粉蝨

橘蚜

桃蚜

棉蚜

豆蚜

竹蚜

蚜蟲

Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧(廣東)鱗翅目(卵及低齡幼蟲)

葉蟎。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、四川；菲律賓、中南半島、印尼、印度、斯里蘭卡。

Anisochrysa sp. 白臉草蛉 (Wei et al., 1980(4):38; Wei et al., 1985, 12(1):50, 56; Zhao, 1989:99-107)

Anisochrysa sp. Wei et al., 1985:50.

棲 息：白玉蘭、桃、楊桃、橙樹、黃皮、檬果、龍眼、荔枝、蘋婆、番石榴、蒲桃、鳳眼果、人心果、珊瑚樹、茉莉花、茶花、米蘭、竹、豇豆、茄、節瓜、冬瓜、黃槐、珊瑚樹、竹、米仔蘭、茶花、節瓜、冬瓜、長豇豆等。
捕 食：葉蟬
木蝨
粉蝨
蚜蟲
蚧蟲
豆莢螟(卵及低齡幼蟲)
葉蟎。
分 佈：廣東、海南。

Ankylopteryx fraterma Banks (Zhao, 1989:231)
Ankylopteryx fraterma Banks, 1939:
捕 食 性。
分 佈：中國。

Ankyloptryx gracilis Nakahara (Zhao, 1989:231)
Ankyloptryx gracilis Nakahara, 1955:
=*Ankyloptryx doleschaii*; Banks, 1937:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Ankyloptryx laticosta Banks (Zhao, 1989:231)
Ankyloptryx laticosta Banks,1939:
捕 食 性。
分 佈：中國。

Ankyloptryx quadrimaculata (Guérin) (Zhao, 1989:231)
Ankyloptryx quadrimaculata (Guérin)
Ankyloptryx quadrimaculata; Hagen, 1866:
Hemerobius quadrimaculata Guérin
Chrysopa quadrimaculata; Schneider, 1851:
捕 食 性。
分 佈：中國。

Anomalochrysa issikii Kuwayama (Zhao, 1989:231)
Anomalochrysa issikii Kuwayama
捕 食 性。
分 佈：臺灣。
附 註：可能為 *Tumeochrysa.*

Brinckochrysa guiana Yang 桂邊草蛉 (Zhao, 1989:229)
Brinckochrysa guiana Yang, 1985:

捕 食 性。
分 佈：廣西。

Brinckochrysa qiongana Yang 瓊邊草蛉 (Zhao, 1989:229)
Brinckochrysa qiongana Yang, 1985:
捕 食 性。
分 佈：廣東

Brinckochrysa shuana Yang 蜀邊草蛉 (Zhao, 1989:229)
Brinckochrysa shuana Yang, 1985:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Brinckochrysa turgida (Yang et Wang) 膨板邊草蛉 (Yang, 1997:595)
Brinckochrysa turgida (Yang et Wang, 1990:)
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Brinckochrysa zina (Navás) 秉氏邊草蛉 (Yang, 1997:595)
Brinckochrysa zina (Navás, 1933:)
捕 食 性。
分 佈：江蘇、湖北。

Chrysocerca formosana (Okamoto) 紅肩尾草蛉 (Wei et al., 1980(4):39; Wei et al., 1987:21; Wu, 1999:4; Yunn., 1987:516; Zhao, 1989:91)
Pseudochrysa formosana Okamoto, 1914: ; (Taiwan).
Chrysocerca formosana; Navás, 1915:
棲 息：鳳眼果、桃、荔枝、龍眼、甜橙、黃皮、檬果、蒲桃、人心果、白玉蘭、八寶樹、紅黃豆、珊瑚樹、大葉紫薇。
捕 食：葉蟬
粉蝨
蚜蟲
蚧蟲
葉蟎。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、雲南。

Chrysopa abbreviata Curtis 短體草蛉 (Yang, 1990:235; 1996:98)
Chrysopa abbreviata Curtis, 1834:520.
=*Chrysopa immaculata* Stephens, 1836:103.
=*Hemerobius chlorophanus* Ratzeburg, 1944:248.
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古；亞洲、歐洲。

Chrysopa adonis Banks (Zhao, 1989:223)

Chrysopa adonis Banks, 1937:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chrysopa alethes Banks (Zhao, 1989:223)
Chrysopa alethes Banks, 1940:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Chrysopa altaica Holzel 阿勒泰草蛉 (Yang et Yang, 1990:226)
Chrysopa (s. str.) *altaica* Holzel, 1967:254.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古。

Chrysopa bicristata Tjeder (Zhao, 1989:223)
Chrysopa bicristata Tjeder, 1936:
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅。

Chrysopa bineura Navás (Zhao, 1989:223)
Chrysopa bineura Navás, 1936:
捕 食 性。
分 佈：江西(牯嶺)。

Chrysopa cantonensis Navás 廣東草蛉 (Zhao, 1989:224)
Chrysopa cantonensis Navás, 1931:
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Chrysopa calathina Yang et Yang 兜草蛉 (Yang et Yang, 1989:13)
Chrysopa calathina Yang et Yang, 1989:13.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Chrysopa cephalica Navás 草蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1989:224)
Chrysopa cephalica Navás, 1936:
捕 食 性。
分 佈：江西(牯嶺)、江蘇。

Chrysopa chemoensis (Navás) (Zhao, 1989:224)
Cintameva chemoensis Navás, 1936:
捕 食 性。
分 佈：江蘇(Chemo)。

Chrysopa chione Banks (Zhao, 1989:224)

Chrysopa chione Banks, 1940:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Chrysopa chusanina Navás 舟山草蛉 (Zhao, 1989:224)

Chrysopa chusanina Navás, 1933:

捕 食：

分 佈：浙江(舟山草嶺)。

Chrysopa cognatella Okimoto (Zhao, 1989:224)

Chrysopa cognatella Okimoto, 1914:

=*Chrysopa hoffmani* Petersen, 1916: (Shandong).

捕 食 性。

分 佈：臺灣、山東(青島)。

Chrysopa commata Kis et Ujh 逗草蛉 (Yang et Yang, 1990:226)

Chrysopa commata Kis et Ujhelyi, 1965:349.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古。

Chrysopa decolor (Navás) 退色草蛉 (Zhao, 1989:225)

Cintanera decolor Navás, 1936:

捕 食 性。

分 佈：江西(牯嶺)。

Chrysopa decorata Peterson 飾肩草蛉 (Yunn., 1987:517; Zhao, 1989:225)

Chrysopa decorata Peterson, 1913:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、四川；日本。

Chrysopa desyphlebia Maclachlan (Zhao, 1989:225)

Chrysopa desyphlebia Maclachlan, 1894:

捕 食 性。

分 佈：四川(打箭爐)。

Chrysopa dolichoptera Navás 長翅草蛉 (Zhao, 1989:225)

Chrysopa dolichoptera Navás, 1910:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Chrysopa eormosa Brauer (Zhao, 1989:225)

Chrysopa eormosa Brauer, 1850:

=*Chrysopa burmeisteri* Schneider, 1851:

=*Chrysopa japana* Okimoto, 1919:

捕 食 性。
分 佈：山西、華北、遼寧、吉林、黑龍江、中國。

Chrysopa eudora Banks (Zhao, 1989:225)
Chrysopa eudora Banks, 1937:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chrysopa formosa Brauer 麗草蛉 (ASZI, 1986, 1:755; ASZI, et al., 1978:263; Chao et Chang, 1978:271-278; Chen et Wang, 1987:299; Chen et al., 1993:121; Dai, 1992:42; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; Dong, 1984:91; Gao, 1990:90; He et al., 1991:90; Huang, 1990[ed.]:219-226; Hun., 1992:654; Li, 1987:109; Shu et Yu, 1985:92; Wang et Yang, 1992:409; 1993:265; Wang et al., 1981(4):22;1985:93; Wang et al., 1991:79-81; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et al., 1991:102; Yang, 1996:96; 1997:596; Yang et Yang, 1992:409; Yang et al., 1992:455; Yunn., 1987:517; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1989:63-69)
Chrysopa formosa Brauer, 1851:8.
=*Chrysopa burmeisteri* Schneider, 1851:22.
=*Chrysopa japana* Okamoto, 1919:42.
捕 食：梨木蝨
粉蝨
Aphis gossypii 棉蚜
菜蚜
茶蚜
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜
蚜蟲
棉鈴蟲(卵及幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(卵及幼蟲)
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(卵、幼蟲)
小蟲
薊馬
鱗翅目(卵)
棉葉蟎
分 佈：福建、江西、湖南、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、全國各地；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲。

Chrysopa fornicata Yang et Yang 拱大草蛉 (Yang et Yang, 1990:227)
Chrysopa fornicata Yang et Yang, 1990:227.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(巴彥淖爾盟烏拉特中后聯合旗)。

Chrysopa fratercula Banks (Zhao, 1989:226)
Chrysopa fratercula Banks, 1940:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Chrysopa furcifera Okamota (Zhao, 1989:226)

Chrysopa furcifera Okamota, 1914:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Chrysopa grahami Banks (Zhao, 1989:226)

Chrysopa grahami Banks, 1940:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Chrysopa grandis (Navás) (Zhao, 1989:226)

Chrysopa grandis Navás, 1933:

捕 食 性。

分 佈：四川。

Chrysopa hummeli Tjeder 胡氏草蛉 (Yang, 1990:235; 1996:98)

Chrysopa hummeli Tjeder, 1936:23-24.

捕 食 性。

分 佈：新疆、內蒙古(烏盟：四子王旗；錫盟：二連浩特；伊盟：伊金霍洛旗、鄂托克前旗，鄂托克旗)；蒙古、蘇聯。

Chrysopa infulata Yang et Yang 飾帶草蛉 (Yang et Yang, 1990:228)

Chrysopa infulata Yang et Yang, 1990:228.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(彥淖爾盟磴口縣)。

Chrysopa intima MacLachlan 多斑草蛉 (ASZI, et al., 1978:263; Chen et al., 1993:121; He, et al., 1991:90; Huang, 1990[ed.]:219-226; Yang, 1997:596; Yang et al., 1992:455)

Chrysopa intima MacLachlan, 1893:

=*Chrysopa perla* var. *fracta* Navás, 1910:

棲 息：棗。

捕 食：蚜蟲、葉蟬、葉蟎。

分 佈：福建、雲南、四川、湖北、陝西、山西、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯(西伯利亞)。

Chrysopa jaspida Yang et Yang 玉草蛉 (Yang et Yang, 1990:228)

Chrysopa jaspida Yang et Yang, 1990:228.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(阿拉善盟阿拉善旗)。

Chrysopa kansuensis Tjeder 甘肅草蛉 (Yang et al., 1992:455; Zhao, 1989:226)

Chrysopa kansuensis Tjeder, 1936:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、甘肅。

Chrysopa kulingensis (Navás) 牯嶺草蛉 (ASZI, et al., 1978:264; He, et al., 1991:90; Huang, 1990[ed.]:219-226; Li, et al., 1990:102; Pan te al., 1987:186; Wang et Hu, 1987:25-28; Wei et al., 1987:21; Xiao, 1985(2):28; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1989:113-117, 226)

Cintameva kulingensis Navás, 1936:

捕 食：*Cinara pinea* 松蚜

Hemiberlesia pitysophila Takagi 松突圓蚧(廣東)

Matsucollus massonianae 松幹蚧

Matsucollus sinensis 華松梢蚧

蚜蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、湖北、河北。

Chrysopa magica Yang 奇緣草蛉 (Yang et Yang, 1990:236)

Chrysopa magica Yang, 1990:236.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(阿拉善盟額濟納旗)。

Chrysopa magnicauda Tjeder 大尾草蛉 (Zhao, 1989:226)

Chrysopa magnicauda Tjeder, 1936:

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Chrysopa marcida Banks (Zhao, 1989:227)

Chrysopa marcida Banks, 1937:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Chrysopa nanchanica (Navás) 南昌草蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1989:226)

Cintaameva nanchanica Navás, 1933:

捕 食 性。

分 佈：江西。

Chrysopa neimengana Yang et Yang 內蒙大草蛉 (Yang et Yang, 1990:229)

Chrysopa neimengana Yang et Yang, 1990:229.

捕 食 性。

分 佈：內蒙古(烏蘭察布盟涼城縣、呼和浩特市土默特左旗、呼倫貝爾額爾古納右旗、呼盟阿榮旗)。

Chrysopa nipponensis Okamoto (Zhao, 1989:227)

Chrysopa nipponensis Okamoto, 1914:

=*Chrysopa kurisakiana* Okamoto, 1914:

捕 食 性。

分 佈：江西、遼寧。

Chrysopa ogasawarensis Okamoto (Zhao, 1989:227)

Chrysopa ogasawarensis Okamoto, 1914:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Chrysopa pallens (Rambur) 大草蛉 (ASZI, 1986. 1:756; ASZI, et al., 1978:263; Cai et al., 1985:125-128; Chao et Chang, 1978:271-278; Chen et Wang, 1987:299; Chen et al., 1993:120; Chen et al., 1994, 25(1):87-99; Chen et al., 1996, 27(1):99-101; Chen et al., 1999, 21(1):6-8; Dai, 1992:42; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; 1997, 19(4):146-151; Dong, 1984:91; Gao, 1990:90; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; He, et al., 1991:91; He et al., 1996(4):34; Huang, 1981(3):19; Huang et al., 1990:7-12; Huang, 1990[ed.]:219-226; Hun., 1992:654; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Kuang et al., 1989:51-56; Li, 1982:28-32; Li, 1987:109; Li, et al., 1990:102; Lin et al., 1991:90; Lo et Chen, 1995:369; Lo et Wu, 1993:25-35; Lu et al., 1986:63; Peng et Zong, 19899, 16(2):93-97; Shi et al., 1989-90:81; Shu et Yu, 1985:93; Sun et al., 1980(4):24; Tang et al., 1995, 17(4):168; Wang, 1981(1-2):26-29; Wamg et Yang, 1992:409; Wang et al., 1960:371; Wang et al., 1991:79-81; Wei et al., 1980(4):38; Wei et al., 1987:21; Wu, 1999:4; Wu et Ji, 1989:151-155; Wu et Lo, 1988:202-209; Xiao, 1985(2):28; Xiao et al., 1991:120, 121, 130; Xu et Mu, 1989, 26(2):151-156; Xu et Mu, 1998, 20(4):145-149; Xu et al., 1998, 7(1): ; Yang, 1997:597; Yang et Yang, 1993:265; Yang et al., 1992:455; Yu et Chen, 1998:42; Yunn., 1987:517; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhang et al., 1993(3):46-47; Zhao, 1988, 15(2):123-127; Zhao, 1989:50-62; Zhao et al., 1990:2; Zong et al., 1984:248; Zong et al., 1986:118)

Chrysopa pallens (Rambur, 1838:)
=*Chrysopa bipunctata* Burmeister, 1839: (山東青島)
=*Chrysopa septempunctata* Wesmeal, 1841: (四川)
=*Chrysopa cognata* Moclachlan, 1876: (四川)
=*Nothochrysa robusta* Gerstm 1893:
=*Cintameva ricciana* Navás, 1910:
=*Cintameva septempunctata*; Navás, 1927: (甘肅)
=*Cintameva cognata* var. *media* Navás, 1929: (甘肅)
=*Cintameva cognata* var. *mediata* Navás, 1929: (Tscherdschui)
=*Cintameva cognata*; Navás, 1931:
=*Chrysopa septempunctata cognata* Maclachlan, 1932: (臺灣)
=*Cintameva cognata* var. *fronalis* Navás, 1934: (江蘇)

棲 息：甜橙、黃皮、柚、桃、蒲桃、李、梅、枇杷、棗、龍眼、檬果、柿、番石榴、橄欖、木瓜、葡萄、白玉蘭、珊瑚樹、蒲葵、竹、竹柏、枸杞、長豇豆、節瓜、絲瓜、冬瓜、粉葛、紫蘇、茶、茶花、紅花楹、南洋杉、柚木、榕樹

捕 食：葉蟬
稻蝨(若蟲)
梨木蝨
Diaphorina citri Kuwayama 柑橘木蝨
粉蝨
Bravicoryne brassicae 菜蚜(甘藍蚜)
Eriosoma lanigerum 蘋果綿蚜
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
桃粉蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜(Wang et al., 1963:38)
Aphis sacchari Zehntner 高粱蚜

Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜
橘蚜
橘二叉蚜
麥蚜
柳蚜
竹蚜
豆蚜
茶蚜
日本松幹蚧
Panonychus citri (McGregor) 柑橘全爪蟎
蚧蟲
潛葉蛾(卵、幼蟲、蛹)
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵、小幼蟲)
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(卵、幼蟲)
粉白蝶(卵及低齡幼蟲)
鳳蝶(卵及低齡幼蟲)
Contarinia sp. 茉莉花癭蚊(Song et Cai, 1991:107)
蠅類
Cladius pectinicornis (Linnaeus) 玫瑰櫛角葉蜂
Trichiocampus cannabis Xiao et Huang 大麻毛怪葉蜂
Nematus hequensis Xiao 河曲絲葉蜂。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧等全國除西藏外都有分佈；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲。

天 敵：*Telenomus aorobates* 黑卵蜂。

Chrysopa perla var. **divisa** Navás (Zhao, 1989:227)

Chrysopa perla var. *divisa* Navás, 1910:

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Chrysopa perlexa Maclachlan (Zhao, 1989:227)

Chrysopa perlexa Maclachlan, 1887:
=*Cintameva kreyenbergi* Navás, 1933:

捕 食 性。

分 佈：四川、山東。

Chrysopa phyllochroma Wesmael 葉色草蛉 (ASZI, 1986, 1:756; Chen et Wang, 1987:299; Chen et al., 1993:121; Dai, 1992:42; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; Dong, 1984:91; He, et al., 1991:90; Huang, 1990[ed.]:219-226; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Nan et al., 1987:125; Wang et al., 1981(4):22; Wang et al., 1991:79-81; Wu et al., 1991:28; Yang, 1996:96; 1997:597; Yan et al., 1992:455; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1989:69-75, 227)

Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841:209.
=*Chrysopa tenella* Brauer, 1851:5.

=*Chrysopa pussila* Brauer, 1851:7.
棲 息：
捕 食：梨木蝨
棉蚜
茶蚜
蚜蟲
鱗翅目(卵及幼蟲)
葉蟎。
分 佈：江西、貴州、西藏、四川、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、新疆、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、西伯利亞、歐洲。

Chrysopa pictifacialis Ynag 彩面草蛉 (Yang, 1988:204)
Chrysopa pictifacialis Yang, 1988:204.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Chrysopa pieli (Navás) (Zhao, 1989:228)
Cintomeva pieli Navás, 1931:
捕 食 性。
分 佈：上海。

Chrysopa postica Navás (Zhao, 1989:228)
Chrysopa postica Navás, 1936:
捕 食 性。
分 佈：浙江(舟山)。

Chrysopa remota Walker (Zhao, 1989:228)
Chrysopa remota Walker, 1853:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chrysopa ricciana Navás 琉璃草蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)
Chrysopa ricciana Navás
捕 食 性。
分 佈：江西。

Chrysopa ruficeps Maclachlan 紅頭草蛉 (Zhao, 1989:228)
Chrysopa ruficeps Maclachlan, 1875:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Chrysopa savioi Navás (Zhao, 1989:228)

Chrysopa savioi Navás, 1933:
捕 食 性。
分 佈：香港(九龍)。

Chrysopa shansiensis Kuwayama 晉草蛉 (ASZI, 1986, 1:757; Chao et Chang, 1978:271-278; Chen et Wang, 1987:299; Chen et al., 1993:121; Fu, 1995(3):43; He, et al., 1991:91; Peng, 1988:137; Ren et al., 1991:157; Wei et al., 1980(4):38; Wei et al., 1987:21; Wu et Ji, 1989:151-155; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1987, 14(4):273-276; Zhao, 1989:76-84, 229)
棲 息：甜橙、黃皮、桃、棗、龍眼、番石榴、板栗、白玉蘭、大葉榕、長豇豆。
捕 食：梨木蝨
Aphis citricola van der Goot 柑橘卷葉蚜
Aphis gossypi Glover 棉蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Toxoptera aurantii (Boyer et Fonscolambe) 小橘蚜
Toxoptera citricidus (Kirkaldy) 大橘蚜
蚜蟲
柑橘全爪蟎
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧
蚧蟲
鱗翅目(卵、初齡蟲)
葉蟎。
分 佈：江西、廣東、貴州、湖北、河南、陝西、山東、山西。

Chrysopa strumata Yang et Yang 突瘤草蛉 (Yang et Yang, 1990:231)
Chrysopa strumata Yang et Yang, 1990:231.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(呼倫貝爾盟陳巴爾虎旗、呼盟陳巴爾虎旗)。

Chrysopa taikuensis Kuwayama 太谷草蛉 (Zhao, 1989:229)
Chrysopa taikuensis Kuwayama, 1962:
捕 食 性。
分 佈：山西(太谷)。

Chrysopa xizangana Yang 藏普草蛉 (Yang, 1988:203)
Chrysopa xizangana Yang, 1988:203.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Chrysopa yuanensis Navás (Zhao, 1989:229)
Chrysopa yuanensis Navás, 1932:
捕 食 性。
分 佈：綏遠(青水河)。

Chrysopa yuanica Navás (Zhao, 1989:229)

Chrysopa yuanica Navás, 1932:
捕 食 性。
分 佈：綏遠(青水河)。

Chrysopa zhangi Yang 張氏草蛉 (Yang, 1996:97)
Chrysopa zhangi Yang, 1991:238.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Chrysopa zina Navás (Zhao, 1989:229)
Chrysopa zina Navás, 1933:
捕 食 性。
分 佈：浙江(舟山)。

Chrysopa sp. 綠草蛉 (Wei et al., 1987:21)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Chrysopa sp. 黑斑草蛉 (Wei et al., 1980(4):38)
棲 息：板栗、甜橙、黃皮、蒲桃、白玉蘭、珊瑚樹。
捕 食：蚜蟲
蚧蟲。
分 佈：廣東。

Chrysoperla carnea carnea (Stephens) 普通草蛉 (ASZI, 1986, 1:757; ASZI, et al., 1978:264; Beijin , Hai-dian, Agr. Sci. Res. Inst., 1980:44-45; Cai et al., 1983:82-85; Chao et Chang, 1978:271-278; Chen et Mu, 1995, 17(3):109-110; 17(4):165-166; Chen et Wang, 1987:299; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Dai, 1992:42; Dai et Zu. 1997, 19(2):49-54; Chen et al., 1993:121; Ding et Chen, 1986:97-102; Dong, 1984:91; Gao, 1990:90; Gao et Zhang, 1994, 10(1):47; He, et al., 1991: 90, 91; Huang, 1981(3):19; Huang, 1990[ed.]:219-226; Huang et Li, 1993, 16(2):18; Hun., 1992:653; Hunan, Shi-men, 1980(3):61; Li, 1982:28-32; Li, 1987:109; Li, et al., 1990:101; Li et al., 1997, 13(30:110-113; Lin et al., 1991:90; Lin et al., 1994:91-94; Lu et Wu, 1991:105; Lu et al., 1986:63; Ma et al., 1986:145-147; Mo et al., 1996, 18(4):159-162; Mu et Liu, 1987, 14(3):169-172; Nan et al., 1987:125; Pan, 1993, 19(3):234; Peng, 1985(1):2-7;1986:39; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Pu, 1987:60; Shi et al., 1989-90:81; Shu et Yu, 1985:93; Song, 1984:84; Tan et al., 1997, 24(4):341-346; Wang et al., 1986:103-107; Wang et al., 1987:55-60; Wang et al., 1989:101; Wang et al., 1991:79-81; Wei, 1987:21; Wu et Ji, 1989:151-155; Xiao et al., 1991:121, 130; Xie et al., 1999, 21(2):84; Yan et Duan, 1988, 15(1):23-27; Yang, 1996:97; Ye et Cheng, 1986:132-134; Ye et al., 1979, 6(2):11-16; Ye et al., 1981, 8(3):207-208; Yunn., 1987:517; Zhen, 1995, 11(2):90; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1982 4(2):31-37; Zhao, 1989:35-50, 229, 233; Zhao et al., 1993:22-27; Zhou et Chen, 1985(2):11-14; Zhou et Zhang, 1983:162-165; Zhou et al., Zhang et al., 1996(4):14; 1981:2-3; Zhou et al., 1980, 7(5):2-3; Zhou et al., 1985(1):8-11; Zhou et al., 1987,:21-25; Zhou et al., 1991:97-100; Zong et al., 1984:248; Zong et al., 1986:118; Zou et Zheng, 1988:114-117)
=*Hemerobius perla* Fabricius, 1775:82. (*nec* Linnaeus)
Chrysopa carnea Stephens, 1836:103. (新疆)
=*Chrysopa perla* Burmeister, 1839:980. (*nec* Linnaeus)
=*Chrysopa carnea* var. *microcephala* Brauer, 1850:
=*Chrysopa vulgaris* Schneider, 1851:68.
=*Chrysopa anpingensis* Petersen, 1913:
=*Chrysopa carnea* var. *anpingensis* Petersen, 1913:
=*Chrysopa kolthoffi* Navas, 1927:

=*Chrysopa carnea* var. *rubescens* Navas, 1927:
=*Chrysopa carnea* var. *adaptata* Navas, 1934:
=*Chrysopa carnea* var. *fulvata* Navas, 1934:
=*Chrysopa sinica* Tjeder, 1936: (四川、甘肅)
=*Chrysopa anariensis* Tjeder, 1939:31.
Chrysoperla carnea; Semeria, 1977:236.
別 名：*中華草蛉，中華通草蛉*。
捕 食：300 餘種，飛蝨
梨木蝨
粉蝨
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Bracicoyne brassicae 菜蚜(甘藍蚜)
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜
茶蚜
蚜蟲
Ceroplastes floridensis Comstock 龜蠟蚧(橡膠)
Parasaissetia nigra (Nietner) 烏副盔蚧
Panonychus citri (McGregor) 橘全爪蟎
Pseudaulacaspis cockerelli Cooley 考氏白盾蚧
Helicoverpa armigera (Hübner) 棉鈴蟲(卵及小幼蟲)
Spodoptera litura (Fabricius) 斜紋夜蛾(幼蟲)
Hyphantia cunea (Drury) 美國白蛾(卵、幼蟲)
鱗翅目(卵及初齡幼蟲)
Contarinia sp. 茉莉花癭蚊(Song et Cai, 1991:107)
Trichiocampus cannabis Xiao et Huang 大麻毛怪葉蜂
Nematus hequensis Xiao 河曲絲葉蜂
Tetranychus vinnensis 山楂葉蟎(蘋果)。
寄生蜂：*Telenomus* sp. 草蛉黑卵蜂。
分 佈：臺灣、福建、江西(牯嶺)、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇(舟山)、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、新疆、遼寧、吉林、黑龍江，全國各省區；全北區。

Chrysoperla euneura Yang et Yang 優脈通草蛉 (Yang et Yang, 1993:266)
Chrysoperla euneura Yang et Yang, 1993:266-267.
捕 食 性。
分 佈：福建、貴州。

Chrysoperla furcifera (Okamota) 叉通草蛉 (Yang et al., 1992:455)
Chrysoperla furcifera (Okamota, 1914:)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川；日本、菲律賓。

Chrysoperla qinlingensis Yang et Yang 秦通草蛉 (Yang et Yang, 1989:14)
Chrysoperla qinlingensis Yang et Yang, 1989:14.
捕 食 性。
分 佈：陝西(秦嶺)。

Chrysoperla savioi (Navás) 松氏通草蛉 (Hun., 1992:652; Wang et Yang, 1992:409; Yang, 1997:598; Yang et Yang, 1993:265; Yang et al., 1995:227)
Chrysoperla savioi (Navás, 1933:)
=*Cinetameva kulingensis* Navás
別 名：*牯嶺草蛉*。
捕 食：蚜蟲、蚧蟲等。
分 佈：江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、浙江、湖北、河北。

Chrysoperla shansiensis (Kuwayama) 晉通草蛉 (Hun., 1992:652)
Chrysopa shansiensis Kuwayama
別 名：*晉草蛉*。
捕 食：葉蟎、蚜蟲、蚧蟲、木蝨、鱗翅目卵和初齡幼蟲。
分 佈：湖南、廣東、四川、湖北、河北、北京。

Chrysoperla sinica (Tjeder) 中華通草蛉 (Wang et Yang, 1992:409; Yang, 1997:599; Yang et al., 1992:456; Yang et Yang, 1993:266;)
Chrysoperla sinica (Tjeder, 1936:)
捕 食：蚜蟲、鱗翅目卵及幼蟲、葉蟬、葉蟎。
分 佈：湖南、貴州、四川、山東、甘肅，全國廣布；朝鮮、蒙古、俄羅斯。

Chrysoperla thelephora Yang et Yang 突通草蛉 (Yang et Yang, 1989:15)
Chrysoperla thelephora Yang et Yang, 1989:15.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Chrysoperla yulinica Yang et Yang 榆林通草蟲 (Yang et Yang, 1989:16)
Chrysoperla yulinica Yang et Yang, 1989:16.
捕 食 性。
分 佈：陝西(榆林)。

Chrysopidia elegans Hölzei 角紋三階草蛉 (Yang, 1988:202)
Chrysopidia elegans Hölzei
捕 食 性。
分 佈：西藏；尼泊爾。

Chrysopidia fuscata Navás 差三階草蛉 (Yunn.:516; Zhao, 1989:230)

Chrysopidia fuscata Navás, 1914:
捕 食 性。
分 佈：雲南；四川；印度。

Chrysopidia holzeli Yang et Wang 褐斑三階草蛉 (Hun., 1992:654; Wang et Yang, 1992:409)
Chrysopidia holzeli Yang et Wang, 1992:409-410.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Chrysopidia regulata Navás 齊三階草蛉 (Yunn., 1987:516; Zhao, 1989:230)
Chrysopidia regulata Navás, 1914:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Chrysopidia remanei Holzel 畸緣三階草蛉 (Yang, 1997:600)
Chrysopidia remanei Holzel, 1973:
捕 食 性。
分 佈：西藏、湖北；尼泊爾。

Chrysopidia shennongana Yang et Wang 神農三階草蛉 (Yang, 1997:601)
Chrysopidia shennongana Yang et Wang, 1990:
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Chrysopidia sinica Yang et Wang 中華三階草蛉 (Yang, 1997:601)
Chrysopidia sinica Yang et Wang, 1990:
捕 食 性。
分 佈：湖北、甘肅。

Chrysopidia xiangana Yang et Wang 湘三階草蛉 (Hun., 1992:655; Wang et Yang, 1992:410; Yang, 1997:602)
Chrysopidia xiangana Yang et Wang, 1992:
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Chrysopidia (s. str.) **yangi** Yang 楊氏三階草蛉 (Yang, 1997:599)
Chrysopidia (s. str.) *yangi* Yang, 1997:599-600.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Chrysopidia zhaoi Yang et Wang 趙氏三階草蛉 (Yang, 1997:602)
Chrysopidia zhaoi Yang et Wang, 1990:
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Cunctochrysa albolineata (Killington) 白線草蛉 (ASZI, 1986, 1:757; Huang, 1990[ed.]:219-226; Yang, 1988:202; 1997:603; Yang et Yang, 1993:266; Yunn., 1987:517; Zhao, 1989:223)

Chrysopa albolineata Killington, 1935:

捕 食：蚜蟲、多種害蟲。

分 佈：福建、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、湖北、北京、華北；西伯利亞、亞洲、歐洲，舊北區廣布種。

Cunctochrysa shuenica Yang et al. 蜀線草蛉 (Yang et al., 1992:456)

Cunctochrysa shuenica Yang et al., 1992:456-457.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Cunctochrysa sinica Yang et Yang 中華線草蛉 (Yang et Yang, 1989:17)

Cunctochrysa sinica Yang et Yang, 1989:17.

捕 食 性。

分 佈：陝西(太白山 2200 m)。

Cunctochrysa yulongshana Yang et al. 玉龍線草蛉 (Yang et al., 1992:457)

Cunctochrysa yulongshana Yang et al., 1992:457-458.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Dichochrysa alviolata (Yang et Yang) 槽叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Navasius alviolatus Yang et Yang, 1990:320.

Dichochrysa alviolata, Yang, 1995:29.

捕 食 性。

分 佈：海南。

Dichochrysa ancistroidea (Yang et Yang) 鈎叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Navasius ancistroideus Yang et Yang, 1990:330.

Dichochrysa ancistroidea, Yang, 1995:29.

捕 食 性。

分 佈：廣西。

Dichochrysa aromatica (Yang et Yang) 香叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Mallada aromaticus Yang et Yang, 1989:18.

Dichochrysa aromatica, Yang, 1995:29.

捕 食 性。

分 佈：陝西。

Dichochrysa barkamana (Yang, Yang et Wang) 馬爾康叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Tjederina barkamana Yang, Yang et Wang, 1992:464.

Dichochrysa barkamana, Yang, 1995:29.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Dichochrysa choui (Yang et Yang) 周氏叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Mallada choui Yang et Yang, 1989:19.
Dichochrysa choui, Yang, 1995:29.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Dichochrysa cognatella (Okamoto) 魯叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Chrysopa cognatella Okamoto, 1914:70.
=*Chrysopa nakaharai* Navas, 1915:196.
=*Chrysopa hoffmanni* Esben-Petersen, 1916:301.
Dichochrysa cognatella, Yang, 1995:29.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、山東。

Dichochrysa cordata (Wang et Yang) 心叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Navasius cordatus Wang et Yang, 1992:414.
Dichochrysa cordata, Ynag, 1995:29.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Dichochrysa decolor (Navás) 退色叉草蛉 (Yang, 1995:29; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Cintameva decolor Navás, 1936:55).

Cintameva decolor Navás, 1936:55.
Dichochrysa decolor, Yang, 1995:29.
捕 食 性。
分 佈：江西、江蘇。

Dichochrysa deqenana (Yang, Yang et Wang) 德欽叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Tjederina deqenana Yang, Yang et Wang, 1992:465.
Dichochrysa deqenana, Yang, 1995:29.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Dichochrysa epunctata (Yang et Yang) 無斑叉草蛉 (Yang, 1995:29)

Navasius epunctatus Yang et Yang, 1990:331.
Dichochrysa epunctata, Yang, 1995:29.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Dichochrysa eumorpha (Yang et Yang) 優模叉草蛉 (Yang, 1995:30)

Navasius eumorpha Yang et Yang, 1990:332.
Dichochrysa eumorpha, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：福建、廣西。

Dichochrysa exiana (Yang et Wang) 鄂西叉草蛉 (Yang, 1995:30)

Tjederina exiana Yang et Wang, 1990:161.
Dichochrysa exiana, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Dichochrysa fanjingana (Yang et Wang) 梵淨叉草蛉 (Yang, 1995:30; Yang et Yang, 1993:)

Navasius fanjinganus Yang et Wang, 1989:
Dichochrysa fanjingana, Yang et Yang, 1993:266.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Dichochrysa flexuosa (Yang et Yang) 曲叉草蛉 (Yang, 1995:30)

Navasius flexuosus Yang et Yang, 1990:332.
Dichochrysa flexuosa, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Dichochrysa forcipata Yang et Yang 鉗形叉草蛉 (Yang, 1995:30; Yang et Yang, 1993:267)

=*Mallada fujianus* Yang et Yang, 1990:
Dichochrysa forcipata Yang et Yang, 1993:267-268.
捕 食 性。
分 佈：福建、貴州。

Dichochrysa formosana (Matsumura) 臺灣叉草蛉 (Yang, 1995:30; Zhao, 1989:225)

Chrysopa vittata var. *formosana* Matsumura, 1910:45.
=*Chrysopa sauteri* Esben-Petersen, 1913:258.
=*Chrysopa yamamurae* Nakahara, 1915:122.
=*Anomalochrysa babai* Kuwayama, 1962:372.
Dichochrysa formosana, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：臺灣；日本。

Dichochrysa fuscineura (Yang, Yang et Wang) 褐脈叉草蛉 (Yang, 1995:30)

Navasius fuscineurus Yang, Yang et Wang, 1992:461.
Dichochrysa fuscineura, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Dichochrysa gradata Yang et Yang 黑階蟲草蛉 (Yang, 1995:30; Yang et Yang, 1993:266)

Dichochrysa gradata Yang et Yang, 1993:268-269.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Dichochrysa hainana (Yang et Yang) 海南叉草蛉 (Yang, 1995:30)

Navasius hainanus Yang et Yang, 1990:333.
Dichochrysa hainana, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Dichochrysa hespera (Yang et Yang) 和叉草蛉 (Yang, 1995:30)

Navasius hesperus Yang et Yang, 1990:335.
Dichochrysa hespera, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：海南、廣東。

Dichochrysa heudei (Navás) 震旦叉草蛉 (Yang, 1995:30; Zhao, 1989:226)

Chrysopa heudei Navás, 1934:3.
Dichochrysa heudei, Yang, 1995:30.
捕 食 性。
分 佈：江蘇。

Dichochrysa huashanensis (Yang et Yang) 華山叉草蛉 (Yang, 1995:31)

Mallada huashanensis Yang et Yang, 1989:21.
Dichochrysa huashanensis, Yang, 1995:31.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Dichochrysa ignea (Yang et Yang) 躍叉草蛉 (Yang, 1995:31)

Navasius igneus Yang et Yang, 1990:471.
Dichochrysa ignea, Yang, 1995:31.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Dichochrysa illota (Navás) 斜斑叉草蛉 (Yang, 1995:31; 1997:604; Zhao, 1989:226)

Chrysopa illota Navás, 1908:402.
Dichochrysa illota. Yang, 1995:31.
捕 食 性。
分 佈：四川、南京、湖北、華東。

Dichochrysa joannisi (Navás) 喬氏叉草蛉 (Yang, 1995:31; Zhang, 1987[ed.] 2:2; Zhao, 1989:226)

Chrysopa joannisi Navás, 1910:41.
=*Chrysopa liberata* Navás, 1935:94.
Dichochrysa joannisi, Yang, 1995:31.
別 名：*胸邊黑草蛉*。
捕 食 性。
分 佈：江西、江蘇、上海、山西。

Dichochrysa kiangsuensis (Navás) 江蘇叉草蛉 (Yang, 1995:31; 1997:604; Zhao, 1989:226)

Chrysopa kiangsuensis Navás, 1934:3.
Dichochrysa kiangsuensis, Yang, 1995:31.
別 名：*蘇草蛉*。
捕 食 性。
分 佈：四川、江蘇、湖北。

Dichochrysa lophophora (Yang et Yang) 冠叉草蛉 (Yang, 1995:31)
Navasius lophophora Yang et Yang, 1990:472.
Dichochrysa lophophora, Yang, 1995:31.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Dichochrysa mediata Yang et Yang 間綠叉草蛉 (Yang, 1995:31; Yang et Yang, 1993:269)
Dichochrysa mediata Yang et Yang, 1993:269-270.
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Dichochrysa medogana (Yang) 墨脫叉草蛉 (Yang, 1988:202; Yang, 1995:31)
Chrysopa medogana Yang, 1988:202.
Dichochrysa medogana, Yang, 1995:31.
別 名：*墨脫異草蛉*。
捕 食 性。
分 佈：西藏(墨脫)。

Dichochrysa nigricornuta (Yang et Yang) 黑角叉草蛉 (Yang, 1995:31)
Navasius nigricornutus Yang et Yang, 1990:473.
Dichochrysa nigricornuta, Yang, 1995:31.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Dichochrysa phantosula (Yang et Yang) 顯溝叉草蛉 (Yang, 1995:31)
Navasius phantosulus Yang et Yang, 1990:474.
Dichochrysa phantosula, Yang, 1995:31.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Dichochrysa pieli (Navás) 鄭氏叉草蛉 (Yang, 1995:32)
Cintameva pieli Navás, 1931:1.
Dichochrysa pieli, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：江蘇、上海。

Dichochrysa prasina (Burmeister) 弓弧叉草蛉 (Yang, 1995:32)
Chrysopa prasina Burmeister, 1839:981.
=*Chrysopa abdominalis* Brauer, 1855:705.

=*Chrysopa mariana* Navas, 1905:19.
=*Chrysopa sachalinensis* Matsumura, 1911:14.
=*Chrysopa nikköensis* Okamoto, 1914:69.
=*Chrysopa caucasica* Navás, 1914:212.
=*Chrysopa burri* Navás, 1914:212.
Dichochrysa prasina, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江。

Dichochrysa punctilabris (McLachlan) 麻唇叉草蛉 (Yang, 1995:32; Zhao, 1989:228)
Chrysopa punctilabris McLachlan, 1894:427.
Dichochrysa punctilabris, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Dichochrysa qingchengshana (Yang, Yang et Wang) 青城叉草蛉 (Yang, 1995:32)
Navasius qingchengshana Yang, Yang et Wang, 1992:462.
Dichochrysa qingchengshana, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Dichochrysa qinlingensis (Yang et Yang) 秦嶺叉草蛉 (Yang, 1995:32; 1997:605)
Mallada qinlingensis Yang et Yang, 1989:22.
Dichochrysa qinlingensis, Yang, 1`995:32.
捕 食 性。
分 佈：湖北、陝西。

Dichochrysa sana (Yang et Yang) 康叉草蛉 (Yang, 1995:32)
Navasius sanus Yang et Yang, 1990:475.
Dichochrysa sana, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Dichochrysa tridentata (Yang et Yang) 三齒叉草蛉 (Yang, 1995:32)
Navasius tridentatus Yang et Yang, 1990:476.
Dichochrysa tridentata, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：海南。

Dichochrysa verna (Yang et Yang) 春叉草蛉 (Yang, 1995:32)
Mallada vernus Yang et Yang, 1989:23.
Dichochrysa verna, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Dichochrysa vitticlypea (Yang et Wang) 唇斑叉草蛉 (Yang, 1995:32; Yang, 1997:606)

Navasius vitticlypeus Yang et Wang, 1990:159.
Dichochrysa vitticlypea, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Dichochrysa wangi (Yang, Yang et Wang) 王氏叉草蛉 (Yang, 1995:32)
Navasius wangi Yang, Yang et Wang, 1992:462.
Dichochrysa wangi, Yang, 1995:32.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Dichochrysa wuchangana (Yang et Wang) 武昌叉草蛉 (Yang, 1995:33)
Navasius wuchanganus Yang, et Wang, 1990:160.
Dichochrysa wuchangana, Yang, 1995:33.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Dichochrysa yuxianensis (Bian et Li) 盂縣叉草蛉 (Yang, 1995:33)
Navasius yuxianensis Bian et Li, 1992:213.
Dichochrysa yuxianensis, Yang, 1995:33.
捕 食 性。
分 佈：山西。

Glenochrysa guangzhouensis Yang et Yang 廣州璃草蛉 (Wei et al., 1987:21; Yang et Yang, 1991:212)
Glenochrysa guangzhouensis Yang et Yang, 1991:212.
捕 食 性。
分 佈：廣東(廣州)。

Glenochrysa sinica Yang 中華璃草蛉 (Zhao, 1989:230)
Glenochrysa sinica Yang, 1985:
捕 食 性。
分 佈：江西、廣東、廣西。

Glenochrysa splendia (Weele) (Zhao, 1989:230)
Glenochrysa splendia (Weele, 1909:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建。

Italochrysa aequalis (Walker) (Zhao, 1989:222)
Chrysopa aequalis Walker, 1853:
Nothochrysa aequalis; Navás, 1927:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、江蘇。

Italochrysa aequenana Yang 迪慶意草蛉 (Zhao, 1989:222)

Italochrysa aequenana Yang,1985:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Italochrysa brevicornis Yang et Wang 短角意草蛉 (Yang et Lin, 1997:593)
Italochrysa brevicornis Yang et Wang, 1994:
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Italochrysa conflexa Yang et Wang 彎突意草蛉 (Yang, 1997:594)
Italochrysa conflexa Yang et Wang, 1991:
捕 食 性。
分 佈：福建、江西、廣西、湖北。

Italochrysa deqenana Yang 迪慶意草蛉 (Yunn., 1987:516)
Italochrysa deqenana Yang
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Italochrysa japonica (MacLachlan) 日意草蛉 (Hun., 1992:655; Wang et Yang, 11992:411; Yang, 1997:594; Yang et Yang, 1993:265; Yunn., 1987:516; Zhao, 1989:222)
Nothochrysa japonica MacLachlan, 1875:
=*Nothochrysa modesta* Nakahara, 1955: (Taiwan)
Italochrysa japonica; Kuwayama, 1970:
捕 食：蚜蟲等。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、水蘇、安徽、湖北、甘肅；朝鮮、日本。

Italochrysa longligana Yang 龍陵意草蛉 (Yunn., 1987:516; Zhao, 1989:222)
Italochrysa longligana Yang, 1985:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Italochrysa ludingana Yang et al. 瀘定意草蛉 (Yang et al., 1992:458)
Italochrysa ludingana Yang et al., 1992:458-459.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Italochrysa megista Wang et Yang 巨意草蛉 (Hun., 1992:655; Wang et Yang, 1992:411; Yang et Yang, 1993;265)
Italochrysa megista Wang et Yang, 1992:411-413.
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州。

Italochrysa oberthuri (Navás) (Zhao, 1989:222)

Nothochrysa oberthuri Navás, 1908:
捕 食 性。
分 佈：中國。

Italochrysa sichuanica Yang et al. 四川意草蛉 (Yang et al., 1992:459)
Italochrysa ssichuanica Yang et al., 1992:459-460.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Italochrysa subcastalis (Navás) (Zhao, 1989:222)
Nothochrysa subcastalis Navás, 1917:
捕 食 性。
分 佈：中國。

Italochrysa tetramaculata (Guérin) (Zhao, 1989:222)
Hemerobius tetramaculata Guérin
Nothochrysa tetramaculata; Wu, 1935:
捕 食 性。
分 佈：中國。

Italochrysa uchidae (Kuwayama) (Zhao, 1989:222)
Nothochrysa uchidae Kuwayama, 1927:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Italochrysa wulingshana Yang et Wang 武陵意草蛉 (Hun., 1992:655; Wang et Yang, 1992:413)
Italochrysa wulingshana Yang et Wang, 1992:413.
捕 食 性。
分 佈：湖南。

Italochyrsa yongshengana Yang et al. 永勝意草蛉 (Yang et al., 1992:460)
Italochyrsa yongshengana Yang et al., 1992:460-461.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Italochrysa yunnanica Yang 雲南意草蛉 (Yunn., 1987:516; Zhao, 1989:223)
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Italochrysa sp. 意草蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Leucochrysa albescens Navás (Zhao, 1989:230)

Leucochrysa albescens Navás, 1932:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Leucochrysa modesta Navás 適白草蛉 (Zhao, 1989:230)
Leucochrysa modesta Navás, 1935:
捕 食 性。
分 佈：浙江(天目山)。

Leucochrysa ornatissima Nakahara 盛裝白草蛉 (Zhao, 1989:230)
Leucochrysa ornatissima Nakahara, 1955:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Mallada aromaticus Yang et Yang 香瑪草蛉 (Yang et Yang, 1989:18)
Mallada aromaticus Yang et Yang, 1989:18.
捕 食 性。
分 佈：陝西。

Mallada basalis (Walker) 基徵草蛉 (Chang, 2000 (2):73-87; Chang et Huang, 1994:557-558; 1995:41; Chang et al., 1993:144-145; 1994:144-145; Chen et al., 1994:25-32; Chiu et Lo, 1985:4; Lee, 1994:47-52; 557; 1995:11-17; 1999:11-16; Lo, 1997:60; Lo et Wu, 1993:25-35; Tseng et Kao, 1996:203-213; 386; 1998:431; Tseng et al., 1995:364; Wu, 1992:81-89; 1995:113-123; 1999:4; Wu et Lin, 1998:15; Yang et al., 1998:117-125; Yu et Chen, 1998:42; 2000, (12):30; Zhao, 1989:223)
Chrysopa basalis Walker, 1853:
=*Chrysopa formosana* Petersen, 1913:
=*Chrysopa peterseni* Okamoto, 1919:
=*Mallada stigmatus* Navas, 1925:
=*Anisochrysa paradoxa* Nakahara, 1955:
捕 食：*Tetranychus kanzawai* Kishida 神澤氏葉蟎
Tetranychus urticae (Koch) 二點葉蟎
粉蝨
Toxoptera auraantii
蚜蟲
蚧蟲
潛蠅
柑橘潛葉蛾。
分 佈：臺灣。

Mallada boninensis (Okamoto) 亞非瑪草蛉 (ASZI, 1986, 1:757; Chen et al., 1989:96-105; Chien, 1989:187-190; Chien et Chiu, 1986:227; Chiu et Lo, 1985:3, 4, 5; He, et al., 1991:90; He et al., 1996(4):34; Huang et al., 1989:64; Huang, 1990[ed.]:219-226; Hun., 1992:652; Lee et Shih, 1981:123-124; 1982:123-124; Liu, 1989:144-164; Lo, 1997:60; Lo et Wu, 1989:182; Lo et al., 1990:166-178; Ni et Shih, 1983:292; Shi et al., 1989-90:81; Su et al., 1986:36; Wang et Yang, 1992:414; Wei, et al., 1986:174-180; 1987:21; Wen et Lee, 1981:134; Wu, 1999:4; Wu et Lo, 1988:202-209; 371-378; Xu et al., 1995, 17(3):121-124; Yang, 1997:603; Yang et Yang, 1993:265; Yang et al., 11992:461; Yu et Chen, 1998:42; Zeng, 1995, 11(2):90; Zhao, 1989;85-91; Zhao, 1998:223)
Chrysopa boninensis Okamoto, 1914:

別 名：*亞非草蛉，安平草蛉*。
捕 食：梨木蝨
柑橘潛葉蛾
Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜
甘蔗綿蚜
Aleurocanthus spiniferus (Quaint.) 黑刺粉蝨
Dialeurodes citri Ashmead 柑橘粉虱
Aphis citricola
Myzus persicae (Sulzur) 桃蚜(菸草)
Nipaecoccus filamentosus 粉蚧
Chrysomphalus anoidum (Linnaeus) 褐圓蚧
Lepiddosaphes beckii 牡蠣蚧
Pariatoria pergandei
Parlatoria zizyphi 黑點蚧
Panonychus citrus 橘全爪蟎
綿蚧
Tetranychus cinnabarinus Boisduval 朱砂葉蟎
Tetranychus kanzawai 神澤葉蟎
薊馬
鱗翅目(卵、低齡幼蟲)。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、上海、湖北、陝西、山東；日本、琉球群島、佛得角群島、密克羅尼西亞、毛里求斯、非洲(中、南部)。

Mallada choui Yang et Yang 周氏瑪草蛉 (Yang et Yang, 1989:19)
Mallada choui Yang et Yang, 1989:19.
捕 食 性。
分 佈：陝西(太白山)。

Mallada huashanensis Yang et Yang 華山瑪草蛉 (Yang et Yang, 1989:21)
Mallada huashanensis Yang et Yang, 1989:21.
捕 食 性。
分 佈：陝西(華山)。

Mallada incurvus Yang et Yang 彎瑪草蛉 (Yang et Yang, 1993:265)
Mallada incurvus Yang et Yang
捕 食 性。
分 佈：貴州。

Mallada qinlingensis Yang et Yang 秦嶺瑪草蛉 (Yang et Yang, 1989:22)
Mallada qinlingensis Yang et Yang, 1989:22.
捕 食 性。

分 佈：陝西(秦嶺)。

Mallada vernus Yang et Yang 春瑪草蛉 (Yang et Yang, 1989:23)

Mallada vernus Yang et Yang, 1989:23.
捕 食 性。
分 佈：陝西(南五臺)。

Nacaura matsumurae (Okamota) 娜網蛉 (Yang et al., 1995:277; Zhao, 1989:232)

Apochrysa matsumurae Okamoto, 1912: (Taiwan)
Nacaura matsumurae Okamoto, 1912:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Nacaura minomoana (Nakahara) (Zhao, 1989:232)

Apochrysa minomoana Nakahara, 1915:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Navasius albofrontatus (Yang et Yang) 白面納草蛉 (Yang et Yang, 1990:328)

Mallada albofrontatus Yang et Yang, 1990:
捕 食 性。
分 佈：福建(廈門：鼓浪嶼)。

Navasius allochrous (Yang et Yang) 異色納草蛉 (Yang et Yang, 1990:328)

Mallada allochrous Yang et Yang, 1990:
捕 食 性。
分 佈：福建(廈門:鼓浪嶼)。

Navasius alviolatus Yang et Yang 槽納草蛉 (Yang et Yang, 1990:329)

Navasius alviolatus Yang et Yang, 1990:329-330.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Navasius ancistroideus Yang et Yang 鈎納草蛉 (Yang et Yang, 1990:330)

Navasius ancistroideus Yang et Yang, 1990:330-331.
捕 食 性。
分 佈：廣西(寧明龍瑞)。

Navasius brachychelus (Yang et Yang) 短唇納草蛉 (Yang et Yang, 1990:331)

Mallada brachychelus Yang et Yang, 1990:
Navasius brachychelus, Yang et Yang, 1990:
捕 食 性。
分 佈：福建(德化)。

Navasius cordatus Wang et Yang 心納草蛉 (Wang et Yang, 1992:414)

Navasius cordatus Wang et Yang, 1992:414.

捕 食 性。

分 佈：湖南。

Navasius diaphanus (Yang et Yang) 亮納草蛉 (Yang et Yang, 1990:331)

Mallada diaphanus Yang et Yang, 1990:

捕 食 性。

分 佈：福建(德化)。

Navasius epunctatus Yang et Yang 無斑納草蛉 (Yang et Yang, 1990:331)

Navasius epunctatus Yang et Yang, 1990:331-332.

捕 食 性。

分 佈：廣西(寧明龍瑞)。

Navasius estriatus (Yang et Yang) 粗脈納草蛉 (Yang et Yang, 1990:332)

Mallada estriatus Yang et Yang, 1990:

Navasius estriatus, Yang et Yang, 1990:332.

捕 食 性。

分 佈：福建(廈門、鼓浪嶼)。

Navasius eumorphus (Yang et Yang) 優模納草蛉 (Yang et Yang, 1990:332)

Mallada eumorphus Yang et Yang, 1990:

Navasius eumorphus, Yang et Yang, 1990:332.

捕 食 性。

分 佈：福建、廣西。

Navasius fanjinganus Yang et Wang 梵浄納草蛉 (Wang et Yang, 1992:414)

捕 食 性。

分 佈：貴州。

Navasius flammefrontatus (Yang et Yang) 紅面納草蛉 (Yang et Yang, 1990:332)

Mallada flammefrontatus Yang et Yang, 1990:

Navasius flammefrontatus, Yang et Yang, 1990:332.

捕 食 性。

分 佈：福建(廈門)。

Navasius flexuosus Yang et Yang 曲納草蛉 (Yang et Ynag, 1990:332)

Navasius flexuosus Yang et Yang, 1990:332-333.

捕 食 性。

分 佈：廣東(廣州)。

Navasius fujianus (Yang et Yang) 福建納草蛉 (Yang et Yang, 1990:333)

Mallada fujianus Yang et Yang, 1990:

Navasius fujianus, Yang et Yang, 1990:333.
捕 食 性。
分 佈：福建(邵武、崇安、建歐、政和)。

Navasius fuscineurus Yang et al. 褐脈納草蛉 (Yang et al., 1992:461)
Navasius fuscineurus Yang et al., 1992:461-462.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Navasius hainanus Yang et Yang 海南納草蛉 (Yang et Yang, 1990:333)
Navasius hainanus Yang et Yang, 1990:333-335.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺三分區)。

Navasius hesperus Yang et Yang 和納草蛉 (Yang et Yang, 1990:335)
Navasius hesperus Yang et Yang, 1990:335-336.
捕 食 性。
分 佈：海南(崖縣梅山)、廣東(廣州)。

Navasius igneus Yang et Yang 躍納草蛉 (Yang et Yang, 1990:471)
Navasius igneus Yang et Yang, 1990:471-472.
捕 食 性。
分 佈：海南(安峰)。

Navasius lophophorus Yang et Yang 冠納草蛉 (Yang et Yang, 1990:472)
Navasius lophophorus Yang et Yang, 1990:472-473.
捕 食 性。
分 佈：海南(崖縣梅山)。

Navasius nigricornutus Yang et Yang 黑角納草蛉 (Yang et Yang, 1990:473)
Navasius nigricornutus Yang et Yang, 1990:473-474.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺天池)。

Navasius phantosulus Yang et Yang 顯溝納草蛉 (Yang et Yang, 1990:474)
Navasius phantosulus Yang et Yang, 1990:474-475.
捕 食 性。
分 佈：廣西(南寧)。

Navasius qingchengshanus Yang et al. 青城納草蛉 (Yang et al., 1992:462)
Navasius qingchengshanus Yang et al., 1992:462.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Navasius sanus Yang et Yang 康納草蛉 (Yang et Yang, 1990:475)

Navasius sanus Yang et Yang, 1990:475-476.

捕 食 性。

分 佈：廣東(廣州石牌)。

Navasius tridentatus Yang et Yang 三齒納草蛉 (Yang et Yang, 1990:476)

Navasius tridentatus Yang et Yang, 1990:476-477.

捕 食 性。

分 佈：海南(華南熱作所)。

Navasius wangi Yang et al. 王氏納草蛉 (Yang et al., 1992:462)

Navasius wangi Yang et al., 1992:462-463.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Navasius yasumatsui (Kuwayama) 黃褐納草蛉 (Yang et Yang, 1990:477; Zhao, 1989:220)

Chrysopa yasumatsui Kuwayama, 1962:14-15.

Navasius yasumatsui, Yang et Yang, 1990:477.

捕 食 性。

分 佈：福建、廣西、華北、西北；日本。

Nineta abunda Yang et Yang 多尼草蛉 (Yang et Yang, 1989:24)

Nineta abunda Yang et Yang, 1989:24.

捕 食 性。

分 佈：陝西(甘泉)。

Nineta grandis Navás (Zhao, 1989:229)

Nineta grandis Navás, 1915:

捕 食 性。

分 佈：東北。

Nineta shaanxiensis Yang et Yang 陝西尼草蛉 (Yang et Yang, 1989:25)

Nineta shaansiensis Yang et Yang, 1989:25.

捕 食 性。

分 佈：陝西(太白山、寧陝)。

Nineta vittata (Wesmael) 玉帶尼草蛉 (Hun., 1992:656; Yang, 1997:606; Yang et al., 1992:464; Zhao, 1989:229)

Nineta vittata (Wesmael, 1841:)

捕 食 性。

分 佈：湖南、四川、湖北、陝西、吉林；朝鮮、日本、西伯利亞、歐洲。

Nothochrysa sinica Yang 中華幻草蛉 (Yang, 1986:278; 1997:606)

Nothochrysa sinica Yang, 1986:278.

捕 食 性。

分 佈：湖北、陝西、甘肅。

Nothochrysa uchidae Kuwayama 褐紋大草蛉 (Zhang, 1987[ed.] 2:2)

Nothochrysa uchidae Kuwayama

捕 食 性。

分 佈：江西。

Odondochrysa hainana Yang et Yang 海南齒草蛉 (Yang et Yang, 1991:206)

Odondochrysa hainana Yang et Yang, 1991:206.

捕 食 性。

分 佈：海南、廣東。

Onychogomphus flavicaudus Chao 黃尾鈎尾箭蜓 (Chao, 1982:293)

Onychogomphus flavicaudus Chao, 1982:293.

捕 食 性。

分 佈：海南。

Plesiochrysa floccosa Yang et Yang 輻毛波草蛉 (Yang et Yang, 1991:213)

Plesiochrysa floccosa Yang et Yang, 1991:213.

捕 食 性。

分 佈：海南。

Retipenna callioptera Yang et Yang 彩翼羅草蛉 (Yang et Yang, 1993:270)

Retipenna callioptera Yang et Yang, 1993:270-271.

捕 食 性。

分 佈：貴州。

Retipenna chaoi Yang et Yang 趙氏羅草蛉 (Yang et Yang, 1987:40)

Retipenna chaoi Yang et Yang, 1987:40.

捕 食 性。

分 佈：福建(大竹嵐)。

Retipenna guangdongana Yang et Yang 廣東羅草蛉 (Yang et Yang, 1987:41)

Retipenna guangdongana Yang et Yang, 1987:41.

捕 食 性。

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Retipenna hasegawai (Nakahara) 臺灣羅草蛉 (Yang et Yang, 1987:42; Zhao, 1989:226)

Chrysopa hasegawai Nakahara, 1955:145.

Retipenna hasegawai, Brooks, 1986:

捕 食 性。

分 佈：臺灣。

Retipenna huai Yang et Yang 華氏羅草蛉 (Yang et Yang, 1987:42)

Retipenna huai Yang et Yang, 1987:42-43.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Retipenna irregularis (Navás) 雲南羅草蛉 (Yang et Yang, 1987:43; Zhao, 1989:226)
Chrysopa irregularis Navás, 1914:12.
Retipenna irregularis, Brooks, 1986:
捕 食 性。
分 佈：雲南(大理)。

Retipenna sichuanica Yang et al. 四川羅草蛉 (Yang et Yang, 1987:44; Yang et al., 1992:464)
Retipenna sichuanica Yang et al. 1992:464.
捕 食 性。
分 佈：四川(瀘定)。

Semachrysa guangxiensis Yang et Yang 廣西飾草蛉 (Yang et Yang, 1991:214)
Semachrysa guangxiensis Yang et Yang, 1991:214.
捕 食 性。
分 佈：廣西。

Semachrysa yananica Yang et Yang 延安飾草蛉 (Yang et Yang, 1989:26)
Semachrysa yananica Yang et Yang, 1989:26.
捕 食 性。
分 佈：陜西(延安)。

Sencera exquisita Nakahara (Zhao, 1989:232)
Sencera exquisita Nakahara, 1955:
捕 食 性。
分 佈：臺灣。

Sinochrysa hengduana Yang 橫斷華草蛉 (Yang, 1992:449)
Sinochrysa hengduana Yang, 1992:449.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Suarius gobiensis (Tjeder) 戈壁俗草蛉 (Yang et Yang, 1990:236)
Chrysopa gobiensis Tjeder, 1936:22.
Suarius gobiensis, Hölzel, 1970:51.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(阿拉善盟、額濟納盟)；蒙古、伊朗。

Suarius huashanensis Yang et Yang 華山俗草蛉 (Yang et Yang, 1989:28)
Suarius huashanensis Yang et Yang, 1989:28.
捕 食 性。

分 佈：陝西(華山)。

Suarius mongolicus (Tjeder) 蒙古俗草蛉 (Yang, 1996:98)

Prochrysopa mongolica Tjeder, 1936:18.
=*Chrysopa* (*Metacrysopa*) *gobica* Steinmann, 1965:181.
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古；西伯利亞。

Suarius trilineatus Yang 三斜俗草蛉 (Yang, 1996:98)

Suarius trilineatus Yang, 1991:239.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Tibetochrysa sinica Yang 華藏草蛉 (Yang, 1988:204)

Tibetochrysa sinica Yang, 1988:204.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密)。

Tjederina barkamana Yang et al. 馬爾康替草蛉 (Yang et al., 1992:464)

Tjederina barkamana Yang et al., 1992:464-465.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Tjederina deqenana Yang et al. 德欽替草蛉 (Yang et al., 1992:465)

Tjederina deqenana Yang et al., 1992:465-466.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Tjederina platypa Yang et Yang 寬柄替草蛉 (Yang et Yang, 1991:215)

Tjederina platypa Yang et Yang, 1991:215.
捕 食 性。
分 佈：廣東、海南。

Tumeochrysa immaculata (Navás) 無斑多階草蛉 (Zhao, 1989:231)

Chrysoplecta immaculata Navás, 1910:
Tumeochrysa immaculata; Banks, 1947:
捕 食 性。
分 佈：四川。

Tumeochrysa longiscape Yang 長柄多階草蛉 (Yang, 1988:202)

Tumeochrysa longiscape Yang
捕 食 性。
分 佈：西藏(林芝、樟木)。

Tumeochrysa yunica Yang 雲多階草蛉 (Yunn., 1987:516; Zhao, 1989:231)

Tumeochrysa yunica Yang, 1985:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Xanthochrysa hainana Yang et Yang 海南黃草蛉 (Yang et Yang, 1991:207)

Xanthochrysa hainana Yang et Yang, 1991:207.

捕 食 性。

分 佈：海南。

LEPIDOPTERA 鱗翅目

Psychidae 袋蛾科(蓑蛾科)

Acanthopsyche bipars Walker 碧皚袋蛾 (ASZI, 1987, 2:171; Hun., 1992:731; Zhang, 1987[ed.] 1:137)

寄 主：桃、蘋果、李、杏、黃刺莓、葡萄、黑棗、栗、核桃、落葉松、松、杉、桑、雲杉、側柏、刺槐、洋槐、榆、丁香、薔薇、枸杞、白菜。

分 佈：廣西、江西、浙江、北京；日本、印度。

附 註：幼蟲能捕食桃、李樹上的桃蚜, 洋槐樹上的洋槐蚜(*Aphis robiniae* Macchiati)，國槐樹上的國槐蚜(*Aphis sophoricola* Zhang)，黃刺莓、薔薇等樹上的月季長尾蚜(*Longicaudus trirhodus* (Walker)。

Acanthopsyche nigraplaga Wileman 黑肩袋蛾 (ASZI, 1987, 2:173; Tao, 1980:250; Xiao, 1992: 682)

別 名：*黑翅基簑蟲，刺槐袋蛾*。

寄 主：柿、黑棗、蘋果、桃、李、杏、葡萄、栗、核桃、落葉松、松、桑、洋槐、刺槐、槐樹、檀樹、柘樹、竹、黃刺梅、榆、楊、丁香、薔薇、枸杞、杉木、雲杉、柏、側柏、白菜、豆類等。

分 佈：臺灣、浙江、江蘇、山東、河北、北京、遼寧；日本、印度。

天 敵：Virus 病毒(寄生幼蟲)

細菌(寄生幼蟲,與病毒合併寄生占 11.6 %;幼蟲和蛹被寄生占 17.1 %)

真菌

白僵菌(寄生幼蟲,5.8 %)

Ichneumonidae 姬蜂科

Charitopimpla sagrea Vall (幼蟲)

Goryphus basilaris Holmgre 橫帶溝姬蜂(橫帶駝姬蜂)(幼蟲)

Goryphus longicornis Ishida (幼蟲)

簑蛾瘤姬蜂

Torymidaae 突小蜂科

單齒腿長突小蜂

Eulophidae 釉小蜂科

橫帶駝釉小蜂

鳥類捕食或其它(占 36.2 %)。

附 註：幼蟲還能捕食桃樹、李樹等寄主植物上的桃蚜、洋槐樹上的洋槐蚜、國槐樹上的國槐蚜以及薔薇、月季上的月季長尾蚜。

Blastobasidae 膠蛾科

Pseudohypatopa pulverea Meyrick 紫膠蛾 (Zagulajev et Liao, 1959:306)

Pseudohypatopa pulverea Meyrick

捕 食：*Kerria lacca* Kerr 紫膠蟲(幼蟲)。

分 佈：雲南；印度、斯里蘭卡、印尼、蘇聯。

Heliodinidae 舉肢蛾科

Beijinga utila Yang 北京舉肢蛾 (Chao, 1982:95; Xiao, 1985(2):29)

捕 食：*Eulecanium* sp. 大球堅蚧(國槐、棗樹)。

分 佈：北京、華北。

Oedematopoda semirubra Meyrick 竹紅舉肢蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:124)

捕 食：竹綿蚜。

分 佈：江西。

Sessidae 透翅蛾科 (Aegeriidae)

Chamaesphecia sp. 透翅蛾 (Pemberton et Wang, 1989:66)

寄 主：*Euphorbia esula* 乳漿大戟草根部(大戟科 Euphorbiaceae)。

分 佈：內蒙古。

Pyralidae 螟蛾科

Hypsopygia mauritalis Boisduval 蜂巢螟 (ASZI, 1987, 2:80; Song et He, 1997:1133; Wu et Xu, 1995:303; Yunn., 1987:901)

寄 主：胡蜂(幼蟲)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、河北；日本、印尼、緬甸、印度、馬達加斯加。

Isauri aphidivorax Meyr 綠線食蚜螟 (Deng et al., 1987:166; Li, et al.,:103; Liu, 1991:29)

=*Thialella* sp.

捕 食：*Ceratovacuna lanigera* Zehntner 甘蔗綿蚜

分 佈：臺灣、福建、廣西。

Nymphula enixalis (Swinhoe) 黑萍水螟 (ASZI, 1987, 2:81; Lin, 1986[ed.]:302-305; Song. 1992:454; Wu et Xu, 1995:3(Zhang, 1987[ed.] 1:152)

寄 主：滿江紅

青萍

水萍
槐葉萍(蜈蚣萍)
水浮蓮
洋久雨花
鴨舌草。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、雲南、浙江、江蘇；日本、泰國、印度。

Nymphula muttzznup Fulis 斑水螟 (Lin, 1985(2):52)
Nymphula muttzznup Fulis
寄 主：眼子菜(水田)
看麥娘
三棱草
澤瀉
蘆葦。
分 佈：吉林(四平地區)。

Nymphula responsalis (Walker) 褐萍水螟 (Song et He, 1997:1158)
Nymphula responsalis (Walker, 1866:)
寄 主：水稻、浮萍、滿江紅、水浮蓮。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、湖北；朝鮮、蘇聯(遠東)、日本、緬甸、印度、斯里蘭卡、澳洲。

Nymphula turbata (Butler) 褐萍水螟 (ASZI, 1987, 2:82; Lin, 1986[ed.]:302-305; Song, 1992:454; Wu et Xu, 1995:305; Zhang, 1987[ed.] 1:152)
寄 主：滿江紅
青萍
水萍
槐葉萍(蜈蚣萍)
水浮蓮
鴨舌草
水稻。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州浙江、江蘇、湖北；朝鮮、日本、蘇聯(遠東地區)。

Pyralis sp. 萍灰螟 (Lin, 1986[ed.]:300-302)
寄 主：綠萍。
分 佈：長江中下游及以南各省。

Pyralia sp. 荔蝽粉螟 (She et Pan, 1991:30)
寄 主：*Tessaratoma papillosa* (Drury) 荔枝蝽(成蟲體內寄生)
分 佈：福建。

Epipyropidae 蟬蛾科

Epipomponia nawai (Dyar) 蟬蛾

Epipyrops nawai Dyar, 1904:
寄 主：蟬
分 佈：臺灣；日本。

Epipomponia oncotympana Yang 蛁蟟寄蛾 (Chao, 1982:96)

寄 主：*Oncotympana* spp. 蛁蟟。
分 佈：北京。

Epipyrops sp. 蟬寄蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:121)

寄 主：蟬。
分 佈：江西。

Fulgoraecia bowringi Newman 龍眼雞寄蛾 (Chao, 1982:96; Huang et Gao, 1996:217)

寄 主：*Fulogora canlelaria* Kershaw 龍眼雞(龍眼、荔枝)。
分 佈：華南。

Momphidae 尖蛾科

Lacciferophaga yunnanea Zagulajev 膠蟲尖蛾 (Zagulajev et Liao, 1959:308)

Lacciferophaga yunnanea Zagulajev, 1959:308.
寄 主：紫膠蟲。
分 佈：雲南。

Tortricidae 捲蛾科

Bactra sp. 尖翅小捲蛾 (Lin, 1985(2):51)

Bactra sp. Lin, 1985:51.
寄 主：香附子
油莎豆
蕉草
燈心草等莎草科雜草重要天敵
分 佈：華東、華中、西北、東北；東南亞、西伯利亞、歐洲、美洲、澳洲。

Epiblema strenuana 豚草捲蛾 (Deng, 1995, 11(3):129-133; Deng et Wan, 1993, :221-226, 306-310; Wan, 1989; ; Wan, 1991:177-180; Wan et Ting, 1993, 9(2):69-75)

寄 主：*Ambrosia artemisiifolia*. 豚草
Ambrosia trifida 三裂葉豚草。
分 佈：北美大陸、澳洲(引進防治豚草)。

Sphingidae 天蛾科

Celeria (Hyles) lineata (Esper) 大戟天蛾 (Pemberton et Wang, 1989, 5(2)::64-67; Wang et Liu, 1995, 11(4):186)

寄 主：*Euphorbia esula* Linnaeus 乳漿大戟草(大戟科 Euphorbiaceae)。

分 佈：內蒙古。

Noctuidae 夜蛾科

Eublemma amabilis Moore 紫膠獵夜蛾 (ASZI, 1987, 2:222; Yunn., 1987:1066; Zhang, 1987[ed.] 1:250)

別 名：*紫膠白蟲*。

寄 主：*Kerria lacca* Kerr 紫膠蟲

分 佈：江西、廣西、雲南；新加坡、印度、斯里蘭卡。

天 敵：*Bracon greeni* Ashmead 白蟲繭蜂

Eublemma amasia Eeversmann 桃紅獵夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:250)

寄 主：蚧蟲(幼蟲)。

分 佈：江西。

Eublemma dimidilis Fabricius 二紅獵夜蛾 (Zhang, 1987[ed.] 1:250)

寄 主：蚧蟲(幼蟲)。

分 佈：江西。

Eublemma reticulata Hampson 網紋獵夜蛾 (ASZI, 1987, 2:222)

寄 主：紫膠蟲。

分 佈：廣西；斯里蘭卡。

Lycaenidae 灰蝶科

Taraka hamada Moore 甘蔗食蚜灰蝶 (Liu, 1991:29; Liu et al., 1983:136-138; Wu et Ma, 1995:411; Zhang, 1987[ed.] 1:291)

Taraka hamada Moore

捕 食：*Ceratovacuna lanigera* Zehntner 甘蔗綿蚜。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、河南、山東；朝鮮、日本、越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、泰國、緬甸、印度、錫金、不丹、印尼。

Nymphalidae 蛺蝶科

Cynthia cardui 薊蛺蝶 (Ding et al., 1994, 10(2):87-88)

寄 主：*Cirsium arvense* (L.) Scop. 薊(葉)。

分 佈：新疆。

DIPTERA 雙翅目

Psychodidae 毛蠓科

Psychoda alternata Say 毛蠓 (Li et al., 1982 4(3):37)

寄 主：*Oncomelania hupensis* 釘螺(體內)(血吸蟲的中間宿主)。

分 佈：福建。

Culicidae 蚊科

Toxorhynchitinae 巨蚊亞科

(Li, 1996, 18(1):45)

Toxorhynchities aurifluus (Edwards) 金毛巨蚊 (Yao et Xu, 1987:186)

Megarhinus aurifluus Edwards, 1921:631.

=*Toxorhychities formosensis* Ogasawara, 1939:242.

捕 食：庫蚊屬 19 種，按蚊屬 3 種，伊蚊屬 5 種，杵蚊屬和直腳蚊屬各 1 種。

分 佈：臺灣：湖北(神農架)。

Toxorhynchites edwardsi (Barraud) 黃邊巨蚊 (Cai, 1984:215; Zu, 1991:82)

Toxorhynchites edwardsi (Barraud), 1924:

捕 食 性。

分 佈：福建。

Toxorhynchites gravelyi Edward 紫腹巨蚊 (Cai, 1984:216; Xu, 1984:208; 1991:82; Xu et Wen, 1987:70)

Toxorhynchites gravelyi Edward, 1921:

捕 食 性。

分 佈：福建(梅花山、武夷山區)。

Chironomidae 搖蚊科

Crucitioys sp. 萍黃搖蚊 (Lin, 1986[ed.]:305-307; Zhang, 1987[ed.] 2:66)

別 名：*白絲蟲*。

寄 主：綠萍、水稻、水生植物(根、葉)。

分 佈：江西、浙江。

Polypedilum illunoense Hauber 二帶萍搖蚊 (Lin, 1986[ed.]:305-307; Zhang, 1987[ed.] 2:66)

寄 主：綠萍(幼蟲白色)。

分 佈：福建、江西、廣東、浙江、江蘇、湖北、山東。

Tendipes attenuatas Walker 褐搖蚊 (Lin, 1986[ed.]:305-307)

寄 主：萍(幼蟲紅色)。

分 佈：浙江。

Tendipes riparius Meigen 萍綠搖蚊 (Zhang, 1987[ed.] 2:66)

別 名：*紅絲蟲*(幼蟲紅色)。

寄 主：綠萍、水稻、水生飼料(幼蟲作筒狀泥巢，頭胸外伸取食)。

分 佈：江西、浙江。

Ceratopogonidae 蠓科

Forcepomyia (Microhelea) fuliginosa (Meigen) (Chou et al., 1994:329)

Ceratopogon fuliginosa Meigen, 1818:86.

=*Ceratopogon hirtipes* de Meijere, 1907:209.

寄 主：*Papilio xuthus* Linnaeus 鳳蝶(幼蟲)。

分 佈：臺灣；印尼(爪哇)、德國(柏林)。

Cecidomyiidae 癭蚊科

Acarolete sp. 食蟎癭蚊 (Wu et Ji, 1989:151-155)

Acarolete sp.

捕 食：棉葉蟎。

分 佈：河南。

Aphidoletes abietis 食蚜癭蚊 (Zong et al., 1986:119)

捕 食：油菜上蚜蟲。

分 佈：湖北。

Aphidoletes aphidimyza (Rondani) 食蚜癭蚊 (ASZI, 1987, 2:592, Cheng et al., 1988:24; Cheng et al., 1988:26-27; Cheng, et al., 1991:74-75; Cheng et al., 1992:97-100; Niu et al., 1990:32-34; Shi et al., 1989-90:81; Zhao et Cheng, 1990:185; Zhao, et al., 1991:75-76; 1993:215; Zong et al., 1984:249)

捕 食：60 多種蚜蟲，包括：

Aphis citricola 綉線菊蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Aphis craccivora 豆蚜
Myzus persicae (Sulzer) 桃蚜
Lipaphis erysimi (Kaltenback) 蘿蔔蚜
Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜
Diuraphis noxia (Mordvilko) 麥雙尾蚜
Brevicoryne brasicae 甘藍蚜
瓜蚜
小麥蚜等。

分 佈：上海、湖北、陝西、北京、新疆；意大利。

Arthrocnodax occidentalis Felt 西方癭蠅 (Chang et al., 1993:239-243; Lo, 1986:31-39; Lo et Chao, 1973:177; Lo et al., 1984:342)

捕 食：*Thrips palmi* Karny 椰黃薊馬

草莓葉蟎。
分 佈：臺灣。

Camptomyla sp. 癭蚊 (Yue et al., 1990, 1:33)
捕 食：樟子松球果上。
分 佈：內蒙古、黑龍江。

Colpodia sp. 圍眼癭蚊 (Lin et al., 1977:234)
捕 食：*Bradysia tritici* (Coquillett) 黃帶黑翅蕈蠅(幼蟲)(洋菇)
Heteropeza pygmaea 粗緣癭蚊(洋菇)
Henria sp. 直脈癭蚊(洋菇)
Mycophila speyeri (Barnes) 菇癭蚊。
分 佈：臺灣。

Feltiella minuta (Felt) 小癭蚊 (Ho et Chen, 1998:27-37; 2002(1):19-26; Lo, 1997:62)
捕 食：*Tetranychus cinnabarinus* (Boisduval) 硃砂葉蟎
Tetranychus kanzawai Kishida 神澤葉蟎。
分 佈：臺灣。

Lestodiplosis pentagona Jiang 桑盾盜癭蚊 (Jiang, 1994:246; Ren et al., 1991:158)
捕 食：*Pseudaulacaspis pentagona* (Targoni-Tozzetti) 桑盾蚧
Unaspis yanonensis (Kuwana) 矢根蚧。
分 佈：貴州、四川。

Mayetiola sp. 食蟎癭蚊 (Huang et Gao, 1996:143)
捕 食：*Phyllocoptruta oleivora* Ashmead 柑橘銹蟎。
分 佈：福建。

Mycodiplosis sp. 食銹癭蚊 (Gao et al., 1994, 20(2):42-43; Zhao et al., 1993:214)
捕 食：小麥銹病菌。
分 佈：陝西、甘肅。

Silvestrina tyrophagi Domb. 蟎寄生癭蚊 (Jiang, 1994:246)
捕 食：倉儲蟎類。
分 佈：四川。

癭蚊 (Feng et al., 1994, 10(3):142)
捕 食：*Oxya chinensis* 中華稻蝗(卵)。
分 佈：山西。

Tabanidae 虻科

Atylotus miser (Szilady) 僧黃虻 (ASZI, 1987, 2:612; He, et al., 1991:115)

捕 食：稻蟲。

分 佈：福建、湖南、浙江、上海、安徽、陝西、北京、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯。

Chrysops striatula Pechuman 條紋斑虻 (ASZI, 1987, 2:600; He, et al., 1991:115)

捕 食：稻蟲。

分 佈：福建、湖南、四川。

Hybomitra ciureai (Seguy) 古瘤虻 (He, et al., 1991:115)

捕 食：蚜蟲、薊馬。

分 佈：湖南、黑龍江。

Tabanus manderinus Schiner 華虻 (He et al., 1991:115)

捕 食：*Parnara guttata guttata* (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼-蛹)。

分 佈：浙江；上海、河南、北京、遼寧、吉林、黑龍江。

Tabanus atratus 黑牛虻 (Song, 1984:84)

捕 食：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

Agrotis ipsilon 小地老虎。

分 佈：湖南。

Tabanus striatus Fabricius 黑虻 (He et al., 1991:115)

捕 食：*Chilo suppressalis* (Walker) 二化螟

Mythimns separata (Walker) 粘蟲。

分 佈：湖南、廣東、廣西、雲南、西藏。

Stratiomyiidae 水虻科

Eulalia garatas Walker 小水虻 (He et al., 1991:114)

別 名：*黃綠斑水虻*。

捕 食：蚜蟲。

分 佈：臺灣、湖南、廣東沿海。

Prosopichrysa chusanensis Ouchi 舟山水虻 (He et al., 1991:114)

捕 食：稻田害蟲。

分 佈：湖南、浙江。

Acroceridae 小頭蠅科 (Cyrtidae)

Acrocera mongolica Pleske 蒙古頂角小頭蠅 (ASZI, 1987, 2:623)

別 名：*蒙古頂角小頭虻*。
寄 主：
分 佈：新疆、內蒙古。

Oncodes eespersus Séguy 膨棒突背小頭蠅 (ASZI, 1987, 2:623)
別 名：*膨棒突背小頭虻*。
寄 主：
分 佈：江蘇。

Origoneura sp. 寡脈小頭虻 (Wu, 1995:487)
寄 主：
分 佈：浙江。

Philopota globulifera Matsumura 球盾小頭蠅 (Hun., 1992:1112)
別 名：*球盾小頭虻*。
寄 主：幼蟲寄生于蜘蛛體內(Lycosidae 狼蛛科, Salticidae 跳蛛科, Clubionidae 管巢蛛科)。
分 佈：臺灣、湖南；日本。

Philopota nigroaenea Motschulsky 亮黑蛛足小頭蠅 (ASZI, 1987, 2:623)
別 名：*亮黑蛛足小頭虻*。
寄 主：
分 佈：雲南、北京；日本、西伯利亞。

Pterodontia waxelii Klug 瓦氏蜓翅小頭蠅 (ASZI, 1987, 2:622)
別 名：*瓦氏蜓翅小頭虻*。
寄 主：
分 佈：新疆；日本、西伯利亞、中亞、南歐。

Solvidae 木虻科

Solva maculata Meigen 斑木虻 (Hun., 1992:1112)
捕 食：幼蟲生活在腐木中捕食小蟲。
分 佈：湖南；日本。

Rachiceridae 腐木虻科

Rhachicerus orientalis Ouchi 東方腐木虻 (Hun., 1992:117)
寄 主：幼蟲生活在腐木中，捕食小蟲。
分 佈：湖南、浙江。

Rhagionidae 鷸虻科

Chrysopilus auratus (Fabricius) 黃毛金鷸虻 (Hun., 1992:1118)
寄 主：幼蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；亞洲中部、歐洲。

Chrysopilus basiflavus Yang et Yang 基黃金鷸虻 (Yang et Yang, 1992:355)
Chrysopilus basiflavus Yang et Yang, 1992:355.
寄 主：
分 佈：廣西。

Chrysopilus choui Yang et Yang 周氏金鷸虻 (Yang et Yang, 1989:243; 1997:1452)
Chrysopilus choui Yang et Yang, 1989:243.
寄 主：
分 佈：湖北、陝西、甘肅。

Chrysopilus fenestratus Bezzi
寄 主：
分 佈：臺灣；日本。

Chrysopilus huashanus Yang et Yang 華山金鷸虻 (Yang et Yang, 1989:244)
Chrysopilus huashanus Yang et Yang, 1989:244.
寄 主：
分 佈：陝西(華山)。

Chrysopilus lucimaculatus Yang et Yang 亮斑金鷸虻 (Yang et Yang, 1992:355)
Chrysopilus lucimaculatus Yang et Yang, 1992:355.
寄 主：
分 佈：廣西(金秀大瑤山)。

Chrysopilus neimongolicus Yang et Yang 內蒙古金鷸虻 (Yang et Yang, 1990:289)
Chrysopilus nemongolicus Yang et Yang, 1990:289.
寄 主：
分 佈：內蒙古(烏盟涼城)。

Chrysopilus ningxianus Yang et Yang 寧夏鷸虻 (Yang et Yang, 1997:1453)
Chrysopilus ningxianus Yang et Yang, 1991:
寄 主：
分 佈：湖北、寧夏。

Chrysopilus obscuralatus Yang et Yang 灰翅金鷸虻 (Yang et Yang, 1989:245)
Chrysopilus obscuralatus Yang et Yang, 1989:245.
寄 主：
分 佈：陝西(黃龍)。

Chrysopilus pallipilosus Yang et Yang 白毛金鷸虻 (Yang et Yang, 1992:354)

Chrysopilus pallipilosus Yang et Yang, 1992:354.
寄 主：
分 佈：廣西(金秀大瑤山)。

Chrysopilus pingxiangenus Yang et Yang 憑祥金鷸虻 (Yang et Yang, 1992:353)

Chrysopilus pingxiangenus Yang et Yang, 1992:353.
寄 主：
分 佈：廣西(憑祥)。

Chrysopilus quangxiensis Yang et Yang 廣西金鷸虻 (Yang et Yang, 1992:354)

Chrysopilus quangxiensis Yang et Yang, 1992:354.
寄 主：
分 佈：廣西(金秀大瑤山)。

Chrysopilus shaanxiensis Yang et Yang 陝西金鷸虻 (Yang et Yang, 1989:244)

Chrysopilus shaanxiensis Yang et Yang, 1989:244.
寄 主：
分 佈：陝西(長安南五臺)。

Chrysopilus trimaculatus Yang et Yang 三斑金鷸虻 (Yang et Yang, 1989:245; 1990:289; 1997:1452)

Chrysopilus trimaculatus Yang et Yang, 1989:245.
寄 主：
分 佈：湖北、陝西、山西、北京、甘肅、寧夏、內蒙古(烏盟察右中旗)。

Rhagio flavimedius (Coquillett) 黃色鷸虻 (Hun., 1992:117)

寄 主：幼蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；日本。

Rhagio guangsiensis Yang et Yang 廣西鷸虻 (Yang et Yang, 1993:)

Rhagio guangsiensis Yang et Yang, 1993:
寄 主：
分 佈：廣西。

Rhagio guizhouensis Yang et Yang 貴州鷸虻 (Yang et Yang, 1992:587)

Rhagio guizhouensis Yang et Yang, 1992:587.
寄 主：
分 佈：貴州

Rhagio maolana Yang et Yang 茂蘭鷸虻 (Hun., 1992:117; Yang et Yang, 1993:280)

Rhagio maolana Yang et Yang, 1993:280-281.
寄 主：幼蟲生活在樹皮下，朽木中，土壤、糞肥或水中，捕食各種小蟲。
分 佈：貴州、湖南。

Rhagio meridionalis Yang et Yang 南方鷸虻 (Hun., 1992:118; Yang et Yang , 1997:1454)

Rhagio meridionalis Yang et Yang, 1993:

寄 主：幼蟲生活在樹皮下，朽木中，土壤、糞肥或水中，捕食各種小蟲。

分 佈：福建、湖南、四川、安徽。

Vermileonidae 穴虻科

Vermiophis ganquanensis Yang 甘泉潛穴虻 (Yang, 1979:84; 131)

Vermiophis ganquanensis Yang, 1979:84.

捕 食 性。

分 佈：陝西(甘泉)。

Vermitigris sinensis Yang 中國印穴虻 (Yang, 1988:178)

Vermitigris sinensis Yang, 1988:178.

寄 主：

分 佈：廣西。

Bombyliidae 蜂虻科

Anastoechus aurecrinitus Du et Yang 金毛雛蜂虻 (Du et Yang, 1990:283)

Anastoechus aurecrinitus Du et Yang, 1990:283.

寄 主：蝗蟲(卵囊)

分 佈：北京、內蒙古(太仆寺旗)。

Anastoechus chinensis Paramonov 中國雛蜂虻 (Du, et al., 1993:444-450)

Anastoechus chinensis Paramonov

寄 主：*Locusta migratoria manilensis* (Meyen) 東亞飛蝗(卵)

分 佈：山東。

Anastoechus neimongolanus Du et Yang 內蒙雛蜂虻 (Du et Yang, 1990:284)

Anastechus neimongolanus Du et Yang, 1990:284.

寄 主：蝗蟲(卵囊)

分 佈：內蒙古(太仆寺旗、正鑲白旗、察右中旗)。

Anastoechus nigricirratus-asiaticus Becker 亞洲雛蜂虻 (Du et Yang, 1990:285)

=*Anastechus villosus* Paramonow

寄 主：

分 佈：河北、北京、青海、內蒙古(正鑲白旗、太仆寺旗、察右中旗)。

Bombylius major Linnaeus 斑翅蜂虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)

寄 主：幼蟲取食多種昆蟲

分 佈：江西。

Parageron beijingensis Yang et Yang 北京擬駝蜂虻 (Yang et Yang, 1994:273)

Parageron beijingensis Yang et Yang, 1994:273.

寄 主：

分 佈：北京(西苑)。

Systropus ancistrus Yang et Yang 鈎突姬蜂虻 (Yang et Yang, 1997:1466)

Systropus ancistrus Yang et Yang, 1997:1466-1467.

寄 主：

分 佈：湖北。

Systropus aurantispinus Evenhuis 金刺姬蜂虻 (Evenhuis, 1982:36; Yang et Du, 1991:67; Yang et Yang, 1995:496)

Systropus aurantispinus Evenhuis, 1982:36-37.

寄 主：

分 佈：福建(武夷山區)、浙江。

Systropus bifurcus Evenhuis 雙夾蜂虻 (Evenhuis, 1982:37)

Systropus bifurcus Evenhuis, 1982:37.

寄 主：

分 佈：吉林。

Systropus daiyunshanus Yang et Du 戴雲姬蜂虻 (Yang et Du, 1991:67)

Systropus daiyunshanus Yang et Du, 1991:67-69.

寄 主：

分 佈：福建(戴雲山)。

Systropus dolichochaetaus Yang et Du (Yang et Yang, 1995:497)

寄 主：

分 佈：江西、浙江、湖北、河北。

Systropus flavalatus Yang et Yang 黃翅姬蜂虻 (Yang et Yang, 1995:497)

Systropus flavalatus Yang et Yang, 1995:497.

寄 主：

分 佈：浙江。

Systropus gutianshanus Yang 古田山姬虻 (Yang et Yang, 1995:496)

Systropus gutianshanus Yang, 1995:

寄 主：

分 佈：浙江。

Systropus jianyanganus Yang et Du 建陽姬蜂虻 (Yang et Du, 1991:69)

Systropus jianyanganus Yang et Du, 1991:69.

寄 主：

分 佈：福建(建陽)。

Systropus microsystropus Evenhuis 小型姬蜂虻 (Evenhuis, 1982:35; Yang et Du, 1991:67)
Systropus microsystropus Evenhuis, 1982:35-36.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山區)。

Systropus oestrus Yang et Du 箭尾姬蜂虻 (Yang et Yang, 1995:497)
寄 主：
分 佈：浙江、河北。

Systropus perniger Evenhuis 頗黑姬蜂虻 (Evenhuis, 1982:31;Yang et Du, 1991:67)
Systropus perniger Evenhuis, 1982:31.
寄 主：
分 佈：福建(武夷山)。

Systropus serratus Yang et Yang 齒突姬蜂虻 (Yang et Yang, 1995:496)
Systropus serratus Yang et Yang, 1995:496-497.
寄 主：
分 佈：浙江。

Systropus tetradactylus Evenhuis (Evenhuis, 1982:32)
Systropus tetradactylus Evenhuis, 1982:32-35.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Systropus xingshanus Yang et Yang 興山姬蜂虻 (Yang et Yang, 1997:1467)
Systropus xingshanus Yang et Yang, 1997:1467.
寄 主：
分 佈：湖北。

Usia angustifrons Becker (Yang et Yang, 1994:273)
Usia angustifrons Becker, 1906:
寄 主：
分 佈：中國。

Usia xizangensis Yang et Yang 西藏烏蜂虻 (Yang et Yang, 1994:272)
Usia xizangensis Yang et Yang, 1994:272.
寄 主：
分 佈：西藏(浪卡子 4300 m)。

Villa aurepilosa Du et Yang 金毛絨蜂虻 (Du et Yang, 1990:285)
Villa aurepilosa Du et Yang, 1990:285.
寄 主：
分 佈：內蒙古(海拉爾)、遼寧。

Villa sp. 絨毛蜂虻 (Chen, 1995,21(4):25)

寄 主：*Locastra muscosalis* Walker 綴葉叢螟(前蛹)

分 佈：浙江。

Asilidae 食蟲虻科

Aconthopleura longimamus Loewer 長棘板食蟲虻 (Shi, 1992:1076)

Aconthopleura longimamus Loewer, 1849:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、陝西、河北、內蒙古；亞洲。

Ammophilomima trifida Hsia 三葉阿食蟲虻 (ASZI, 1987, 2:624)

捕 食：其他昆蟲。

分 佈：臺灣；日本。

Antiphrission trifarius Loewer 三列短毛食蟲虻 (Shi, 1992:1079)

捕 食 性。

分 佈：四川、內蒙古；亞洲中部、歐洲。

Archilaphria jianfenglingensis Jiang 尖峰原毛蟲虻 (Jiang, 1992:360)

Archilaphria jianfenglingensis Jiang, 1992:360-361.

捕 食 性。

分 佈：海南(尖峰嶺)。

Asilus sp. 黑脛小食蟲虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)

捕 食：葉蟬、飛蝨、雙翅目等昆蟲。

分 佈：江西。

Astochia hindostani (Ricardo) 亨氏寬跗蟲虻 (Shi, 1997:1461)

Astochia hindostani (Ricardo, 1919:)

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：湖南、湖北；印度。

Astochia inermia Hermann 小寬跗食蟲虻 (Shi, 1992:1077)

Astochia inermia Hermann, 1917:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南、雲南；泰國。

Astochia metatarsata Becker 錘寬跗食蟲虻 (Hun., 1992:1123)

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：湖南、陝西；羅馬尼亞。

Astochia scalaris Hermann 梯寬距食蟲虻 (Shi, 1997:1461)

Astochia scalaris Hermann, 1917:
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、四川；菲律賓。

Astochia virgatipes Coquillett 腫寬跗食蟲虻 (ASZI, 1987, 2:625; He, et al., 1991:115; Hun., 1992:1122; Shi, 1992:1077)
Astochia virgatipes Coquillett, 1898:
別 名：*虎斑寬跗食蟲虻，虎斑食蟲虻*。
捕 食：稻蟲，幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲
捲葉蛾
夜蛾。
分 佈：臺灣、湖南、四川、陝西、山東；日本、羅馬尼亞。

Ceraturgus cruciatus Say 克魯纖長角食蟲虻 (Shi, 1992:1081)
Ceraturgus cruciatus Say, 1917:
捕 食 性。
分 佈：雲南、陝西、河北。

Cerdistus alpinus Meigen 阿爾低顏食蟲虻 (Shi, 1992:589)
捕 食 性。
分 佈：貴州、湖北；歐洲。

Cerdistus debilis Becker 殘低顏食蟲虻 (Shi, 1992:589; 1995:494; 1997:1462)
Cerdistus debilis Becker, 1923:
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、浙江、湖北、陝西；土耳其、希臘、南斯拉夫。

Cerdistus denticulatus Loew 齒斑低顏食蟲虻 (Shi, 1992:589; 1992:11977)
Cerdistus denticulatus Loew, 1849:
捕 食 性。
分 佈：貴州、雲南、西藏、四川、陝西；亞洲、非洲。

Cerdistus erythrus Meigen 紅低顏食蟲虻 (Shi, 1992:1077)
Cerdistus erythrus Meigen, 1820:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川、河北；歐洲。

Cerdistus geniculatus Meigen 膝低顏食蟲虻 (Shi, 1992:589)
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北；歐洲。

Cerdistus jubatus Becker 聯低顏食蟲虻 (Shi, 1992:589; 1996:178)
Cerdistus jubatus Becker, 1923:79.

捕 食 性。
分 佈：湖南、新疆、內蒙古；歐洲。

Cerdistus manni Schiner 曼氏低顏食蟲虻 (Shi, 1992:589)
捕 食 性。
分 佈：湖南、湖北；蘇聯、土耳其、突尼斯。

Cophinopada chinensis (Fabricius) 中華單羽角食蟲虻 (Hun., 1992:1125; Shi, 1992:1078)
Cophinopada chinensis (Fabricius, 1794:)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東；朝鮮、日本、印度、斯里蘭卡、印尼。

Cyrtopogon daimyo Speiser 怪斜芒食蟲虻 (Shi, 1992:1081)
Cyrtopogon daimyo Speiser, 1917:
捕 食 性。
分 佈：雲南；日本。

Dasypogen japonicus Bigot 日本鈎脛食蟲虻 (Hun., 1992:1128)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、江蘇；日本。

Dasypogen teutonus Linnaeus 托伊鈎脛食蟲虻 (Hun., 1992:1129)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；亞洲、歐洲。

Dioctria linearis (Fabricius) 線突額食蟲虻 (Hun., 1992:1127; Shi, 1997:1463)
Dioctria linearis (Fabricius, 1787:)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、湖北、陝西、內蒙古；歐洲。

Dysmachus dasynotus Loew 多毛突顏食蟲虻 (Shi, 1992:589)
捕 食 性。
分 佈：四川；蘇聯、歐洲。

Eutolmus brevistylus Coquillett 短芒切突食蟲虻 (Shi, 1997:1460)
Eutolmus brevistylus Coquillett, 1898:
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、四川、湖北；朝鮮、日本。

Eutolmus mediocris Becker 中切突食蟲虻 (Shi, 1992:1078)
Eutolmus mediocris Becker, 1923:
捕 食 性。

分 佈：四川；西印度群島、匈牙利。

Eutolmus parricida Loewer 似切突食蟲虻 (Shi, 1992:1078)

Eutolmus parricida Loewer, 1848:

捕 食 性。

分 佈：雲南；亞洲。

Eutolmus rufibarbis (Meigen) 黃毛切突食蟲虻 (Shi, 1992:1078; 1995:494)

Eutolmus rufibarbis (Meigen, 1820:)

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、浙江、河北；日本、土耳其、歐洲。

Heligmoneura trifurca Shi 三叉裂肛食蟲虻 (Hun., 1992:1132; Shi, 1992:592)

Heligmoneura trifurca Shi, 1992:1132.

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：福建、湖南。

Heligmoneura yenpingensis (Bromly) 安裂肛食蟲虻 (Hun., 1992:1120; Shi, 1992:592; 1997:1464)

Heligmoneura yenpingensis (Bromly, 1928:)

捕 食：幼蟲在土壤、腐爛木材和枯枝落葉中捕食其他昆蟲，成蟲捕食飛翔中的昆蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、雲南、四川、浙江、湖北；印度。

Hoplopheromerus allochrous Shi 異色鬃腿食蟲虻 (Shi, 1992:593)

Hoplopheromerus allochrous Shi, 1992:593.

捕 食 性。

分 佈：貴州。

Hoplopheromerus armatipes (Macquart) 武鬃腿食蟲虻 (Chen, 1996, 18(1):21; Hun., 1992:1122; Shi, 1992:589; 1997:1463)

Hoplopheromerus armatipes (Macquart, 1855:)

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、貴州、四川、浙江。

Hoplopheromerus hirtiventris Becker 毛腹鬃腿食蟲虻 (Hun., 1992:1122; Shi, 1992:590; 1992: 1078; 1995:493)

Hoplopheromerus hirtiventris Becker, 1925:

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北。

Iaphria latarepunctata Macquart 側斑食蟲虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)

捕 食：多種昆蟲。

分 佈：江西。

Lagynogaster claripennis Hsia 亮細腹食蟲虻 (ASZI, 1987, 2:625)

捕 食：其他昆蟲。
分 佈：浙江。

Lagynogaster fuliginosa Hermann 煤色棒腹食蟲虻 (Shi, 1995:495)
Lagynogaster fuliginosa Hermann, 1916:
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Laphria amurensis Hermann 阿姆毛腹食蟲虻 (Shi, 1992:1083; 1995:495)
Laphria amurensis Hermann, 1914:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、浙江。

Laphria basalis Hermann 基毛腹食蟲虻 (Hun., 1992:1131; Shi, 1992:592)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南、貴州。

Laphria caspica Hermann 古毛腹食蟲虻 (Shi, 1992:1083)
Laphria caspica Hermann, 1905:
捕 食 性。
分 佈：雲南、甘肅；歐洲。

Laphria ephippium (Fabricius) 埃菲毛腹食蟲虻 (Shi, 1992:1083; 1995:495)
Laphria ephippium (Fabricius, 1781:)
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、浙江。

Laphria fimbriata Meigen 緣毛腹食蟲虻 (Hun., 1992:1132; Shi, 1992:592)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、貴州、陝西；歐洲。

Laphria fulva Meigen 金黃毛腹食蟲虻 (Hun., 1992:1132; Shi, 1992:592)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、陝西；歐洲中部及南部。

Laphria galatheri Costa 鎧毛腹食蟲虻 (Shi, 1992:592)
捕 食 性。
分 佈：湖南；德國、意大利。

Laphria grossa Shi 巨毛腹蟲虻 (Hun., 1992:1131; Shi, 1992:593)
Laphria grossa Shi, 1992:593-594.
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲，成蟲有時捕食蜜蜂、胡蜂。
分 佈：湖南、海南。

Laphria pyrrhothrix Becker 紅毛腹食蟲虻 (Shi, 1992:592)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南。

Laphria vulpine Meigen 狐毛腹食蟲虻 (Shi, 1992:1083)
Laphria vulpine Meigen, 1820:
捕 食 性。
分 佈：雲南；歐洲中部。

Leptogaster basilaris Coquillett 基細腹食蟲虻 (Hun., 1992:1118)
捕 食：幼蟲在土壤中捕食小型昆蟲，成蟲捕食蚜蟲、蚧蟲。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南；日本、菲律賓、印尼、印度。

Machimus atripes Loewer 阿圓突食蟲虻 (Shi, 1992:590)
捕 食 性。
分 佈：貴州；日本、歐洲南部及中部。

Machimus concinnus Loewer 巧圓突食蟲虻 (Shi, 1992:590; 1992:1078)
Machimus concinnus Loewer, 1870:
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北、陝西；西印度群島、西班牙。

Machimus minusculus Bezzi 小盾圓突食蟲虻 (Shi, 1992:1079)
Machimus minusculus Bezzi, 1898:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；意大利。

Machimus nevedensis Strobl 內圓突食蟲虻 (Shi, 1992:1079)
Machimus nevedensis Strobl, 1909:
捕 食 性。
分 佈：四川；西印度群島。

Machimus setibarbis Loewer 毛圓突食蟲虻 (Shi, 1992:590)
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川、湖北；土耳其、歐洲、突尼斯。

Machimus scutellaris Coquillett 毛盾圓突食蟲 (He et al., 1991:115; Shi, 1992:1079; 1995:494)
Machimus scutellaris Coquillett, 1898:
捕 食：稻蟲(成蟲)。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、四川、浙江、陝西；日本。

Machimus setibarbus Loewer 毛圓突食蟲虻 (Hun., 1992:1121)

捕 食：幼蟲在土壤、腐木、枯枝落葉中捕食地下活動的昆蟲，成蟲捕食飛翔中的直翅目、蠅、虻類、蛾蝶類、同翅目、半翅目昆蟲。
分 佈：湖南、陝西；亞洲北部、歐洲中南部。

Maira aterrima Hermann 黑棒喙食蟲虻 (Hun., 1992:1129)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南。

Merodontina abligueodentia Shi 斜齒腿食蟲虻 (Hun.1992:1125; Shi, 1992:590)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、廣西、四川。

Merodontina jianfenglingensis Hua 尖峰齒腿蟲虻 (Hua, 1987:185)
Merodontina jianfenglingensis Hua, 1987:185.
捕 食 性。
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Microstylum albolimbatum Wulp 白緣微芒食蟲虻 (Hun., 1992:1126)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；印度。

Microstylum dux Wiedemann 微芒食蟲虻 (Chen, 1996, 18(1):21; Hun., 1992:1126; Shi, 1992:592; 1995: 494)
捕 食：幼蟲在土壤、腐木、枯枝落葉中捕食地下活動的昆蟲，成蟲襲擊飛翔中的其他昆蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南四川、浙江、江蘇、陝西、山東、河北；菲律賓、印尼。

Microstylum flavivantre Macqart 黃腹微芒食蟲虻 (Hun., 1992:1127; Shi, 1992:592; 1992:1082)
Microstylum flavivantre Macqart, 1849:
捕 食：幼蟲在土壤、腐木、枯枝落葉中捕食地下活動的昆蟲，成蟲襲擊飛翔中的其他昆蟲。
分 佈：福建、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、四川；越南、孟加拉、印度。

Microstylum sinensis Moore 中華食蟲虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)
捕 食：多種昆蟲。
分 佈：江西。

Microstylum spectrum Wiedemann 肖微芒食蟲虻 (Hun., 1992:1127)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、浙江。

Microstylum trimelas (Walker) 粉微芒食蟲虻 (Shi, 1995:494; 1997:1462)

Microstylum trimelas (Walker, 1851:)
捕 食 性。
分 佈：福建、廣東、四川、浙江；印度。

Microstylum sp. 小黑食蟲虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)
捕 食：多種昆蟲。
分 佈：江西。

Neoitamus cothurnatus (Meigen) 靴彎頂毛食蟲虻 (Shi, 1995:494)
Neoitamus cothurnatus (Meigen, 1820:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、浙江；歐洲。

Neoitamus cyaneocinetus Pandellè 灰彎頂毛食蟲虻 (Shi, 1992:590)
捕 食 性。
分 佈：貴州；蘇聯、歐洲。

Neoitamus cyanurus (Loewer) 藍彎頂毛食蟲虻 (Hun., 1992:1121; Shi, 1992:590; 1992:1079; 1995:493; 1997:1458)
Neoitamus cyanurus (Loewer, 1849:)
捕 食：幼蟲在土壤、腐木、枯枝落葉捕食地下活動的昆蟲，成蟲捕食飛翔中的昆蟲，蝗蟲、螽蟴、蛾蝶、蟬等。
分 佈：臺灣、湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西、內蒙古；歐洲。

Neoitamus dasymallus Gerstaecker 粗彎頂毛食蟲虻 (Shi, 1995:590)
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州；蘇聯、歐洲。

Neoitamus dolichurus Becker 長彎頂毛食蟲虻 (Shi, 1995:590)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、貴州。

Neoitamus fertilis Becker 費彎頂毛蟲虻 (Shi, 1997:1458)
Neoitamus fertilis Becker, 1925:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、四川、湖北。

Neoitamus rubrofemoratus Ricardo 紅腿彎頂毛食蟲虻 (Hun., 1992:1122; Shi, 1995:493; 1997: 1459)
Neoitamus rubrofemoratus Ricardo, 1919:
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、四川、浙江、湖北、河北。

Neoitamus socius Loewer 伴彎頂毛食蟲虻 (Shi, 1992:1079)
Neoitamus socius Loewer, 1871:

捕 食 性。
分 佈：雲南；歐洲。

Neoitamus splendidus Oldenberg 燦彎頂毛食蟲虻 (Hun., 1992:1121; Shi, 1992:590; 1992:1079; 1995:493; 1997:1459)
Neoitamus splendidus Oldenberg, 1912:
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、陝西；瑞士(阿爾卑斯)、意大利。

Neolaparus vocatus (Walker) 火紅瘤顏食蟲虻 (Hun. 1992:1127; Shi, 1997:1464)
Neolaparus vocatus (Walker, 1849:)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南、廣東、海南、湖北；印度、印尼。

Neomochtherus flavicornis Ruthe 黃角平胛食蟲虻 (Shi, 1992:590)
捕 食 性。
分 佈：湖南；日本、歐洲南部及中部。

Neomochtherus indianus (Ricardo) 印度平胛食蟲虻 (Shi, 1992:590)
捕 食 性。
分 佈：湖南；印度。

Neomochtherus sinensis (Ricardo) 中華平胛食蟲虻 (Shi, 1992:591)
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州；日本。

Neomochtherus trisignatus Ricardo 三斑平胛食蟲虻 (Shi, 1992:591)
捕 食 性。
分 佈：湖南；印度。

Nusa aqualis Walker 似長鬃食蟲虻 (Shi, 1992:593)
捕 食 性。
分 佈：湖南；印度。

Nusa grisea Hermann 灰長鬃食蟲虻 (Hun., 1992:1129)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南。

Ommatius chinensis Fabricius 中華羽芒食蟲虻 (Chen et al., 1993:128; He et al., 1991:115)
棲 息：棗樹、稻株。
捕 食：稻蟲(成蟲)。
分 佈：臺灣、湖南。

Ommatius conopsoides Wiedemann 棒腹羽角食蟲虻 (Hun., 1992:1123)

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、雲南、浙江；菲律賓、印尼、印度。

Ommatius frauenfeldi Schiner 弗拉羽角食蟲虻 (Shi, 1992:592)

捕 食 性。

分 佈：貴州；印度。

Ommatius fulvimanus Wulp 紅羽芒食蟲虻 (Shi,1992:1080)

Ommatius fulvimanus Wulp, 1872:

捕 食 性。

分 佈：臺灣、雲南；印尼。

Ommatius kambangensis Meijere 坎邦羽角食蟲虻 (Hun., 1992:1124; Shi, 1992:591; 1995:494; 1997:1460)

Ommatius kambangensis Meijere, 1914:

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：臺灣、湖南、貴州、四川、浙江、湖北；印尼。

Ommatius leucopogon Wledemann 白鬚羽角食蟲虻 (Shi, 1997:1460)

Ommatius leucopogon Wledemann, 1824:

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：臺灣、湖北；印度。

Ommatius major Becker 大羽角食蟲虻 (Hun., 1992:1124; Shi, 1992:591)

捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。

分 佈：臺灣、湖南、湖北。

Ommatius medius Becker 中羽角食蟲虻 (Hun., 1992:1124; Shi, 1992:591)

捕 食：幼蟲在土壤、腐木和枯枝落葉中捕食地下活動昆蟲，成蟲襲擊飛翔中的昆蟲。

分 佈：臺灣、湖南。

Ommatius nigripes (Becker) 黑羽角食蟲虻 (Shi, 1995:494; 1997:1460)

Ommatius nigripes (Becker, 1925:)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、海南、四川、浙江。

Ommatius pinguis Wulp 胖羽角食蟲虻 (Shi, 1992:591)

捕 食 性。

分 佈：貴州；印尼。

Ommatius similes Becker 似羽芒蟲虻 (Shi, 1992:1080)

Ommatius similes Becker, 1925:

捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南。

Ommatius suffusus Wulp 紡錘羽角食蟲虻 (Hun., 1992:1123)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南。

Philodius chinensis Schiner 中華基徑食蟲虻 (Shi, 1995:494)
Philodius chinensis Schiner, 1868:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、浙江；馬來西亞、泰國、緬甸、斯里蘭卡。

Philonicus albiceps Meigen 白頭齒肛食蟲虻 (ASZI, 1987, 2:625; He et al., 1991:115; Shi, 1992:1080)
Philonicus albiceps Meigen, 1820:
別 名：*白頭小食蟲虻*。
捕 食：螬
捲葉蛾
夜蛾
稻蟲(成蟲)。
分 佈：湖南、四川、山東、內蒙古；日本、西伯利亞。

Phirodicus chinensis Shiner 中華基叉食蟲虻 (Hun., 1992:1120)
捕 食：成蟲捕食飛翔中的昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南、華北；馬來西亞、泰國、緬甸。

Phirodocus univentris Walker 單腹基叉食蟲虻 (Hun., 1992:1120)
捕 食：成蟲捕食蚜蟲、蚧蟲。
分 佈：湖南；印度。

Pogonosoma funebris Hermann 墓地扁須食蟲虻 (Hun., 1992:1130)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南。

Pogonosoma maroccanum Fabricius 摩洛扁須食蟲虻 (Hun., 1992:1130)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；歐洲南部、非洲北部。

Pogonosoma unicolor Loewer 單色扁須食蟲虻 (Hun., 1992:1130)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；蘇聯。

Promachus albopilosus Macquart 白毛叉徑食蟲虻 (Hun., 1992:1119; Shi, 1992:591; 1992:1080; 1995:494)

Promachus albopilosus Macquart, 1855:
捕 食：幼蟲捕食蠐螬，成蟲捕食飛翔的其他昆蟲。
分 佈：福建、湖南、貴州、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、河北；蘇聯。

Promachus chinensis Ricardo 中華叉徑食蟲虻 (Shi, 1995:494)
Promachus chinensis Ricardo, 1920:
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Promachus indigenus (Becker) 印叉徑食蟲虻 (Shi, 1992:1080; 1995:494)
Promachus indigenus (Becker, 1925:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川、浙江；菲律賓、印度。

Promachus leucopareus Wulp 白額叉徑食蟲虻 (Shi, 1992:1080)
Promachus leucopareus Wulp, 1872:
捕 食 性。
分 佈：四川；菲律賓、印尼。

Promachus maculatus (Fabricius) 斑叉徑食蟲虻 (Hun., 1992:1119; Shi, 1992:591;1992:1081:1995:494)
Promachus maculatus (Fabricius, 1775:)
捕 食：幼蟲捕食蠐螬，成蟲捕食飛翔的其他昆蟲。
分 佈：湖南、雲南、四川、浙江、陝西；印度、阿富汗，東洋區。

Promachus nussus Oldroydveks 努叉徑食蟲虻 (Shi, 1992:591)
捕 食 性。
分 佈：貴州；菲律賓。

Promachus pallipenises Macquart 帕叉徑食蟲虻 (Shi, 1992:1081)
Promachus pallipenises Macquart, 1855:
捕 食 性。
分 佈：四川、華北、新疆。

Promachus ruepperli Loewer 魯氏叉徑食蟲虻 (Hun., 1992:1119)
捕 食：幼蟲捕食蠐螬，成蟲捕食飛翔的昆蟲。
分 佈：湖南；埃及、蘇丹。

Promachus tiblialis Walker 大食蟲虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)
捕 食：各種蜻蛉、葉蟬、雙翅目等昆蟲。
分 佈：江西。

Promachus yesonicus Bigot 黑盜虻 (ASZI, 1987, 2:626; He et al., 1991:115; Shi, 1992:591; Wei et al., 1990:132-137; Wei et al., 1990:183-184)

別 名：*大食蟲虻，林叉徑食蟲虻*。
棲 息：稻株、棗樹、林木
捕 食：茶翅蝽
夜蛾
稻蟲(成蟲)
Anomala antiqua (Gyllenhal) 銅黑麗金龜(蠐螬)
Anomala corpulenta Motschulsky 銅綠麗金龜(蠐螬)
Holotrichia parallela Motschulsky 暗黑鰓金龜(蠐螬)。
分 佈：臺灣、湖南、河南、陝西、山東；日本、蘇聯、法國。

Protophanes atticus Loewer 阿瘦角食蟲虻 (Shi, 1992:591)
捕 食 性。
分 佈：四川、湖北；德國。

Psilomyx humeralis Hsai 黃肩缺爪食蟲虻 (Hun., 1992:1119)
捕 食：幼蟲在土壤中捕食小型昆蟲，成蟲捕食蚜蟲、蚧蟲。
分 佈：湖南、浙江。

Saropogon melampygus Loewer 黑臀帚食蟲虻 (Hun., 1992:1128; Shi, 1992:592)
捕 食：幼蟲在土壤、腐木和枯枝落葉中捕食地下活動昆蟲，成蟲襲擊飛翔中的昆蟲。
分 佈：湖南、陝西；阿拉伯、埃及。

Satanas nigra Shi 黑魔食蟲虻 (Shi, 1990:279)
Satanas nigra Shi, 1990:279.
捕 食 性。
分 佈：陝西、新疆、內蒙古(西烏珠穆沁旗)。

Scylallticus degener Shin 變異并角食蟲虻 (Hun.:1128)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：臺灣、湖南、香港。

Stenopogon coracinus-carbonarius Hermann 灰窄頜食蟲虻 (Shi, 1996:178)
Stenopogon coracinus-carbonarius Hermann, 1929:24.
捕 食 性。
分 佈：新疆；烏茲別斯坦。

Stenopogon damias (Walker) 紅窄微芒食蟲虻 (Shi, 1992:1082)
Stenopogon damias (Walker, 1849:)
捕 食 性。
分 佈：四川；印度。

Stenopogon kaltenbachi Engel 卡氏窄頜食蟲虻 (Shi, 1992:1082)

Stenopogon kaltenbachi Engel, 1929:
捕 食 性。
分 佈：四川、陝西、北京；亞洲中部。

Stenopogon nigriventris Loewer 黑腹窄頜食蟲虻 (Shi, 1996:178)
Stenopogon nigriventris Loewer, 1868:373.
捕 食 性。
分 佈：新疆、內蒙古；土耳其、歐洲。

Stichpogon elegantulus (Wiedemann) 華麗條紋食蟲虻 (Shi, 1996:178)
Stichpogon elegantulus (Wiedemann, 1820:270)
=*aequecinctus* Costa, 1844:62.
=*tener* Loewer, 1847:503.
=*frauenfeldi* Egger, 1855:5.
=*riparius* Loewer, 1871:93.
捕 食 性。
分 佈：新疆；土耳其、以色列、摩洛哥、阿爾及利亞、歐洲。

Trichomachimus angustus Shi 狹三叉食蟲虻 (Shi, 1992:462)
Trichomachimus angustus Shi, 1992:462-463.
捕 食 性。
分 佈：雲南(中甸)。

Trichomachimus basalis Oldroyd 泛三叉食蟲虻 (Shi, 1992:1083)
Trichomachimus basalis Oldroyd, 1964:
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Trichomachimus conjugus Shi 聯三叉食蟲虻 (Shi, 1992:1086)
Trichomachimus conjugus Shi, 1992:1086-1087.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Trichomachimus dontus Shi 齒三叉食蟲虻 (Shi, 1992:1084
Trichomachimus dontus Shi, 1992:1084.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Trichomachimus elongatus Shi 長三叉食蟲虻 (Shi, 1992:459)
Trichomachimus elongatus Shi, 1992:459-461.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏。

Trichomachimus engus Shi 狹三叉食蟲虻 (Shi, 1992:1083)
Trichomachimus engus Shi

捕 食 性。
分 佈：雲南。

Trichomachimus grandis Shi 大三叉食蟲虻 (Shi, 1992:464; 1992:1084)
Trichomachimus grandis Shi, 1992:464.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Trichomachimus lobus Shi 突葉三叉食蟲虻 (Shi, 1992:1085)
Trichomachimus lobus Shi, 1992:1085-1086.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Trichomachimus maculatus Shi 粉斑三叉食蟲虻 (Shi, 1992:467)
Trichomachimus maculatus Shi, 1992:467-468.
捕 食 性。
分 佈：西藏(森芝、米林)。

Trichomachimus marginis Shi 緣毛三叉食蟲虻 (Shi, 1992:468)
Trichomachimus marginis Shi, 1992:468-469.
捕 食 性。
分 佈：西藏(吉隆、仲巴)。

Trichomachimus nigricornis Shi 黑角三叉食蟲虻 (Shi, 1992:464; 1992:1084)
Trichomachimus nigricornis Shi, 1992:464-465.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Trichomachimus nigritarsus Shi 黑跗三叉食蟲虻 (Shi, 1992:465)
Trichomachimus nigritarsus Shi, 1992:465-466.
捕 食 性。
分 佈：西藏(芝林)、雲南(巧家縣)。

Trichomachimus nigrus Shi 黑三叉食蟲虻 (Shi, 1992:1085)
Trichomachimus nigrus Shi, 1992:1085.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Trichomachimus obliquus Shi 斜三叉食蟲虻 (Shi, 1992:463; 1992:1083)
Trichomachimus obliquüs Shi, 1992:463-464.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川。

Trichomachimus rufus Shi 紅三叉食蟲虻 (Shi, 1992:466; 1992:1084)

Trichomachimus rufus Shi, 1992:466-467.
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川。

Trichomachimus tenuis Shi 細三叉食蟲虻 (Shi, 1992:461)
Trichomachimus tenuis Shi, 1992:361.
捕 食 性。
分 佈：西藏(波密易貢)。

Trichomachimus tubus Shi 管三叉食蟲虻 (Shi, 1992:461)
Trichomachimus tubus Shi, 1992:461-462.
捕 食 性。
分 佈：西藏、四川。

Trypanoides testaceipes Macquart 介殼鑽食蟲虻 (ASZI, 1987, 2:626)
捕 食：其他昆蟲。
分 佈：臺灣、福建；日本、印尼。

Xenomyza artigasi Joseph et Parui 阿籽角食蟲虻 (Hun., 1992:1126)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；印度。

Xenomyza carapacina Oldroyd 盾籽角食蟲虻 (Shi, 1992:592; 1992:1082)
Xenomyza carapacina Oldroyd, 1972:
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川；菲律賓。

Xenomyza planiceps (Fabricius) 平籽角食蟲虻 (Hun., 1992:1125)
捕 食：幼蟲和成蟲捕食其他昆蟲。
分 佈：湖南；印度。

Xenomyza speculiventris (Meijere) 斑腹籽角食蟲虻 (Hun., 1992:1126)
捕 食：幼蟲在土壤、腐爛木材、沽枝落葉中捕食其他昆蟲，成蟲襲擊飛翔中的昆蟲。
分 佈：湖南；印尼、印度。

Dolichopodidae 長足虻科

Dolichopus simulator Parent 長足虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)
捕 食：小蟲或小動物。
分 佈：江西。

Tachytrechus simplex Parent 捷長足虻 (Zhang, 1987[ed.] 2:67)
捕 食：小蟲或小動物。

分 佈：江西。

Empididae 舞虻科

Chelifera lateralis Yang et Yang 淡側裸螳舞虻 (Yang et Yang, 1995:504)

Chelifera lateralis Yang et Yang, 1995:504.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Chelifera sinensis Yang et Yang 中華裸螳舞虻 (Yang et Yang, 1995:504)

Chelifera sinensis Yang et Yang, 1995:504-505.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Chelipoda arcta Yang et Yang 北方鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:487)

Chelipoda arcta Yang et Yang, 1990:487.

捕 食 性。

分 佈：河北(平泉光頭山)。

Chelipoda basalis Yang et Yang 基鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:486)

Chelipoda basalis Yang et Yang, 1990:486.

捕 食 性。

分 佈：甘肅。

Chelipoda gansuensis Yang et Yang 甘肅鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:485)

Chelipoda gansuensis Yang et Yang, 1990:485-486.

捕 食 性。

分 佈：甘肅(康縣)。

Chelipoda guangxiensis Yang et Yang 廣西鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1986:76)

Chelipoda guangxiensis Yang et Yang, 1986:76-77.

捕 食 性。

分 佈：廣西(田林)。

Chelipoda hubeiensis Yang et Yang 湖北鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:483)

Chelipoda hubeiensis Yang et Yang, 1990:483-484.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Chelipoda lyneborgi Yang et Yang 林氏鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:484)

Chelipoda lyneborgi Yang et Yang, 1990:484-485.

捕 食 性。

分 佈：湖北(神農架大岩屋)。

Chelipoda shennongana Yang et Yang 神農鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:484)

Chelipoda shennongana Yang et Yang, 1990:484-485.

捕 食 性。

分 佈：湖北(神農架大岩屋)。

Chelipoda sichuanensis Yang et Yang 四川鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1992:1094)

Chelipoda sichuanensis Yang et Yang, 1992:1094-1095.

捕 食 性。

分 佈：四川。

Chelipoda wudangensis Yang et Yang 武當鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:485)

Chelipoda wudangensis Yang et Yang, 1990:485.

捕 食 性。

分 佈：湖北(武當山金頂)。

Chelipoda xanthocephala Yang et Yang 黃頭鬃螳舞虻 (Yang et Yang, 1990:486)

Chelipoda xanthocephala Yang et Yang, 1990:486.

捕 食 性。

分 佈：湖北(神農架大岩屋)。

Elaphropeza guiensis (Yang et Yang) 貴黃隱肩舞虻 (Yang et Yang, 1997:1471)

Elaphropeza guiensis (Yang et Yang, 1898:)

捕 食 性。

分 佈：貴州、四川。

Elaphropeza longiconica (Yang et Yang) 長錐黃隱肩舞虻 (Yang et Yang, 1992:1094)

Drapetis (*Elaphropeza*) *longiconica* Yang et Yang, 1992:1094.

Elaphropeza longiconica (Yang et Yang); 2001:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Elaphropeza striata (Yang et Yang) 條斑黃隱肩舞虻 (Yang et Yang, 1992:1093)

Drapetis (*Elaphropeza*) *striata* Yang et Yang, 1992:1093.

Elaphropeza striata Yang et Yang; 2001:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Elaphropeza triangulata (Yang et Yang) 角斑黃隱肩舞虻 (Yang et Yang, 1992:1092)

Drapetis (*Elaphropeza*) *triangulata* Yang et Yang, 1992:1092-1093.

Elaphropeza triangulata (Yang et Yang); 2001:

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Elaphropeza yunnanensis (Yang et Yang) 雲南黃隱肩舞虻 (Yang et Yang, 1992:1093)

Drapetis (*Elaphropeza*) *yunnanensis* Yang et Yang, 1992:1093-1094.
Elaphropeza yunnanensis (Yang et Yang); 2001:
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Empis (s. str.) **hubeiensis** Yang et Yang 湖北舞虻 (Yang et Yang, 1997:1474)
Empis (s. str.) *hubeiensis* Yang et Yang, 1997:1474.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Hemerodromia beijingensis Yang et Yang 北京螳舞虻 (Yang et Yang, 1988:282)
Hemerodromia beijingensis Yang et Yang, 1988:282-283.
捕 食 性。
分 佈：北京(香山)。

Hemerodromia concava Yang et Yang 凹緣螳舞虻 (Yang et Yang, 1988:283)
Hemerodromia concava Yang et Yang, 1988:283-284.
捕 食 性。
分 佈：雲南。

Hemerodromia elongata Yang et Yang 條背螳舞虻 (Yang et Yang, 1995:505)
Hemerodromia elongata Yang et Yang, 1995:505.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Hemerodromia euneura Yang et Yang 優脈螳舞虻 (Yang et Yang, 1991:234)
Hemerodromia euneura Yang et Yang, 1991:234.
捕 食 性。
分 佈：北京。

Hemerodromia flaviventris Yang et Yang 黃腹螳舞虻 (Yang et Yang, 1991:236)
Hemerodromia flaviventris Yang et Yang, 1991:236.
捕 食 性。
分 佈：廣西(金秀大瑤山)。

Hemerodromia fujianensis Yang et Yang 福建螳舞虻 (Yang et Yang, 1986:76)
Hemerodromia fujianensis Yang et Yang, 1986:76.
捕 食 性。
分 佈：福建(沙縣)。

Hemerodromia fusca Yang et Yang 褐色螳舞虻 (Yang et Yang, 1986:75)
Hemerodromia fusca Yang et Yang, 1986:75-76.
捕 食 性。
分 佈：福建(建陽)。

Hemerodromia guangxiensis Yang et Yang 廣西螳舞虻 (Yang et Yang, 1991:235)

Hemerodromia guangxiensis Yang et Yang, 1991:235.

捕 食 性。

分 佈：廣西(金秀)。

Hemerodromia menghaiensis Yang et Yang 勐海螳舞虻 (Yang et Yang, 1988:284)

Hemerodromia menghaiensis Yang et Yang, 1988:284-285.

捕 食 性。

分 佈：雲南(勐海)。

Hemerodromia nigrescens Yang et Yang 褐芒螳舞虻 (Yang et Yang, 1995:505

Hemerodromia nigrescens Yang et Yang, 1995:505.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Hemerodromia puerensis Yang et Yang 普洱螳舞虻 (Yang et Yang, 1988:284)

Hemerodromia puerensis Yang et Yang, 1988:284.

捕 食 性。

分 佈：雲南(普洱)。

Hemerodromia striata Yang et Yang 中紋螳舞虻 (Yang et Yang, 1988:281)

Hemerodromia striata Yang et Yang, 1988:281-282.

捕 食 性。

分 佈：北京(門頭溝)。

Hemerodromia xanthocephala Yang et Yang 黃頭螳舞虻 (Yang et Yang, 1991:234)

Hemerodromia xanthocephala Yang et Yang, 1991:234.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Hemerodromia xizangensis Yang et Yang 西藏螳舞虻 (Yang et Yang, 1991:235)

Hemerodromia xizangensis Yang et Yang, 1991:235.

捕 食 性。

分 佈：西藏(波密)。

Hemerodromia yunnanensis Yang et Yang 雲南螳舞虻 (Yang et Yang, 1988:283)

Hemerodromia yunnanensis Yang et Yang, 1988:283.

捕 食 性。

分 佈：雲南。

Hilara dentate Yang et Yang 齒突喜舞虻 (Yang et Yang, 1997:1472)

Hilara dentate Yang et Yang, 1997:1472-1473.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Hilara hubeiensis Yang et Yang 湖北喜舞虻 (Yang et Yang, 1997:1473)

Hilara hubeiensis Yang et Yang, 1997:1473.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Hilara (Platyhilara) pallala Yang et Yang 淡翅寬喜舞虻 (Yang et Yang, 1995:506)

Hilara (*Platyhilara*) *pallala* Yang et Yang, 1995:506.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Hilara triangulata Yang et Yang 角突喜舞虻 (Yang et Yang, 1997:1471)

Hilara triangulata Yang et Yang, 1997:1471-1472.

捕 食 性。

分 佈：湖北。

Hilarigona unmaculata Yang et Yang 無斑短脛喜舞虻 (Yang et Yang, 1995:505)

Hilarigona unmaculata Yang et Yang, 1995:505-506.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Hybos alamaculatus Yang et Yang 斑翅駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:502)

Hybos alamaculatus Yang et Yang, 1995:502.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Hybos ancistroides Yang et Yang 鈎突駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:80)

Hybos ancistroides Yang et Yang, 1986:80-81.

捕 食 性。

分 佈：廣西(金秀)。

Hybos apicifrons Yang et Yang 端黃駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:499)

Hybos apicifrons Yang et Yang, 1995:499-500.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Hybos apicihamatus Yang et Yang 端鈎駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:500)

Hybos apicihamatus Yang et Yang, 1995:500-501.

捕 食 性。

分 佈：浙江。

Hybos basiflavus Yang et Yang 基黃駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:77)

Hybos basiflavus Yang et Yang, 1986:77-78.

捕 食 性。
分 佈：廣西(金秀)。

Hybos brevis Yang et Yang 短板駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:500)
Hybos brevis Yang et Yang, 1995:500.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Hybos dorsalis Yang et Yang 背鬃駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:502)
Hybos dorsalis Yang et Yang, 1995:502-503.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Hybos ensatus Yang et Yang 劍突駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:83)
Hybos ensatus Yang et Yang, 1986:83-84.
捕 食 性。
分 佈：廣西(龍勝)。

Hybos flaviscutellum Yang et Yang 黃盾駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:81)
Hybos flaviscutellum Yang et Yang, 1986:81-82.
捕 食 性。
分 佈：廣西(龍勝)。

Hybos griseus Yang et Yang 灰翅駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:501)
捕 食 性。
分 佈：浙江、湖北。

Hybos guangxiensis Yang et Yang 廣西駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:85)
Hybos guangxiensis Yang et Yang, 1986:85.
捕 食 性。
分 佈：廣西(金秀)。

Hybos jinxieunsis Yang et Yang 金秀駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:77)
Hybos jinxieunsis Yang et Yang, 1986:77.
捕 食 性。
分 佈：廣西(金秀)。

Hybos longshengensis Yang et Yang 龍勝駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:78)
Hybos longshengensis Yang et Yang, 1986:78-79.
捕 食 性。
分 佈：廣西(龍勝)。

Hybos minutus Yang et Yang 細腿駝舞虻 (Yang et Yang, 1997:1474)
Hybos minutus Yang et Yang, 1997:1474-1475.

捕 食 性。
分 佈：湖北。

Hybos nasutus Yang et Yang 鼻突駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:79)
Hybos nasutus Yang et Yang, 1986:79-80.
捕 食 性。
分 佈：廣西(金秀)。

Hybos orientalis Yang et Yang 東方駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:82)
Hybos orientalis Yang et Yang, 1986:82-83.
捕 食 性。
分 佈：廣西(龍勝)。

Hybos serratus Yang et Yang 齒突駝舞虻 (Yang et Yang, 1992:1089)
Hybos serratus Yang et Yang, 1992:1089-1090.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Hybos sichuanensis Yang et Yang 四川駝舞虻 (Yang et Yang, 1992:1090)
Hybos sichuanensis Yang et Yang, 1992:1090.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Hybos similaris Yang et Yang 近截駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:503)
Hybos similaris Yang et Yang, 1995:503.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Hybos truncatus Yang et Yang 截形駝舞虻 (Yang et Yang, 1986:80)
Hybos truncatus Yang et Yang, 1986:80.
捕 食 性。
分 佈：廣西(龍勝)。

Hybos wui Yang et Yang 吳氏駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:501)
Hybos wui Yang et Yang, 1995:5011-502.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Parahybos concolorus Yang et Yang 全色准駝舞虻 (Yang et Yang, 1992:1091)
Parahybos concolorus Yang et Yang, 1992:1091.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Parahybos sinensis Yang et Yang 中華准駝舞虻 (Yang et Yang, 1992:1091)

Parahybos sinensis Yang et Yang, 1992:1091.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Parahybos zhejiangensis Yang et Yang 浙江准駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:504)
Parhybos zhejiangensis Yang et Yang, 1995:504.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Platypalpus guangxiensis Yang et Yang 廣西平鬚舞虻 (Yang et Yang, 1997:1470)
Platypalpus guangxiensis Yang et Yang
捕 食 性。
分 佈：廣西、四川、湖北。

Platypalpus hubeiensis Yang et Yang 湖北平鬚舞虻 (Yang et Yang, 1997:1469)
Platypalpus hubeiensis Yang et Yang, 1997:1469-1470.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Platypalpus sichuanensis Yang et Yang 四川平鬚舞虻 (Yang et Yang, 1992:1091)
Platypalpus sichuanensis Yang et Yang, 1992:1091-1092.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Syndyas sinensis Yang et Yang 中華隱脈駝舞虻 (Yang et Yang, 1995:503)
Syndyas sinensis Yang et Yang, 1995:503-504.
捕 食 性。
分 佈：浙江。

Tachypeza nigra Yang et Yang 黑腿顯肩舞虻 (Yang et Yang, 1997:1470)
Tachypeza nigra Yang et Yang, 1997:1470-1471.
捕 食 性。
分 佈：湖北。

Phoridae 蚤蠅科

Aphiochoeta parasitica Shiraki (He et al., 1991:116)
捕 食：*Scirpophaga incertulas* (Walker) 三化螟。
分 佈：臺灣。

Chaetopleurophora asiatica Borgmeler 亞洲毛蚤蠅 (Liu, 1996, 1:63)
Chaetopleurophora asiatica Borgmeler, 1962:453.
寄 主：(蝸牛體內)。
分 佈：臺灣。

Conicera dauci (Meigen) 道錐蚤蠅 (Liu, 1996, 1:64)

Phora dauci Meigen, 1830:223.

Phora nickerli Kowarz, 1894:

寄 主：

分 佈：陝西、遼寧、黑龍江；俄羅斯、歐洲、美國。

Conicera formosennsis Brues 臺灣錐蚤蠅 (Liu, 1996, 1:64)

Conicera formosennsis Brues, 1911:539.

寄 主：可能爲寄生性。

分 佈：臺灣、廣西；日本。

Megaselia (Aphiochaeta) spiracularis Schmitz 東亞異蚤蠅 (Liu, 1996, 1:76)

Megaselia (*Aphiochaeta*) *spiracularis* Schmitz, 1938:81.

寄 主：蝸牛。

分 佈：臺灣、廣東、陝西、北京、遼寧；日本、馬來西亞。

Megaselia sp. 蚤蠅 (He et al., 1991:116)

寄 主：*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) 稻縱卷葉螟(幼蟲、蛹)
Scirpophaga incertulas (Walker) 三化螟(幼蟲、蛹)
Sesamia inferens (Walker) 大螟(幼蟲、蛹)
Leucania separata (Walker) 粘蟲(幼蟲、蛹)
Parnara guttata guttata (Bremer et Grey) 稻苞蟲(幼蟲、蛹)。

分 佈：湖南、廣東、四川、浙江。

Megaselia sp. 蚤蠅 (He et al., 1988:22)

寄 主：*Dendrolimus tatulaeformis* Tsai et Liu 油松毛蟲(幼蟲、蛹)。

分 佈：北京。

Phalacrotophora flaviclava (Brues) 黃爪伐蚤蠅 (Liiu, 1996, 1:83)

Aphiochaeta flaviclava Brues, 1911:547.

寄 主：節肢動物。

分 佈：臺灣。

Phalacrotophora jacobsoni Brues 雅氏伐蚤蠅 (Liu, 1996, 1:82)

Phalacrotophora jacobsoni Brues, 1915:190.

寄 主：節肢動物。

分 佈：雲南；印尼(爪哇)。

Phalacrotophora puctifrons Brues 點額伐蚤蠅 (Liu, 1996, 1:83)

Phalacrotophora puctifrons Brues, 1924:207.

Phalacrotophora perpuctata Schmitz, 1951:

寄 主：節肢動物。

分 佈：臺灣、廣東。

Phalacrotophora quadrimaculata Schmitz 四斑伐蚤蠅 (Liu, 1996, 1:83)

Phalacrotophora quadrimaculata Schmitz, 1926:49.
寄 主：節肢動物。
分 佈：臺灣、廣東；印尼、新喀里多尼亞。

Puliciphora fungicola Yang et Wang 磨菇虼蚤蠅 (Yang et Wang, 1993;323)

Puliciphora fungicola Yang et Wang, 1993:323-324.
寄 主：
分 佈：貴州。

Puliciphora qianana Yang et Wang 黔虼蚤蠅 (Yang et Wang, 1993;323)

Puliciphora qianana Yang et Wang, 1993:324-325.
寄 主：
分 佈：貴州。

蚤蠅 (Feng et al., 1994, 10(3):142)

寄 主：*Oxya chinensis* 中華稻蝗(卵)。
分 佈：山西。

Conopidae 眼蠅科

Archiconops erythrocephala (Fabricius) 淡紅阿其眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:599)

Conops erythrocephala Fabricius, 1794:392.
Conops niponensis Vollenhoven, 1863:
Conops nigricans Matsumura, 1915:
寄 主：
分 佈：江蘇、山東、北京；緬甸、中南半島、印度、斯里蘭卡、印尼、非洲區。

Conops (Asicorops) annulosus tienmushanensis Ouchi 天目山安眼蠅 (ASZI, 1987, 2:643; Chao et Qiao, 1996, 1:600)

Conops annulosus tienmushanensis Ouchi, 1939:194.
別 名：*橫帶眼蠅*。
寄 主：
分 佈：浙江；印度。

Conops aureiventris Chen 金翼眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)

Conops aureiventris Chen, 1939:172.
寄 主：
分 佈：寧夏。

Conops (Asiconops) auremaculatus Kröber 金斑眼蠅 (ASZI, 1987, 2:641; Chao et Qiao, 1996, 1:601; Hun., 1992: 1134)

Conops auremaculatus Kröber, 1933:16.
Conops pieli Segur, 1935:
Conops japonicus Kröber, 1939:
別 名：*黃斑眼蠅，金斑亞洲眼蠅*。
寄 主：
分 佈：湖南、浙江、江蘇、安徽、山東、山西；日本、蘇聯，古北區。

Conops (Asiconops) chochensis Ouchi 苕溪眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)
Conops chochensis Ouchi, 1939:192.
寄 主：
分 佈：浙江、中國南部。

Conops erythrocephala Fabricius 紅頭眼蠅 (ASZI, 1987, 2:642)
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇、山東；印度、己布亞新幾內亞。

Conops (Asiconops) flavifrons Meigen 黃額眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)
Conops flavifrons Meigen, 1824:125.
Physsocephala pugiomiformis Becker, 1913:
Conops minor Becker, 1922:
Conops kroeberi Paramonov, 1927:
Conops immaculate Paramonov, 1927:
寄 主：
分 佈：中國南部；土耳其、伊朗、敘利亞、非洲北部。

Conops flavipes Linnaeus 黃帶眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)
Conops flavipes Linnaeus, 1758:604.
Conops trifasciata Geer, 1776:
Conops melanocephala Meigen, 1804:
Conops bicincta Meigen, 1830:
Conops aterrima Coucke, 1896:
Conops jozankeanus Matsumur, 1916:
Conops hungaricus Szelady, 1926:
Conops nigrita Cepelak, 1940:
寄 主：
分 佈：北京、遼寧；古北區、非洲區。

Conops (Asiconops) hwangi Chen 黃氏亞洲眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601; Hun., 1992:1134; Qiao et Zhao, 1992:608)
Conops hwangi Chen, 1939:175.
寄 主：
分 佈：湖南、浙江、江蘇。

Conops (Asiconops) kulinicus Chen 牯嶺眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)
Conops kulinicus Chen, 1939:180.
寄 主：

分 佈：江西。

Conops licenti Chen 麗森眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)

Conops licenti Chen, 1939:174.

寄 主：

分 佈：山西。

Conops maculifrons Kröber 斑額眼蠅 (ASZI, 1987, 2:642; Chao et Qiao, 1996, 1:601)

Conops maculifrons Kröber, 1916:41.

寄 主：

分 佈：內蒙古、吉林、黑龍江；蘇聯。

Conops (Asiconops) rubricornis Chen 紅角眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)

Conops (*Asiconops*) *rubricornis* Chen, 1939:176.

寄 主：

分 佈：浙江、江蘇。

Caonops (Asiconops) rifofrons Doleschall 紅額眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:601)

Caonops rifofrons Doleschall, 1857:412.

寄 主：

分 佈：浙江、江蘇。

Conops (Asiconops) tristis Chen 暗色眼蠅 (ASZI, 1987, 2:643; Chao et Qiao, 1996, 1:602)

Conops (*Asiconops*) *tristis* Chen, 1939:180.

寄 主：

分 佈：安徽。

Conops vesicularis Linnaeus 偽胡蜂眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:602)

Conops vesicularis Linnaeus, 1761:486.

寄 主：*Bombus muscorum* 蘚狀熊蜂。

分 佈：東北；日本、北非。

Dalmannia affinis Chen 鄰近達爾眼蠅 (ASZI, 1987, 2:646; Qiao et Chao, 1996, 1:613)

Dalmannia affinis Chen, 1939:228.

寄 主：

分 佈：江蘇、山東；俄羅斯(西伯利亞東部、濱海南部)。

Dalmannia signata Chen 華麗達爾眼蠅 (ASZI, 1987, 2:646; Qiao et Chao, 1996, 1:613)

Dalmannia signata Chen, 1939:230.

寄 主：

分 佈：江蘇；日本、俄羅斯(西伯利亞東部、濱海南部)。

Leopoldius shansiensis (Chen) 山西火眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:602)

Brachyglossum shansiensis Chen, 1939:194.

寄 主：
分 佈：山西、北京。

Macroconops helleri Kröber 環巨眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:603)
Macroconops helleri Kröber, 1927:126.
寄 主：
分 佈：四川、江蘇。

Melanosoma carbonaria Kröber 煤黑衣眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:613)
Melanosoma carbonaria Kröber, 1914:86.
寄 主：
分 佈：新疆；俄羅斯(吉爾吉斯斯坦)。

Myopa buccata (Linnaeus) 頰虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Conops buccata Linnaeus, 1758:605.
Conops buccae Harris, 1858:
Myopella marginalis Robineau-Desvoidy, 1853:
Myopella puctigera Robineau-Desvoidy, 1853:
Myopella punctipes Ribineau-Desvoidy, 1758:
寄 主：
分 佈：四川、浙江、山東；蘇聯、歐洲，古北區。

Myopa chusanensis Ouch 楚山虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Myopa chusanensis Ouch, 1939:205.
寄 主：
分 佈：浙江。

Myopa dorsalis Fabricius 裸板虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Myopa dorsalis Fabricius, 1794:397.
寄 主：
分 佈：東北；朝鮮、蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦西部、土庫曼斯坦、歐洲部分向北達聖彼得堡、歐洲大部分地區、北非、伊朗、土耳其、印度。

Myopa faciata Meigen 裸臉虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Myopa faciata Meigen, 1804:286.
Conops fuscus Harris, 1776:
Myopa ephippium Fabricius, 1805:
Myopa curtirostris Kröber, 1916:
Myopa fusenensis Ouchi, 1939:
寄 主：
分 佈：黑龍江；朝鮮、日本、蒙古、俄羅斯(濱海北疆、西伯利亞、阿爾泰、哈薩克斯坦北部、聖彼得堡)、歐洲。

Myopa fasciata Meigen 短喙虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Myopa fasciata Meigen, 1804:286.

Myopa curtirostris Kröber, 1916:
Myopa chalantungensis Ouchi, 1939:
寄 主：
分 佈：中國北部；蘇聯、歐洲。

Myopa picta Panzer 綉虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Myopa picta Panzer, 1798:22.
Myopa varia Wiedemann, 1830:
Myopa meridionalis Macquart, 1835:
Myopa chusanensis Ouchi, 1939:
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇；印度、阿富汗、伊朗、外高加索、中亞、俄羅斯(歐洲部分)、歐洲南部及北部。

Myopa polystigma Rondani 麻翅虻眼蠅 (ASZI, 1987, 2:644; Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Myopa polystigma Rondani, 1857:247.
別 名：*毛虻眼蠅*。
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇；符拉迪沃斯托克(海參威)、阿穆爾、高加索、俄羅斯歐洲部分、歐洲西部。

Myopa sinensis Chen 中華虻眼蠅 (ASZI, 1987, 2:644; Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Myopa sinensis Chen, 1939:215.
別 名：*唐虻眼蠅*。
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇、上海、山西；俄羅斯(遠東)。

Myopa testacea (Linnaeus) 磚虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:615)
Conops testacea Linnaeus, 1767:1006.
Myopa longirostris Robineau-Desvoidy, 1830:
Myopa pictipennis Robineau-Desvoidy, 1830:
Myopa pellucida Robineau-Desvoidy, 1830:
Myopa umbripennis Robineau-Desvoidy, 1830:
Myopa japonica Kröber, 1916:
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇；朝鮮、日本、歐洲、印度。

Myopa variegata Kröber 網腹虻眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:616)
Myopa variegata Kröber, 1804:286.
寄 主：
分 佈：甘肅；蒙古、濱海、西伯利亞、中亞、高加索、聖彼得堡、俄羅斯歐洲部分、小亞細亞、土耳其、西歐部和南部。

Neobrachyceraea obscuripennis (Kröber) 墨尼奧眼蠅 (ASZI, 1987, 2:644; Chao et Qiao, 1996, 1:603; Hun., 1992:1135; Qiao et Zhao, 1992:608)

Brachyceraea obscuripennis Kröber, 1913:177.
Brachyceraea migriba Kröber, 1937:
Neobrachyceraea huangahangensis Ouchi, 1939:
別 名：*黑刺尼奥眼蠅，黑尾短角眼蠅，墨紐眼蠅*。
寄 主：
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、浙江、江蘇；東南亞、俄羅斯(南部沿海)。

Occemyia abdominalis Chen 短吻歐眼蠅 (ASZI, 1987, 2:645)
寄 主：
分 佈：浙江、內蒙古。

Occemyia sundewalli Zetterstedt 長吻歐眼蠅 (ASZI, 1987, 2:645)
寄 主：
分 佈：江蘇、山西、遼寧；蘇聯、歐洲、北非。

Physocephala aterrima Kröber 縫叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:605)
Physocephala aterrima Kröber, 1923:122.
寄 主：
分 佈：浙江；印度。

Physocephala calopa (Bigot) 熱帶叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:605)
Conops calopa Bigot, 1887:33.
Conops quadrat Brunetti, 1913:
寄 主：
分 佈：浙江；印度、巴基斯坦。

Physocephala chalantungensis Ouchi 查蘭叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:605)
Physocephala chalantungensis Ouchi, 1939:202.
寄 主：
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮。

Physocephala chrysorrhoea (Meigen) 金腹叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:605)
Conops chrysorrhoea Meigen, 1824:128.
Conops pallasii Meigen, 1824:
Conops serpylleti Zeller, 1842:
Physocephala zarudnyi Becker, 1913:
Physocephala maculigera Kröber, 1915:
Physocephala pseudomaculigera Kröber, 1915:
寄 主：*Philanthus triangulum* 二角泥蜂。
分 佈：遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、伊朗、敘利亞、歐洲、非洲北部、摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯。

Physocephala limbipennis De Meijere 緣叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:606)
Physocephala limbipennis De Meijere, 1910:165.
Physocephala annulata Kröber, 1914:

寄 主：
分 佈：臺灣；菲律賓、馬來西亞、印度、印尼。

Physocephala nigra (De Geer) 黑叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:606)
Conops nigra De Geer, 1776:265.
Conops macrocephala Fabricius, 1781:
寄 主：*Bombus muscorum* 蘚狀熊蜂。
分 佈：中國北部；蒙古、歐洲、北非。

Physocephala obscura Kröber 暗叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:606)
Physocephala obscura Kröber, 1915:53.
寄 主：
分 佈：福建、浙江、江蘇、山西；俄羅斯(海參威、阿穆爾)。

Physocephala persica Becker 桃叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:606)
Physocephala persica Becker, 1913:609.
寄 主：
分 佈：河北；歐洲。

Physocephala pielina Chen 姹叉芒眼蠅 (ASZI, 1987, 2:643; Chao et Qiao, 1996, 1:606; Hun., 1992:1133; Qiao et Zhao, 1992:608)
Physocephala pielina Chen, 1939:190.
別 名：*皮腫頭眼蠅*。
寄 主：
分 佈：福建、江西、湖南、海南、浙江、江蘇、山西、河北。

Physocephala pusilla (Meigen) 裸臉叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:606; Hun., 1992:1134; Qiao et Zhao, 1992:608)
Conops pusilla Meigen, 1824:131.
Conops pumila Macquart, 1835:
Conops tener Loew, 1874:
Physocephala persica Becker, 1913:
Physocephala punctithorax Becker, 1913:
別 名：*黴叉芒眼蠅*。
寄 主：*Ceratina callosa* Fabricius 蘆蜂
Ceratina cyanea K. 蘆蜂
Anthidium septempunctatum Linnaeus 黃斑蜂。
分 佈：湖南、山西、河北；歐洲西南部、高加索、哈薩克斯坦、中亞、西伯利亞、小亞細亞、阿富汗、斯里蘭卡、土耳其、伊朗、北非。

Physocephala reducta Chen 紅面叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:606)
Physocephala reducta Chen, 1939:185.
寄 主：
分 佈：河北。

Physocephala rufipes (Fabricius) 紅帶叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:606)

Conops rufipes Fabricius, 1781:466.
Conops petiolata Donovan, 1808:
Conops meridionalis Macquart, 1835:
Physocephala jezoensis Matsumura, 1916:
寄 主：*Bombus terrestris* 陸熊蜂
Bombus lapidaries 石熊蜂
Bombus hortorum 長額熊蜂
Bombus agrorum 田園熊蜂。
分 佈：新疆(阿勒泰)；蒙古、土耳其、歐洲。

Physocephala simplex Kröber 簡叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:608)

Physocephala simplex Kröber, 1939:186.
寄 主：
分 佈：山西。

Physocephala sinensis Kröber 中華腫頭眼蠅 (ASZI, 1987, 2:643; Chao et Qiao, 1996, 1:608)

Physocephala sinensis Kröber, 1933:15.
別 名：*唐叉芒眼蠅*。
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇、安徽、山東、北京。

Physocephala vittata (Fabricius) 條紋叉芒眼蠅 (Chao et Qiao, 1996, 1:608)

Conops vittata Fabricius, 1794:392.
Conops dorsalis Wiedemann *in* Meigen, 1824:
Conops solaeformis Gimmerthal, 1842:
Conops semiatrata Costa, 1844:
Conops fraterna Loew, 1847:
Physocephala detecta Becker, 1915:
Physocephala abdominalis Kröber, 1915:
Physocephala semirufa Kröber, 1915:
Physocephala immaculate Kröber, 1939:
寄 主：*Bombus lapidarius* 石熊蜂
Bombus agrorum 田園熊蜂
Bombus terestris 陸熊蜂
Eucera malvae 長鬚蜂
Megachile maritime 切葉蜂
Vespa crabro 黃邊胡蜂
Vespa germana 德國胡蜂
Sphingonotus cyanopterus 束頸蝗
分 佈：江蘇；蒙古、西伯利亞、斯里蘭卡、阿富汗、土耳其、伊朗、摩洛哥、歐洲。

Pleurocerinella tibialis Chen 脛長角眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:608)

Pleurocerinella tibialis Chen, 1939:196.
寄 主：

分 佈：福建、內蒙古。

Sicus abdominalis Kröber 腹錫眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:616)

Sicus abdominalis Kröber, 1915:88.
Occemyia ogumae Matsumura, 1926:
Sicus benkoi Zimin, 1976:
寄 主：
分 佈：浙江、江蘇；蒙古、日本、俄羅斯、印度、歐洲。

Sicus ferregineus (Linnaeus) 銹錫眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:616)

Conops ferrugieus Linnaeus, 1761:468.
Conops cessans Hariis, 1776:
Myopa annulipes Robineau-Desvoidy, 1839:
寄 主：
分 佈：江蘇、新疆；古北區。

Sicus fesenensis Ouchi 赴戰錫眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:617)

Sicus fesenensis Ouchi, 1939:209.
寄 主：
分 佈：西藏；朝鮮(赴戰)、蒙古、俄羅斯、歐洲。

Siniconops cheni Qiao et Chao 陳氏唐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:609)

Siniconops cheni Qiao et Chao, 1996, 1:609.
寄 主：
分 佈：四川、浙江。

Siniconops elegans Chen 麗唐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:610)

Siniconops elegans Chen, 1939:198.
寄 主：*Bombus hortorum* 長頰熊蜂。
分 佈：安徽。

Siniconops fuscatus Qiao et Chao 暗黑唐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:610)

Siniconops fuscatus Qiao et Chao, 1996, 1:610.
寄 主：
分 佈：海南(尖峰嶺)。

Siniconops gradens Canras 巨唐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:610)

Siniconops gradens Canras, 1960:119.
寄 主：
分 佈：福建、四川、浙江。

Siniconops maculfrons (Kröber) 斑頜唐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:611)

Conops maculifrons Kröber, 1915:
寄 主：

分 佈：東北；蘇聯(阿穆爾)。

Siniconops splendens Camras 閃光唐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:611)

Siniconops splendens Camras, 1960:118.

寄 主：

分 佈：四川。

Thecophora abdominalis (Chen) 腹微蜂眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:617)

Occemyia abdominalis Chen, 1939:223.

寄 主：

分 佈：浙江、河北、內蒙古。

Thecophora atra (Fabricius) 黑尾微蜂眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:617)

Myopa atra Fabricius, 1775:799.
=*Conops bimculata* Preeyssler, 1775:
=*Myopa annulata* Fabricius, 1794:
=*Myopa cinerascens* Meigen, 1804:
=*Myopa maculata* Meigen, 1804:
=*Myopa micns* Meigen, 1804:
=*Myopa femorata* Fabricius, 1805:
=*Myopa nana* Robineau-Desvoidy, 1830:
=*Myopa bigoti* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa brunipes* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa dufouri* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa femoralis* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa fulvifrons* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa grisea* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa guerini* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa lamarcki* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa lucasi* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa nitidula* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa macquarti* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa meigeni* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Myopa pallipes* Robineau-Desvoidy, 1853:

寄 主：

分 佈：浙江、江蘇；印度、古北區。

Thecophora distincta (Wiedemann) 蛛微蜂眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:618)

Myopa distincta Wiedemann, 1824:149.

寄 主：

分 佈：中國北部；蒙古；俄羅斯遠東到歐洲部分、土耳其、伊朗、歐洲。

Thecophora obscuripes (Chen) 暗昏微蜂眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:618)

Occemyia obscuripes Chen, 1939:222.

寄 主：

分 佈：江蘇、陝西。

Thecophora pusilla (Meigen) 小微蜂眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:618)

Myopa pusilla Meigen, 1824:150.

寄 主：

分 佈：江蘇；北非、歐洲。

Thecophora qulvipes (Robineau-Desvoidy) 雅微蜂眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:618)

Myopa qulvipes Robineau-Desvoidy, 1830:246.

寄 主：

分 佈：江蘇、山西、遼寧；蒙古、俄羅斯、阿富汗、土耳其、伊朗、敘利亞、歐洲、北非。

Thecophora testaceipes (Chen) 殼微蜂眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:618)

Occemyia testaceipes Chen, 1939:221.

寄 主：

分 佈：江蘇。

Tropidomyia aureifacies Kröber 金面類叉芒眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:611)

Tropidomyia aureifacies Kröber, 1915:71.

寄 主：

分 佈：山西、北京。

Zodion cinereum (Fabricius) 灰佐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:619)

Myopa cinereum Fabricius, 1794:399.
=*Myopa tibiale* Fabricius, 1805:
=*Zodion conopsoides* Latreille, 1809:
=*Zodion notatum* Robineau-Desvoidy, 1809:
=*Zodion fulifinosum* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Zodion fulvicorne* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Zodion pedicillatum* Robineau-Desvoidy, 1853:
=*Zodion kerteszi* Szelády, 1926:
=*Zodion kreeoberi* Szelády, 1926:
=*Zodion rubescens* Szelády, 1926:

寄 主：*Halictus rubicundus* 紅足隧蜂。

分 佈：吉林；印度。

Zodion longirostre Chen 長吻佐眼蠅 (ASZI, 1987, 2:645; Qiao et Chao, 1996, 1:619)

Zodion longirostre Chen, 1939:204.

寄 主：

分 佈：浙江、江蘇。

Zodion nigricorna Chen 黑角佐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:619)

Zodion nigricorna Chen, 1939:204.

寄 主：

分 佈：天津。

Zodion pilosum Chen 毛佐眼蠅 (Qiao et Chao, 1996, 1:619)
寄 主：
分 佈：天津。

Zodion rufipes Chen 紅足佐眼蠅 (ASZI, 1987, 2:645; Qiao et Chao, 1996, 1:619)
寄 主：
分 佈：山西、河北、天津、遼寧。

Pipunculidae 頭蠅科

Cephalops argutus Hardy 敏銳光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:97)
Cephalops argutus Hardy, 1968:470.
寄 主：
分 佈：海南；菲律賓、馬來西亞、愛爾蘭。

Cephalops costalis Becker 脈光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:97)
Cephalops costalis Becker, 1924:16.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Cephalops crassipinus Yang et Xu 粗管光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:97)
Cephalops crassipinus Yang et Xu, 1996, 1:97-98.
寄 主：
分 佈：陝西、北京。

Cephalops excellen (Kertész) 倩光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:98)
Dorylas excellens Kertész, 1912:288.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Cephalops fraternus (Kertész) 益友光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:98)
Dorylas fraternus Kertész, 1912:289.
寄 主：
分 佈：臺灣；泰國、俾斯麥群島。

Cephalops gansuensis Yang et Xu 甘肅光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:98)
Cephalops gansuensis Yang et Xu, 1996, 1:98.
寄 主：
分 佈：甘肅。

Cephalops gracilenius Yan et Xu 細管光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:98)
Cephalops gracilenius Yan et Xu, 1996, 1:98.
寄 主：

分 佈：北京。

Cephalops haushanensis Yang et Xu 華山光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:98)

Cephalops haushanensis Yang et Xu, 1989:158.
寄 主：
分 佈：陝西。

Cephalops hirtifemurus Yang et Xu 毛腿光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:99)

Cephalops hirtifemurus Yang et Xu, 1996, 1:99.
寄 主：
分 佈：山西。

Cephalops longicaudus Yang et Xu 長尾光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:99)

Cephalops longicaudus Yang et Xu, 1996, 1:99.
寄 主：
分 佈：北京。

Cephalops longistigmatis Yang et Xu 長痣光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:99)

Cephalops longistigmatis Yang et Xu, 1996, 1:99-100.
寄 主：
分 佈：浙江。

Cephalops orbiculatus Yang et Xu 圓膜光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:100)

Cephalops orbiculatus Yang et Xu, 1996, 1:100.
寄 主：
分 佈：吉林(長白山)。

Cephalops palawanensis (Hardy) 巴拉光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:100)

Pipunculus palawanensis Hardy, 1972:26.
寄 主：
分 佈：寧夏；菲律賓。

Cephalops pulvillatus (Kertész) 巨墊光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:100)

Dorylas pulvillatus Kertész, 1915:387.
寄 主：
分 佈：臺灣、琉球群島、菲律賓、越南、泰國。

Cephalops shanghaiensis Ouchi 上海光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:100)

Cephalops shanghaiensis Ouchi, 1943:34.
寄 主：
分 佈：上海。

Cephalops shisanlingensis Yang et Xu 十三陵光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:100)

Cephalops shisanlingensis Yang et Xu, 1996, 1:100-101.

寄 主：
分 佈：北京。

Cephalops ssubaenus (Brunetti) 近緣光頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:101)
Pipunculus ssubaenus Brunetti, 1923:12.
寄 主：
分 佈：福建、海南、廣西；印度。

Chalarus beijingensis Yang et Xu 北京隱脈頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:93)
Chalarus beijingensis Yang et Xu, 1996, 1:93.
寄 主：
分 佈：北京。

Chalarus spurious (Fallén) 假隱脈頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:93)
Cephalops spurious Fallén, 1816:16.
寄 主：
分 佈：臺灣；瑞典、古北區、新北區、非洲區。

Chalarus zanganus Yang et Xu 藏隱脈頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:93)
Chalarus zanganus Yang et Xu, 1978, 2:177-180
寄 主：
分 佈：西藏。

Claraeola adventitia (Kertész) 加枝頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:101)
Doryles adventitia Kertész, 1912:292.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Dorylas roseri Beker 羅氏頭蠅 (Hun., 1992:1113)
寄 主：多種葉甲、飛蝨、沫蟬、蠟蟬、盲蝽等。
分 佈：湖南；歐洲中部。

Dorylomorpha lini Hardy 臺灣矛頭蠅 (He et al., 1991:62; Yang et Xu, 1996, 1:101)
Dorylomorpha lini Hardy, 1972:81.
別 名：*斜背頭蠅*。
寄 主：*Nephotettix* spp. 黑尾葉蟬。
分 佈：臺灣；菲律賓。

Dorylomorpha sinensis Xu et Yang 中國背頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:103; Xu et Yang, 1990:306)
Dorylomorpha sinensis Xu et Yang, 1990:306.
寄 主：
分 佈：內蒙古(集寧、化德)。

Eudorylas attenuatus Yang et Xu 劍管優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:104)

Eudorylas attenuatus Yang et Xu, 1989:158.

寄 主：

分 佈：陝西。

Eudorylas beiyui Yang et Xu 北岳優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:104)

Eudorylas beiyui Yang et Xu, 1996, 1:104-105.

寄 主：

分 佈：山西。

Eudorylas bicolor (Becker) 雙色優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:105)

Pipunculus bicolor Becker, 1924:15.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Eudorylas concavus Yang et Xu 凹腿優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:105)

Eudorylas concavus Yang et Xu, 1996, 1:105.

寄 主：

分 佈：甘肅。

Eudorylas digitatus Yang et Xu 指突優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:105)

Eudorylas digitatus Yang et Xu, 1996, 1:105.

寄 主：

分 佈：廣西。

Eudorylas gigas (Kertész) 巨型優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:105)

Dorylas gigas Kertész, 1912:293.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Eudorylas globosus Yang et Xu 球尾優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:105)

Eudorylas globosus Yang et Xu, 1996, 1:105-106.

寄 主：

分 佈：福建(三港)。

Eudorylas hardyi Yang et Xu 哈氏優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:106)

Eudorylas hardyi Yang et Xu, 1989:160.

寄 主：

分 佈：陝西、北京。

Eudorylas holoserriceus (Becker) 整列優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:106)

Pipunculus holoserriceus Becker, 1897:55.

寄 主：

分 佈：臺灣；菲律賓、歐洲。

Eudorylas javanensis (Meijere) 爪哇優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:106)

Pipunculus javanens Meijere, 1907:262.
=*Dorylas formosanus* Kertesz, 1912:
=*Pipunculus transverses* Brunetti, 1923:
=*Eudorylas tsuboii* Koizumi, 1959:
寄 主：黑尾葉蟬、褐飛蝨。
分 佈：福建、廣西；爪哇、日本。

Eudorylas lentiger (Kertész) 凸形優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:106)

Dorylas lentiger Kertész, 1915:386.
寄 主：
分 佈：臺灣；越南、泰國。

Eudorylas longicornis Yang et Xu 長角優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:106)

Eudorylas longicornis Yang et Xu, 1996, 1:106.
寄 主：
分 佈：南京(中山陵)。

Eudorylas longispinus Yang et Xu 刺腿優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:106)

Eudorylas longispinus Yang et Xu, 1996, 1:106-107.
寄 主：
分 佈：北京(天壇)。

Eudorylas macropygus (Meijere) 巨尾優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:107)

Pipunculus macropygus Meijere, 1914:167.
=*Eudorylas chalybeus* Prunetti, 1923:
寄 主：
分 佈：臺灣；菲律賓、越南、寮國、印度、爪哇。

Eudorylas megacephalus (Kertész) 巨頭優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:107)

Dorylas megacephalus Kertész, 1912:197.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Eudorylas meniscatus Yang et Xu 月管優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:107)

Eudorylas meniscatus Yang et Xu, 1996, 1:107.
寄 主：
分 佈：福建(建陽黃坑)。

Eudorylas minor (Coresson) 體小優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:107)

Pipunculus minor Coresson, 1911:293-294.
寄 主：
分 佈：陝西；美國。

Eudorylas mutilatus (Loew) 黃足優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:108)

Pipunculus mutillatus Loew, 1857:374.
=*Pipunculus aequalis* Becker, 1924:
=*Pipunculus mateema* Curran, 1936:
=*Pipunculus hiatus* Hardy, 1956:
=*Dorylas cruciator* Koizumi, 1959:
寄 主：*Nephottetix* spp. 黑尾葉蟬。
分 佈：臺灣、浙南、廣西、四川、山西；東洋區。

Eudorylas neimongolanus Xu et Yang 內蒙古優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:108)

Eudorylas neimongolanus Xu et Yang, 1990:305.
寄 主：
分 佈：內蒙古(集寧)。

Eudorylas ningxiaensis Yang et Xu 寧夏優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:108)

Eudorylas ningxiaensis Yang et Xu, 1996, 1:108.
寄 主：
分 佈：寧夏(賀蘭山)。

Eudorylas nudus (Kertész) 少毛優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:108)

Dorylas nudus Kertész, 1912:294.
寄 主：
分 佈：臺灣。

Eudorylas orientalis (Koizumi) 東方優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:108)

Dorylas orientalis Koizumi, 1959:43.
寄 主：*Nephottetix* spp. 黑尾葉蟬。
分 佈：臺灣、廣西；日本、俾斯麥群島，東洋區。

Eudorylas orthogoninus Yang et Xu 方抱優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:108)

Eudorylas orthogoninus Yang et Xu, 1989:159.
寄 主：
分 佈：陝西。

Eudorylas pallidiventris (Meijere) 白腹優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:108)

Pipunculus pallidiventris Meijere, 1914:169.
寄 主：
分 佈：臺灣；越南、泰國、爪哇。

Eudorylas piriformis Xu et Yang 梨狀優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:110)

Eudorylas piriformis Xu et Yang, 1990:305.
寄 主：
分 佈：內蒙古(集寧)。

Eudorylas platytarsis (Kertész) 闊跗優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:110)

Dorylas platytarsis Kertész, 1912:290.

寄 主：

分 佈：臺灣(臺南)。

Eudorylas revolutus Yang et Xu 翹角優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:110)

Eudorylas revolutus Yang et Xu, 1989:160.

寄 主：

分 佈：陝西。

Eudorylas roralis (Kertész) 羅拉優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:110)

Dorylas roralis Kertész, 1915:389.

寄 主：

分 佈：臺灣；東洋區。

Eudorylas sauteri Kertész 薩氏優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:110)

Eudorylas sauteri Kertész, 1907:580.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Eudorylas separatus (Kertész) 分離優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:110)

Dorylas separatus Kertész, 1915:390.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Eudorylas yunnanensis Yang et Xu 雲南優頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:110)

Eudorylas yunnanensis Yang et Xu, 1996, 1:110.

寄 主：

分 佈：雲南(昆明花紅洞)。

Jassidophaga abscissa Thomson 裂恕頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:94)

Jassidophaga abscissa Thomson, 1869:514.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Jassidophaga armata Thomson 甲恕頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:94)

Jassidophaga armata Thomson, 1869:513.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Jassidophaga guangsiensis Yang et Xu 縊尾恕頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:94)

Jassidophaga guangsiensis Yang et Xu, 1996, 1:94.

寄 主：

分 佈：廣西。

Jassidophaga pilosa (Zetterstedt) 濃毛刼頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:95)

Pipunculus pilosa Zetterstedt, 1840:579.
=*Pipunculus ruralis* Walker, 1834:
=*Pipunculus fascitus* Von Roser, 1840
=*Pipunculus modestus* Schiner, 1860:
寄 主：
分 佈：內蒙古；歐洲、北美洲。

Jassidophaga triloba Yang et Xu 三葉刼頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:95)

Jassidophaga triloba Yang et Xu, 1989:157.
寄 主：
分 佈：陝西。

Pipunculus (Eudorylas) attenuatus Yang et Xu 劍管優頭蠅 (Yang et Xu, 1989:158)

Pipunculus (*Eudorylas*) *attenuatus* Yang et Xu, 1989:158.
寄 主：
分 佈：陝西(樓觀臺)。

Pipunculus (Eudorylas) hardyi Yang et Xu 哈氏優頭蠅 (Yang et Xu, 1989:160)

Pipunculus (*Eudorylas*) *hardyi* Yang et Xu, 1989:160.
寄 主：
分 佈：陝西、北京。

Pipunculus (Cephalops) huashanensis Yang et Xu 華山光頭蠅 (Yang et Xu, 1989:158)

Pipunculus (*Cephalops*) *huashanensis* Yang et Xu, 1989:158.
寄 主：
分 佈：陝西(華山)。

Pipunculus (Eudorylas) javanensis de Meijere 爪哇頭蠅 (He et al., 1991:62; Lin, 1970:191; 1974:110)

Pipunculus javanensis de Meijere, 1907:262.
=*Pipunculus formosanus* Kertesz, 1912:298.
=*Pipunculus transversus* Brunetti, 1923:13.
=*Dorylas* (*Eudorylas*) *tsuboii* Koizuma, 1959:40
=*Pipunculus* (*Eudorylas*) *javanensis*, Hardy, 1968；451.
寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬
Nephotettix spp. 黑尾葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛虱。
分 佈：臺灣、廣西；日本、菲律賓、爪哇、泰國、印度。

Pipunculus (Eudorylas) mutillatus Loew 黃足頭蠅 (He et al., 1991:62; Lin, 1970:191; 1974:109)

Pipunculus mutillatus Loew, 1857:374.
=*Pipunculus aequalis* Becker, 1924:16.
=*Pipunculus matema* Curran, 1936:22.

=*Pipunculus* (*Eudorylas*) *hiatus* Hardy, 1956:5.
=*Dorilas* (*Eudorylas*) *cruciator* (Perkins), Koizumi, 1959:41.
=*Pipunculus* (*Eudorylas*) *distocruciator* Hardy, 1966:441.
=*Pipunculus* (*Eudorylas*) *mutillatus,* Hardy, 1971:88.
寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬
Nephotettix spp. 黑尾葉蟬。
分 佈：臺灣、湖南、廣西、四川；日本、菲律賓、沙巴、泰國、印度、南非。

Pipunculus (Eudorylas) neimongolanus Xu et Yang 內蒙優頭蠅 (Xu et Yang, 1990:305)
Pipunculus (*Eudorylas*) *neimongolanus* Xu et Yang, 1990:305.
寄 主：
分 佈：內蒙古(錫林郭勒盟太仆寺旗)。

Pipunculus (Eudorylas) orientalis (Koizumi) 東方頭蠅 (He et al., 1991:63; Lin, 1970:191; 1974:111)
Dorilas (*Eudorylas*) *orientalis* Koizumi, 1959:43.
Pipunculus (*Eudorylas*) *orientalis,* Hardy, 1968:459.
寄 主：僞黑尾葉蟬 *Nephotettix cincticeps* (Uhler)。
分 佈：臺灣、安徽；日本、菲律賓、越南、泰國、緬甸、印度等東亞地區。

Pipunculus (Eudorylas) orthogoninus Yang et Xu 方抱優頭蠅 (Yang et Xu, 1989:159)
Pipunculus (*Eudorylas*) *orthogoninus* Yang et Xu, 1989:159.
寄 主：
分 佈：陝西、河北。

Pipunculus (Eudorylas) piriformis Xu et Yang 梨狀優頭蠅 (Xu et Yang, 1990:305)
Pipunculus (*Eudorylas*) *piriformis* Xu et Yang, 1990:305.
寄 主：
分 佈：內蒙古(集寧)。

Pipunculus (Eudorylas) revolutus Yang et Xu 翹角優頭蠅 (Yang et Xu, 1989:160)
Pipunculus (*Eudorylas*) *revolutus* Yang et Xu, 1989:160.
寄 主：
分 佈：陝西。

Pipunculus (Eudorylas) roralis (Kertesz) 露頭頭蠅 (He et al., 1991:63; Lin, 1970:191; 1974:112)
Dorilas roralis Kertesz, 1915:389.
Pipunculus (*Eudorylas*) *roralis*, Hardy, 1968:461.
寄 主：僞黑尾葉蟬 *Nephotettix cincticeps* (Uhler)。
分 佈：臺灣、廣西；菲律賓、越南、寮國、泰國等東南亞地區。

Tomosveryella concavifronta Yang et Xu 凹額佗頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:113)
Tomosveryella concavifronta Yang et Xu, 1996, 1:113.
寄 主：
分 佈：浙江、河北、北京。

Tomosvaryella dongyue Yang et Xu 東岳佗頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:111)

Tomosvaryella dongyue Yang et Xu, 1996, 1:111-112.

寄 主：

分 佈：山東(泰山)。

Tomosvaryella epichalca (Perkins) 靚佗頭蠅 (He et al., 1991:63; Lin, 1974:104)

Pipunculus epichalcus Perkins, 1905:150.

Tomosvaryella epichalca, Hardy, 1972:71.

寄 主：僞黑尾葉蟬 *Nephotettix cincticeps* (Uhler)。

分 佈：臺灣；菲律賓、中南半島、澳洲。

Tomosveryella forter Yang et Xu 壯管佗頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:112)

Tomosveryella forter Yang et Xu, 1996, 1:112.

寄 主：

分 佈：湖南。

Tomosveryella inazumae (Koizumi) 電光葉蟬頭蠅 (He et al., 1991:63)

寄 主：*Inazuma dorsalis* (Motschulsky) 電光葉蟬。

分 佈：廣西、雲南、河南。

Tomosvaryella oryzaetora Koizumi 稻佗頭蠅 (ASZI, et al., 1978:228; He et al., 1979:43-46; He et al., 1991:63; Hunan, Shi-men, 1980(3):60; Lin, 1974: 103; Song, 1984:83; Sun et al., 1980(4):22; Wu et Yang, 1987:49; Yang et Xu, 1996, 1:112; Zhang, 1987[ed.] 2:68)

Tomosvaryella oryzaetora Koizumi, 1959:38.

別 名：*黑尾葉蟬頭蠅*。

寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛虱。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、黑龍江；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度。

Tomosveryella pernitida (Becker) 光亮佗頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:112)

Pipunculus pernitida Becker, 1924:14.

寄 主：

分 佈：臺灣。

Tomosveryella scalprata Yang et Xu 刀幣佗頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:112)

Tomosveryella scalprata Yang et Xu, 1987, 2:178.

寄 主：

分 佈：西藏(拉薩)。

Tomosveryella shaoshanensis Yang et Xu 韶山佗頭蠅 (Yang et Xu, 1996, 1:112)

Tomosveryella shaoshanensis Yang et Xu, 1996, 1:112.

寄 主：

分 佈：湖南(韶山)。

Tomosveryella spiculata Hardy 小穗佗頭蠅 (He et al., 1991:63)

Tomosveryella spiculata Hardy, 1972:85.
別 名：*針足頭蠅*。
寄 主：*Nephotettis* spp. 黑尾葉蟬
分 佈：臺灣；菲律賓。

Tomosvaryella subvirescens (Loew) 淡綠佗頭蠅 (He et al., 1991:63; Lin, 1974:104)

Pipunculus subvirescens Loew, 1872:87.
=*Pipunculus aridis* Williston, 1893:255.
=*Pipunculus pilosiventris* Becker, 1900:233.
=*Pipunculus glabrum* Adams, 1905:165.
=*Pipunculus albiseta* Cresson, 1911:318.
=*Pipunculus insularis* Cresson, 1911:317-8.
=*Pipunculus metallescens* Malloch, 1913:298.
=*Pipunculus similans* Becker, 1924:15.
=*Pipunculus knowltoni* Hardy, 1939:20-22.
Tomosvaryella subvirescens, Hardy, 1971:86-7.
別 名：*帶綠頭蠅*。
寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬
Nephotettix virescens (Distant) 黑尾葉蟬
Nilaparvata lugens (Stål) 褐飛蝨。
分 佈：臺灣、福建、廣西；全世界。

Tomosvaryella sylvatica (Meigen) 林棲頭蠅 (He et al., 1991:63; Lin, 1974:109; Yang et Xu, 1996, 1:113)

Pipunculus sylvatica Meigen, 1824:20.
Tomosvaryella sylvatica, Hardy, 1943:180-1.
寄 主：*Nephotettix cincticeps* (Uhler) 僞黑尾葉蟬 。
Psamotettix striatus (Linnaeus) 條沙葉蟬(蘇聯)
分 佈：臺灣、廣西、河南；東洋區、北非、舊北區、北美。

Verrallia (Jassidophaga) pilosa (Zetterstedt) 濃毛頭蠅 (Xu et Yang, 1990:306)

Pipunculus pilosa Zetterstedt, 1940:579.
寄 主：
分 佈：內蒙古；歐洲、北美。

Verrallia (Jassidophaga) trilaba Yang et Xu 三葉蟹頭蠅 (Yang et Xu, 1989:157)

Verrallia (*Jassidophaga*) *triloba* Yang et Xu, 1989:157.
寄 主：
分 佈：陝西(南五臺)。

Syrphidae 食蚜蠅科

(Xie et Sterling, 1987, 14(3):154; Xue et al., 1996, 1:118-223; Yan et Mei, 1996, 22(5):24-25)

Allobaccha amphithoe (Walker) 雙線異巴食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:120)

Baccha amphithoe Walker, 1849:549.
=*Baccha pedicellata* Doleschall, 1856:
=*Baccha bicincta* de Meijere, 1910:
=*Baccha flavopunctata* Brunetti, 1913:
=*Baccha fulvicostaliis* Matsumura, 1916:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、廣東、廣西；東洋區。

Allobaccha apicalis (Loew) 紫額異巴食蚜蠅 (Cheng et Huang, 1997:1482; Hun., 1992:1140; Li et al., 1990:106; Yang et Xu, 1996, 1:120; Yunn., 1987:1184)

Baccha apicalis Loew, 1858:106.
=*Baccha pulchrifrons* Austen, 1893:
=*Baccha apicenotata* Brunetti, 1915:
別 名：*紫額棍腹食蚜蠅*，*端斑食蚜蠅*。
捕 食：蚜蟲、蚧蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、吉林；蘇聯、日本、菲律賓、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、印尼。

Allobaccha nubilipennis (Austen) 褐翅異巴食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:120)

Baccha nubilipennis Austen, 1893:136.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、雲南；日本、東洋區。

Allograpta javana (Wiedemann) 爪哇異食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:134)

Syrpphus javana Wiedemann, 1824:34.
=*Melithreptus distinctus* Kertesz, 1899:
捕 食 性。
分 佈：中國；鮮鮮、日本、蒙古、蘇聯，東洋區、澳洲區。

Asarkina aegrota (Fabricius) 斑翅狹口食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:627; He et al., 1991:116; Li et al., 1990:104; Yunn., 1987:1182; Zhang, 1987[ed.] 2:67)

別 名：*扁腹食蚜蠅*。
捕 食：柑橘上的蚜蟲
(稻田)。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、雲南、浙江、山西；印尼、印度。

Asarkina ericetorum (Fabricius) 切黑狹口食蚜蠅 (Sun, 1992:1098; Xue et al., 1996, 1:135)

Syrphus ericetorum Fabricius, 1781:425.
=*Syrphus salviae* Fabricius, 1781:
=*Syrphus incisuralis* Macquart, 1855:
=*Asarcina typical* Bezzi, 1908:
=*Asarkina salviae* de Meijere, 1908:
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南、四川、浙江、河北；東洋區、澳洲區、非洲區。

Asarkina orientalis Bezzi 東方狹口食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:135)

Asarkina orientalis Bezzi, 1908:498. (as *ericetorum* var.)
捕 食 性。
分 佈：中國各地；東洋區。

Asarkina porcina (Coquillett) 黃腹狹口食蚜蠅 (Cheng et Huang, 1995:525; 1997:1480; Hun., 1992:1135; Sun et Huang, 1992:596; Xue et al., 1996, 1:135; Yunn., 1987:1182)

Syrphus porcina Coquillett, 1898:322.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、山西、甘肅；日本、蘇聯、印度、斯里蘭卡，東洋區。

Asarkina porcina (Coquillett) 黃腹狹口食蚜蠅 (Cheng et Huang, 1995:525; Sun, 1988:481)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、雲南、西藏(墨脫)、浙江、江蘇、山西、甘肅；日本、印度、斯里蘭卡。

Asiodidea nikkoensis (Matsumura) 黃角深環食蚜蠅 (Sun, 1992:1098; Xue et al., 1996, 1:135)

Brachyopa nikkoensis Matsumura, 1916:234.
Asiodidea potanini Stackelberg, 1930:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、甘肅；日本、千島群島、蘇聯。

Baccha amphithoe Walker 雙線食蚜蠅 (Li et al., 1990:105)

捕 食 性。
分 佈：廣東、廣西。

Baccha apicolis Loew 紫額巴食蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:597)

捕 食 性。
分 佈：臺灣、湖南、雲南、四川、浙江；日本、菲律賓、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、印尼。

Baccha elongata (Fabricius) 短額巴食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:121)

Syrphus elongata fabriciuis, 1775:768.
=*Musca perezxilis* Harris, 1780:
=*Baccha abbreviata* Meigen, 1822:
=*Baccha nigripennis* Meigen, 1822:
=*Baccha scutellata* Meigen, 1822:
=*Baccha sphegina* Meigen, 1822:
=*Baccha tabida* Meigen, 1822:
=*Baccha vitripennis* Meigen, 1822:
=*Baccha klugii* Meigen, 1830:
=*Baccha nigricornis* Schummel, 1843:
捕 食 性。

分 佈：甘肅；蘇聯、歐洲、新北區。

Baccha maculata Walker 細腰巴食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:627; Chen et al., 1993:127; Cheng et Huang, 1995:525; 1997:1482; He et al., 1991:116; Hun., 1992:1139; Sun et Huang, 1992:597; Xue et al., 1996, 1:121; Yunn., 1987:1184; Zhang, 1987[ed.] 2:67)

Baccha maculata Walker, 1852:223.

別 名：*纖腰巴食蚜蠅*。

捕 食：稻田蚜蟲

蚜蟲

蚧蟲。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、雲南、西藏、四川、浙江、湖北、陝西；朝鮮、日本、菲律賓、馬來西亞、印度、尼泊爾、印尼、加里曼丹。

Baccha nubilipennis Austen 褐翅巴食蚜蠅 (Hun., 1992:1140; Yunn., 1987:1183)

捕 食 性。

分 佈：臺灣、湖南、雲南；日本、印度、尼泊爾、斯里蘭卡。

Baccha pulchrifrons Austen 紫額巴食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:628; ASZI et al., 1978:225; Su et al., 1986:37)

捕 食：*Aphis gossypi* Glover 棉蚜

蚜蟲

Formosaphis micheliae Takahashi 白蘭臺灣蚧(白蘭)。

分 佈：廣東、雲南、四川、浙江；日本、馬來西亞、印尼、印度、斯里蘭卡。

Betasyrphus serarius (Weidemann) 狹帶貝蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:635; Cheng et Huang, 1995:525; 1997:1480; Dai, 1993, 15(3):68-72; Dai, 1995, 11(4):184; Hun., 1992:1135; Ma et al., 1985:155; Shi et al., 1989-90:81; Sun, 1988:481; 1992:1102; Sun et Huang, 1992:596; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:136; Yin, 1979, (2):5; You, 1982, (2):7-19; Zhang, 1987[ed.] 2:68)

Syrphus serarius Weidemann, 1830:128.

捕 食：*Aphis* sp. 菊蚜

Myzaphis rosarum 玫瑰冠蚜

Myzus persicae 桃蚜

Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜

Toxoptera aurantii 茶蚜(橘二叉蚜)

洋槐蚜

鱗翅目(幼蟲)

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、貴州、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河北、甘肅、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、日本、蘇聯、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、東洋區、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲、歐洲。

Cheilosia sp. 黑食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92)

捕 食 性。

分 佈：甘肅(河西走廊南部)。

Chrysotoxum amurense Violovitsh 阿穆爾長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:122)

Chrysotoxum amurense Violovitsh, 1973:926.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古；蘇聯。

Chrysotoxum baphyras Walker 棕腹長角食蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:598; Xue et al., 1996, 1:122)
Chrysotoxum baphyras Walker, 1849:542.
=*Chrysotoxum indicum* Walker, 1852:
=*Chrysotoxum sexfasciatum* Brunetti, 1907:
=*Chrysotoxum citronellum* Brunetti, 1908:
=*Chrysotoxum mundulum* Herve-Bazin, 1923:
捕 食 性。
分 佈：湖南、西藏；寮國、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、印尼。

Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus) 二帶長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:122)
Musca bicinctum Linnaeus, 1758:592.
=*Musca callosum* Harris, 1776:
=*Chryssotoxum xricinctum* Rondeni, 1845:
捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古、歐洲、北非。

Chrysotoxum caeleste Shannon 黑角長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:123)
Chryssotoxum caeleste Shannon, 1926:16.
捕 食 性。
分 佈：四川(康定)。

Chrysotoxum cautum (Harris) 黃頦長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:123)
Musca cautum Harris, 1776:60.
=*Chrysotoxum sylvarum* Wiedemann, 1882:
=*Chrysotoxum scutellatum* Macquart, 1829:
=*Chrysotoxum impudicum* Loew, 1856:
=*Chrysotoxum lubricum* Giglio-Tos, 1890:
捕 食 性。
分 佈：甘肅；歐洲。

Chrysotoxum chinense Shannon 中華長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:123)
Chrysotoxum chinense Shannon, 1926:13.
捕 食 性。
分 佈：四川(康定)。

Chrysotoxum convexum Brunetti 弧緣長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:123)
Chrysotoxum convexum Brunetti, 1915:249.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；印度。

Chrysotoxum coreanum Shiraki 突額長角食蚜蠅 (Sun, 1992:1107; Sun et Huang, 1992:598; Xue et al., 1996, 1:123)

Chrysotoxum coreanum Shiraki, 1930:32.:
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川；朝鮮、蘇聯、印度。

Chrysotoxum draco Shannon 猛長角食蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:598; Xue et al., 1996, 1:123)
Chrysotoxum draco Shannon, 1926:15.
捕 食 性。
分 佈：湖南、四川。

Chrysotoxum elegans Loew 麗紋角食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:123)
=*Chrysotoxum bipunctatum* Müller, 1776:
=*Musca imbelle* Harris, 1776:
=*Musca geographicum* Geoffroy, 1785:
=*Chrysotoxum annulatum* Loew, 1840:
=*Chrysotoxum infuscatum* Loew, 1840:
=*Chrysotoxum scutellare* Loew, 1840:
Chrysotoxum elegans Loew, 1841:140.
=*Chrysotoxum tomentosum* Giglio-Tos, 1890:
=*Chrysotoxum bigoti* Giglio-Tos, 1890:
=*Chrysotoxum japonicum* Matsumura, 1916:
=*Chrysotoxum latilimbatum* Collin, 1940:
捕 食 性。
分 佈：河北、新疆；蒙古、日本、印度、歐洲。

Chrysotoxum fratellum Shannon 黃足角食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:123)
Chrysotoxum fratellum Shannon, 1926:15.
捕 食 性。
分 佈：四川；蒙古、蘇聯。

Chrysotoxum grande Matsumura 大長角食蚜蠅 (Sun, 1992:1108; Xue et al., 1996, 1:123)
Chrysotoxum grande Matsumura, 1911:72.
捕 食 性。
分 佈：雲南；朝鮮、日本、西伯利亞。

Chrysotoxum kirghizorum Peck 吉爾吉斯長角食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum kirghizorum Peck, 1974:913.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蘇聯。

Chrysotoxum kozhevnikovi Smirnov 大斑長角食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum kozhevnikovi Smirnov, 1925:290.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蘇聯。

Chrysotoxum kozlovi Violovitsh 克孜長角食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum kozlovi Violovitsh, 1973:101.

捕 食 性。
分 佈：中國(阿拉山脈)。

Chrysotoxum ladakense Shannon 寬斑長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum ladakense Shannon, 1926:13.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蘇聯、印度。

Chrysotoxum lanulosum Violovitsh 短毛長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum lanulosum Violovitsh, 1873:928.
捕 食 性。
分 佈：甘肅、蘇聯。

Chrysotoxum mongol Shannon 離邊長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum mongol Shannon, 11926:15.
捕 食 性。
分 佈：四川(松潘)。

Chrysotoxum nigricentivum Li et He 黑刺長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum nigricentivum Li et He, 1992:69.
捕 食 性。
分 佈：新疆(芳草湖)。

Chrysotoxum nigrifacies Shannon 黑顏長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum nigrifacies Shannon, 1926:13.
捕 食 性。
分 佈：四川(松潘)。

Chrysotoxum octomaculatum Curtis 八斑長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837:653.
=*Musca elegans* Villers, 1789:
=*Chrysotoxum chrysopolitum* Rondani, 1845:
捕 食 性。
分 佈：甘肅；歐洲。

Chrysotoxum sibiricum Loew 西伯利亞長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum sibiricum Loew, 1856:611.
捕 食 性。
分 佈：甘肅、新疆；朝鮮、蒙古、蘇聯。

Chrysotoxum stackelbergi Violovitsh 寬條長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124)
Chrysotoxum stackelbergi Violovitsh, 1953:358.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蘇聯。

Chrysotoxum tartar Shannon 達邊長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:124),
Chrysotoxum tartar Shannon, 1926:14.
捕 食 性。
分 佈：四川(康定)。

Chrysotoxum tjanshanicum Peck 梯長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:125)
Chrysotoxum tjanshanicum Peck, 1974:912.
捕 食 性。
分 佈：新疆；蘇聯。

Chrysotoxum tuberculatum Shannon 刺突長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:125)
Chrysotoxum tuberculatum Shannon, 1926:14.
捕 食 性。
分 佈：四川。

Chrysotoxum vernale Loew 土斑長角蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:125)
Chrysotoxum vernale Loew, 1841:138.
=*Chrysotoxum collinum* Rondani, 1857:
=*Chrysotoxum flavipenne* Palma, 1863:
=*Chrysotoxum fuscum* Giglio-Tos, 1890:
=*Chrysotoxum vernaloides* Giglio-Tos, 1890:
捕 食 性。
分 佈：新疆、黑龍江；伊朗、歐洲。

Citrogramma citrinum (Brenetti) 柑橘裸眼食蚜蠅 (Sun, 1992:1106; Xue et al., 1996, 1:136)
Xanthogramma citrinum Brenetti, 1923:95.
捕 食 性。
分 佈：福建、雲南、四川；馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡。

Dasysyrphus albostriatus (Fallén) 白紋毛食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:137)
Scaeva albostriatus Fallén, 1817:42.
=*Lasiophthicus coronatus* Rondani, 1857:
=*Syrphus confuses* Egger, 1860:
=*Syrphus carinthiacus* Latzel, 1876:
捕 食 性。
分 佈：四川、甘肅；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

Dasysyrphus bilineatus (Matsumura) 雙線毛食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:137)
Syrphus bilineatus Matsumura, 1917:38.
=*Catabomba excavatus* Matsumura, 1918:
捕 食 性。
分 佈：臺灣；朝鮮、日本、蘇聯。

Dasysyrphus eggeri (Schiner) 四灰條毛食蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:180; Xue et al., 1996, 1:137)

Syrphus eggeri Schiner, 1862:303.
=*Syrphus grisescens* Suster et Zilberman, 1958:
捕 食 性。
分 佈：新疆；蒙古、蘇聯、歐洲。

Dasysyrphus licinus He 曲毛食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:137)
Dasysyrphus licinus He, 1991:303.
捕 食 性。
分 佈：甘肅。

Dasysyrphus lituiformis He 喇形毛食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:137)
Dasysyrphus lituiformis He, 1991:305.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Dasysyrphus lunulatus (Meigen) 月斑食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:634; Sun, 1992:1102; Sun et Zhang, 1982:198; Xue et al., 1996, 1:137)
Syrphus lunulatus Meigen, 1822:299.
別 名：*新月食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏、四川；日本、蒙古、蘇聯、歐洲中部及北部、新北區。

Dasysyrphus postclaviger (Stys et Moucha) 角紋毛食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:137)
Syrphus postclaviger Stys et Moucha, 1962:60.
=*Syrphus claviger* Frey, 1930:
捕 食 性。
分 佈：甘肅(河西走廊南部)；蘇聯、歐洲。

Dasysyrphus tricinctus (Fallén) 三帶毛食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:138)
Scaeva tricinctus Fallén, 1817:41.
Conosyrphus okunii Matsumura, 1918:
捕 食 性。
分 佈：內蒙古；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

Dasysyrphus venustus (Meigen) 暗突毛食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:138)
=*Scaeva arcuatus* Fallén, 1817:
Syrphus venustus Meigen, 1822:299.
=*Syrphus implicagtus* Meigen, 1822:
=*Scaeva solitarius* Zetterstedt, 1838:
=*Syrphus berberidis* Loew, 1840:
=*Syrphus cupreus* Am Stein, 1860:
=*Syrphus bipunctatus* Girschner, 1884:
=*Syrphus atricornis* Szilady, 1940:
Dasysyrphus venustus (Meigen):
捕 食 性。
分 佈：西藏；蒙古、蘇聯、歐洲、新北區。

Dasysyrphus yangi He et Chu 楊氏毛食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:138)
Dasysyrphus yangi He et Chu, 1992:89.
捕 食 性。
分 佈：江蘇。

Didea alneti (Fallén) 淺環邊食蚜蠅 (Sun, 1992:1099; Xue et al., 1996, 1:138)
Sceava alneti Fallén, 1817:38.
=*Syrphus pellucidula* Wiedemann, 1882:
=*Didea japonica* Matsumura, 1917:
=*Didea sachalinensis* Matsumura, 1917:
捕 食：蚜蟲
分 佈：雲南、四川；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、歐洲、新北區。

Didea fasciata Macquart 巨斑邊食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:628; ASZI et al., 1978:225; Dai, 1995, 11(4):184; He et al., 1991:116; Sun, 1992:1099; Xue et al., 1996, 1:140)
Didea fasciata Macquart, 1834:509.
=*Enica foersteri* Meigen, 1838:
捕 食：稻田蚜蟲、茶園蚜蟲
分 佈：臺灣、福建、貴州、四川、江蘇、湖北、陝西；日本、蘇聯、東洋區、印度、歐洲南部、中部、美洲北部。

Didea intermadia Loew 暗棒邊食蚜蠅 (Sun, 1992:1099; Xue et al., 1996, 1:140)
Didea intermadia Loew, 1854:18.
捕 食：蚜蟲
分 佈：雲南、四川；蘇聯、歐洲中部。

Dideoides kempi Brunetti 狹帶直脈食蚜蠅 (Sun, 1992:1100; Xue et al., 1996, 1:140)
Dideoides kempi Brunetti, 1923:59.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；印度。

Dideoides latus (Coquillett) 側斑直脈食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:628; Cheng et Huang, 1995:525; Hun., 1992:1136; Sun et Huang, 1992:596; Xue et al., 1996, 1:140)
Syrphus latus Coquillett, 1898:322.
別 名：*黃腹寬食蚜蠅*。
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣西、浙江；日本、東洋區。

Dideoides ovatus Brunetti 卵腹直脈食蚜蠅 (Hun., 1992:1136; Sun, 1992:1100; Xue et al., 1996, 1:140)
Dideoides ovatus Brunetti, 1908:54.
捕 食 性。
分 佈：湖南、雲南、四川；寮國、印度。

Dideopsis aegrotus (Fabricius) 斑翅狹口食蚜蠅 (Hun., 1992:1136; Sun et Huang, 1992:596; Xue et al., 1996, 1:141)

Eristalis aegrotus Fabricius, 1805:243.
=*Syrphus fascipennis* Macquart, 1834:
=*Didea ellenriederi* Doleschall, 1857:
=*Syrphus infirmus* Rondani, 1875:
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、雲南、浙江；東南亞、印度、尼泊爾、印尼、巴布亞新幾內亞、澳洲。

Doros conopseus (Fabricius) 棕翅囊食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:141)

Syrphus conopseus Fabricius, 1775:768.
Doros conopeus Zeller, 1842:
=*Musca profuges* Harris, 1780:
=*Syrphus coarctatus* Panzer, 1797:
=*Doros bipunctatuus* Mik, 1885:
=*Doros destillatorius* Mik, 1885:
=*Bacchiopsis vespiformis* Matsumura, 1916:
捕 食 性。
分 佈：山西、河北；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

Epistrophe annulitarsis (Stackelberg) 環跗垂邊蚜蠅 (Sun, 1992:1100; Xue et al., 1996, 1:143)

Syrphus annulitarsis Stackelberg, 1918:2155.:
捕 食：蚜蟲。
分 佈：雲南、四川；蘇聯北部。

Epistrophe balteata (De Geer) 黑帶垂邊食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:629; ASZI et al., 1978:225; Chen et Wang, 1987:306; Chiu et Lo, 1985:4; Dai, 1995, 11(4):184; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; He et al., 1991:116; Huang et Gao, 1996:241; Li, 1981(1-2):84; Li et al.,:105; Lu et al., 1986:63; Shi et al., 1989-90:81; Sun et Zhang, 1982:197; Tao et al., 1968:26; Wang et al., 1991:79-81; Wang et al., 1996, 12(2):92; Wu, 1987:183; Yunn., 1987:1180; Zhang, 1987[ed.] 2:67; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)

別 名：*黑帶食蚜蠅，黑點食蚜虻*。
捕 食：稻田蚜蟲
Aphis gossypii Glover 棉蚜
Myzur persicae (Sulzer) 桃蚜
花生蚜
Aphis craccivora Koch 豆蚜
Bravicoryne brassicae 菜蚜
Hyadaphis erysimi pseudobrassicae (Davis) 菜縊管蚜
Lipaphis erysimi 蘿蔔蚜
Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜
梨二叉蚜
苜蓿蚜
茶蚜
Toxoptera citricidus 大橘蚜
薊馬。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏(察隅、樟木)、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅(河西走廊南部)、遼寧、吉林、黑龍江；日本、印度、北非、歐洲、澳洲。

Epistrophe cretensis Becker 雙斑食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:629; Sun et Zhang, 1982:198; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:143)
Syrphus creteensis Becker, 1921:52.
別 名：*裂帶食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：西藏(樟木)、甘肅(河西走廊南部)；布臘、歐洲。

Epistrophe fallacius Matsumura 黃紋食蚜蠅 (He et al., 1991:116; Zhang, 1987[ed.] 2:67)
捕 食：稻田蚜蟲、蚜蟲。
分 佈：臺灣、江西、湖南。

Epistrophe griseocinctus (Brunetti) 灰帶垂邊食蚜蠅 (Sun, 1992:1100)
Epistrophe griseocinctus (Brunetti, 1923:)
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；印度。

Epistrophe griseofasciata Matsumura 灰帶垂邊食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:143)
Epistrophe griseofasciata Matsumura, 1918:15.
=*Syrphus angustifaasciata* Violovitsh, 1956:
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；日本、蘇聯。

Epistrophe grossulariae (Meigen) 離緣垂邊食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:143)
Syrphus grossulariae Meigen, 1822:306.
=*Musca formosa* Harris, 1780:
捕 食 性。
分 佈：內蒙古；日本、蒙古、蘇聯、歐洲、新北區。

Epistrophe nigroepistomata Shiraki et Edashige 條顏垂邊食蚜蠅 (Sun, 1992:1101; Zue et al., 1996, 1:143)
Epistrophe nigroepistomata Shiraki et Edashige, 1953:99.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；日本。

Epistrophe ochrostoma (Zetterstedt) 淡顏垂邊蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:180)
Epistrophe ochrostoma (Zetterstedt, 1849:)
捕 食 性。
分 佈：新疆；歐洲大部分、新北區。

Epistrophe trifasciata He 三帶垂邊蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:143)
Epistrophe trifasciata He, 1987:186.

捕 食 性。
分 佈：西藏。

Episyrphus alternans (Macquart) 黃毛黑帶蚜蠅 (Chen, 1996, 18(1):21)
捕 食 性。
分 佈：廣東。

Episyrphus balteatus (De Geer) 黑帶食蚜蠅 (Cheng et Huang, 1995:526; 1997:1481; Gao, 1991:95; Hun., 1992:1136; Kuang et al., 1989:51-56; Lin et Liu, 1993, 15(1):18-21; Ma et al., 1985:155; Sun, 1988:481; 1992:1101; Sun et Huang, 1992:596; Xue et al., 1996, 1:143)
Musca balteatus De Geer, 1776:116.
=*Musca scitule* Harris, 1780:
=*Musca scitulus* Harris, 1780:
=*Musca alterrnatus* Schrank, 1781:
=*Syrpphus nectareus* Fabricius, 1787:
=*Syrphus pleuralis* Thomson, 1869:
=*Syrphus andalusiacus* Strobl, 1899:
=*Episyrphus fallaciosus* Matsumura, 1917:
=*Syrphus proximus* Santos Abreu, 1924:
=*Syrphus signatus* Santos Abreu, 1924:
捕 食：*Eriosoma lanigerum* 蘋果綿蚜
Aphis gossypii Glover 棉蚜(大豆)
各種蚜蟲。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、甘肅、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯、阿富汗、東洋區、印度、澳洲、博寧群島、北非、古北區、歐洲。

Episyrphus nectarines (Wiedemann) 麗黑帶食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:144)
Syrphus nectarines Wiedemann, 1830:128.
寄 主：
分 佈：福建；朝鮮、日本、東洋區、澳洲。

Eriozona nigroscutellata Shiraki 暗盾密毛食蚜蠅 (Sun, 1992:1104; Xue et al., 1996, 1:144)
Eriozona nigroscutellata Shiraki, 1930:333.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、西藏、四川。

Eristalis arbustorum (Linnaeus) 短腹管蚜蠅 (Sun et Huang, 11996:182)
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758:)
捕 食 性。
分 佈：河北、甘肅、新疆；東洋區、阿富汗、伊朗、摩洛哥、阿爾及利亞、新北區

Eristalis campestris Meigen 鼠尾管食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92)
捕 食 性。
分 佈：甘肅(河西走廊南部)。

Eristalis cerealis Fabricius 禾穀食蚜蠅 (Cheng et Huang, 11995:526; He et al., 1991:116; Sun et Huang, 1992:599; Sun et Zhang, 1982:200)

Eristalis cerealis Fabricius, 1805:

別 名：*灰被羽毛食蚜蠅，灰帶管蚜蠅*。

捕 食：稻田蚜蟲。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、西藏(波密、錯那、樟木)、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、甘肅、新疆；蘇聯、朝鮮、日本、庫頁島、緬甸、印度、印尼。

Eristalis nemorum (Linnaeus) 褐腿管蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:182)

Eristalis nemorum (Linnaeus, 1758:)

捕 食 性。

分 佈：新疆；蒙古、歐洲、新北區。

Eristalis ocularius Coqil 斑眼食蚜蠅 (He et al., 1991:116)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：廣西。

Eristalis olugens Wiedemann 黑食蚜蠅 (He et al., 1991:116)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：廣西。

Eristalis quinquelineatus Fabricius 五條食蚜蠅 (He et al., 1991:117)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：廣西。

Eristalis quinguestristus Fabricius 五紋食蚜蠅 (He et al., 1991:117)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：臺灣、廣西。

Eristalis tenax (Linnaeus) 長尾管蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:182)

Eristalis tenax (Linnaeus, 1758:)

捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、西藏、四川、浙江、江蘇、湖北、河北、甘肅、新疆；亞洲、北非、歐洲。

Eumerus aurifrons Wiedemann 耳額食蚜蠅 (He et al., 1991:117)

捕 食：稻田昆蟲。

分 佈：廣西。

Eumerus figurans Walker 履形食蚜蠅 (He et al., 1991:117)

捕 食：稻田昆蟲。
分 佈：廣西。

Eupeodes (s. str.) **aurosus** He 金優食蚜蠅 (He, 1993:87)
Eupeodes (s. str.) *aurosus* He, 1993:87-88.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江(尙志縣帽兒山)。

Eupeodes (s. str.) **cheni** He 陳氏優食蚜蠅 (He, 1993:90)
Eupeodes (s. str.) *cheni* He, 1993:90-91.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江(寧安縣)。

Eupeodes (s. str.) **silvaticus** He 林優食蚜蠅 (He, 1993:89)
Eupeodes (s. str.) *silvaticus* He, 1993:89-90.
捕 食 性。
分 佈：黑龍江(寧安縣) 。

Ferdinandea cuprea (Scop.) 銅鬃胸食蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:598)
捕 食 性。
分 佈：湖南、貴州、四川；日本西利亞、歐洲。

Graptomyza brevirostris Weidemann 短喙缺僞食蚜蠅 (Yunn., 1987:1185)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南；印尼、緬甸、印度。

Graptomyza nigripes Brunetti 黑斑缺僞食蚜蠅 (Yunn., 1987:1185)
捕 食 性。
分 佈：廣西、雲南；印度、錫金。

Hammerschmidtia tropia Chu 脊顔錘食蚜蠅 (Chu, 1994:494)
Hammerschmidtia tropia Chu, 1994:494.
捕 食 性。
分 佈：江蘇(南京)。

Ischiodon aegyptinus (Wiedemann) 埃及刺腿食蚜蠅 (Hun., 1992:1137; Sun et Huang, 1992:596; Xue et al., 1996, 1:144)
Syrphus aegyptius Wiedemann, 1830:133.
=*Sphaeerophoria annulipes* Macquart, 1842:
=*Syrphus felix* Walker, 1852:
=*Syrphus brchypterus* Thomson, 1869:
捕 食 性。
分 佈：湖南、湖北；埃及、加那利島、敘利亞，非洲區。

Ischiodon scutellaris (Fabricius) 短翅刺腿食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:630; ASZI et al., 1978:225; Dai, 1995, 11(4):184; He et al., 1991:117; Huang et Gao, 1996:241; Hun., 1992:1137; Li et al., 1990:106; Shi, 1981:269-271; Sun et Huang, 11992:596; Tao et al., 1968:27; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1,:146; Yunn., 1987:1180; Zhang, 1987[ed.] 2:67)

Scaeva scutellaris Fabricius, 1805:252.
Ischiodon trochantericus Sack, 1913:
=*Melithreptus ogasawareensis* Matsumura, 1916:
=*Ischiodon boninensis* Matsumura, 1916:
別 名：*刺腿食蚜虻*。
捕 食：稻田蚜蟲
棉蚜
橘蚜
茶蚜
菜蚜
豆蚜
豆角蚜
花生蚜
玉米蚜
苜蓿蚜。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、上海、陝西、山東、河北、北京、甘肅(河西走廊南部)、新疆；日本、越南、印度、北非。

Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus) 黃盾壯食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:630; ASZI et al., 1978:226; He et al., 1991:117; Xue et al., 1996, 1:146)

Musca glaucius Linnaeus, 1758:593.
=*Syrphus nobilis* Meigen, 1822:
=*Syrphus leucozonus* Germar, 1825:
=*Chamaesyrphus miyakei* Matsumura, 1911:
=*Ischyrosyrphus strandi* Duda, 1940:
=*Ischyrosyrphus vernalis* Suster, 1959:
捕 食：稻田蚜蟲。
分 佈：福建、吉林；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

Ischyrosyrphus laternarius (Müller) 黑盾壯食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:631; ASZI et al., 1978:226; Gao, 1991:95; He et al., 1991:117; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:146)

Musca laternarius Müller, 1776:174.
=*Scaeva mutates* Zetterstedt, 1849:
=*Karasyrphus sachalinensis* Matsumura, 1918:
捕 食：稻田蚜蟲、大豆蚜。
分 佈：福建、雲南、四川、甘肅(河西走廊南部)、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯、歐洲、美洲北部。

Lasiopticus pyrastri (Linnaeus) 斜斑鼓額食蚜蠅 (ASZI et al., 1978:226; Fan et Zheng, 1990:105-107; Sun et Zhang, 1982:196; Zhang, 1987[ed.] 2:68; Zhang, 1998, 14(2):47; Zong et al., 1986:119)

捕 食：*Aphis gossypii* 棉蚜
Aphis pomi 蘋果蚜

Hyalopterus pruni 桃粉大尾蚜
蚜蟲。
分 佈：江西、雲南、西藏、四川、江蘇、上海、湖北、山東、河北、北京、東北；亞洲西部、北部、歐洲、北非、美洲。

Lasiopticus selenitica (Meigen) 月斑鼓額食蚜蠅 (ASZI et al., 1978:226; Wang et al., 1991:79-81; Zhang, 1987[ed.] 2:68)
捕 食：松蚜
(麥田)。
分 佈：江西、廣西、雲南、浙江、江蘇、上海、河北、北京、內蒙古、黑龍江；印度、亞洲東部、北部、歐洲、北非。

Leucozona lucorum (Linnaeus) 黑毛白腰食蚜蠅 (Sun, 1992:1104; Xue et al., 1996, 1:147)
Musca lucorum Linnaeus, 1758:592.
=*Conops praecincta* Scopoli, 1763:
=*Musca pellucens* Harris, 1780:
=*Syrphus asiliformis* Fabricius, 1781:
=*Leucozona nigripila* Mik, 1888:
=*Leucozona deferens* Frey, 1946.
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、甘肅；日本、蒙古、西伯利亞、歐洲、新北區。

Megaspis errans Fabricius 大蚜蠅 (He et al., 1991:117; Zhang, 1987[ed.] 2:68)
別 名：*大橫狀食蚜蠅*。
捕 食：蚜蟲
(稻田)。
分 佈：江西、廣西。

Megaspis zonatus (Fabricius) 腰帶大蚜蠅 (Zhang, 1987[ed.] 2:68)
捕 食 性。
分 佈：江西。

Megasyrphus alashanicus Peck 賀蘭大食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:147)
Megasyrphus alashanicus Peck, 1974:910.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古(賀蘭山)。

Megasyrphus chinensis He 中華大食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:147)
Megasyrphus chinensis He, 1988, 2:195.
捕 食 性。
分 佈：西藏。

Melangyna cincta (Fallén) 窄額食蚜蠅 (Sun, 1992:1101; Xue et al., 1996, 1:148)
Scaeva cincta Fallén, 1817:45.

Syrphus placida Meigen, 1822:
別 名：*窄顏美藍食蚜蠅* 。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；蘇聯、歐洲。

Melangyna guttata (Fallén) 斑盾美藍食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:148)
Scaeva guttata Fallén, 1817:44.
=*Syrphus flavifrons* Verrall, 1873:
=*Syrphus savtshenkoi* Violovitsh, 1965:
=*Melangyna sajanica* Violovitsh, 1975:
捕 食 性。
分 佈：甘肅；蘇聯、歐洲、新北區。

Melangyna hwangi He et Li 黃氏美藍食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:148)
Melangyna hwangi He et Li, 1992:86.
捕 食 性。
分 佈：新疆。

Melangyna labiatarum (Verrall) 黃頰食蚜蠅 (Sun, 1992:1101; Xue et al., 1996, 1:148)
Syrphus labiatarum Verrall, 1901:415.
別 名：*黃頰美藍食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川；歐洲中部。

Melangyna lasiophthalma (Zattersteder) 暗頰食蚜蠅 (Sun, 1992:1102; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:148)
Scaeva lasiophthalma Zattersteder, 1843:735.
=*Syrphus sexguttata* Meigen, 1835:
=*Stenosyrphus saghallinensis* Matsumura et Adachi, 1917:
=*Stenosyrphus nikkoensis* Matsumura, 1918:
別 名：*暗頰美藍食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、甘肅(河西走廊南部)、內蒙古；日本、蒙古、蘇聯、歐洲中部及北部。

Melanostoma mellinum (Linnaeus) 斜斑黑食蚜蠅 (Cheng et Huang, 1995:526; He et al., 1991:117; Song, 1984:83; Sun, 1992:1107; Sun et Huang, 1996:182; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:126)
Musca mellinum Linnaeus, 1758:594.
=*Musca facultas* Harris, 1780:
=*Syrphus mellarium* Meigen, 1822:
=*Syrphus melliturgum* Meigen, 1822:
=*Syrphus minutum* Macquart, 1829:
=*Syrphus unicolor* Macquart, 1829:
=*Syrphus laevigatum* Meigen, 1838:
=*Syrphus concolor* Walker, 1851:
=*Melanostoma nigricorne* Strobl, 1893:
=*Melanostoma inornatum* Matsumura, 1919:

=*Melanostoma interrptum* Matsumura, 1919:
=*Melanostoma ochiaianum* Matsumura, 1919:
=*Melanostoma ogasawarae* Matsumura, 1919:
=*Melanostoma sachalineense* Matsumura, 1919:
=*Melanostoma angustatoides* Kanervo, 1934:
=*Melanostoma melanatum* Kanervo, 1934:
=*Melanostoma obscuripes* Kanervo, 1934:
=*Melanostoma deficiens* Szilady, 1940:
=*Melanostoma dilatatum* Szilady, 1940:
別 名：*細艷食蚜蠅，方斑黑顏食蚜蠅，方斑墨蚜蠅*。
捕 食：稻田蚜蟲。
分 佈：福建、湖南、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北、河北、甘肅(河西走廊南部)、新疆；蒙古、日本、阿富汗、伊朗、亞洲、歐洲、北非、美洲，古北區、東洋區、新北區。

Melanostoma orientalis (Wiedemann) 東洋黑顏蚜蠅 (Cheng et Huang, 1995:526; 1997:1483; Sun, 1988:484; Tao et al., 1968:28; Xue et al., 1996, 1:126)
Syrphus orientalis Wiedemann, 1824:
別 名：*東方食蚜虻*。
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、西藏(墨脫)、四川、浙江、湖北；蘇聯、日本、東洋區。

Melanostoma scalare (Fabricius) 梯斑黑蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:632; ASZI et al., 1978:227; Cheng et Huang, 1995:526; 1997:1483; He et al., 1991:117; Li et al., 1990:106; Ma et al., 1985:155; Peng et Zong, 1989, 16(2):93-97; Sun, 1988:484; 1992:1107; Sun et Zhang, 1982:196; Wang et al., 1991:79-81; Wang et al., 1996, 12(2):92; Wu, 1987:183; Xue et al., 1996, 1:126; Zhang, 1987[ed.] 2:68; Zong et al., 1984:249; Zong et al., 1986:119)
Syrphus scalare Fabricius, 1794:308.
=*Syrphus gracile* Meigen, 1822:
=*Syrphus maculosum* Meigen, 1822:
捕 食：稻田蚜蟲、麥田
Aphis gossypii Glover 棉蚜
蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏(波密)、四川、浙江、湖北、陝西、山東、河北、北京、甘肅(河西走廊南部)；蒙古、蘇聯、日本、阿富汗、新幾內亞、東洋區、亞洲、歐洲、美洲，古北區、非洲區。

Melanostoma univittatum (Wiedemann) 橙腹黑食蚜蠅 (ASZI,1987, 2:632; Tao et al., 1968:28; Sun, 1992:1107; Xue et al., 1996, 1:126; Yunn., 1987:1179)
Syrphus univittatum Wiedemann, 1824:36.
=*Syrphus cyathifer* Walker, 1857:
=*Syrphus planifacies* Macquart, 1848:
捕 食 性。
分 佈：廣東、雲南、四川；日本、新加坡、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、東南亞、印尼、澳洲。

Melesia ammochrysus Sequy. 羊角蘋蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:600)

捕 食 性。
分 佈：湖南；越南。

Meliscaeva cinctella (Zetterstedt) 狹腹食蚜蠅 (ASZI, 1987, Cheng et Huang, 1995:526; 2:629; 1997:1481; Sun, 1988:482; 1992:1101; Xue et al., 1996, 1:149)
Scaeva cinctella Zetterstedt, 1843:526.
=*Syrphus unifasciata* Strobl, 1909:
別 名：*黃帶狹腹食蚜蠅，寬顏食蚜蠅*。
捕 食：棉蚜。
分 佈：臺灣、福建、廣西、雲南、西藏(墨脫、波密、芝林)、四川、湖北、陝西、甘肅；日本、蒙古、蘇聯、歐洲、東洋區、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、東洋區、古北區、新北區。

Meliscaeva monticola (de Meijere) 高山食蚜蠅 (Sun, 1992:1101; Xue et al., 1996, 1:149)
Syrphus monticola de Meijere, 1914:159.
捕 食 性。
分 佈：臺灣、雲南、四川；斯里蘭卡、印尼，東洋區。

Mesembrius flavipes Matsumura 寬帶粉顏食蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:599)
捕 食 性。
分 佈：貴州；朝鮮、日本、蘇聯。

Mesembrius peregrinus (Loew) 異粉顏蚜蠅 (Cheng et Huang, 1997:1488)
Mesembrius peregrinus (Loew, 1846:)
捕 食 性。
分 佈：四川、中國北方；蘇聯、歐洲。

Mesembrius tuberosus Curr. 瘤股粉顏食蚜蠅 (Sun et Huang, 1992:599)
捕 食 性。
分 佈：福建、貴州。

Metasyrphus confrater (Wiedemann) 寬帶食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:633; Hun., 1992:1137; Li et al., 1990:107; Su et al., 1986:37; Sun, 1992:1102; Sun et Huang, 1992:597; 1996:181; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:150)
Syrphus confrater Wiedemann, 1830:120.
別 名：*大食蚜虻，臺灣食蚜蠅*。
捕 食：*Aphis bambusae* Fullaway 竹紅蚜(竹)
甘蔗綿蚜
桃蚜
麥蚜
蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、山西、甘肅(河西走廊南部)、新疆；日本、東洋區、馬來西亞、印度、印尼、巴布亞新幾內亞。

Metasyrphus corollae (Fabricius) 大灰食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:634; Chen et al., 1993:126; Cheng et Huang, 1997:1482; Dai, 1992:42; Dai, 1995, 11(4):184; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; 1997, 19(4):146-151; Dong et Xiong, 1988, 4(4):155-158; Du et Chen, 1993, 9(3):111-113; Gao, 1990:90; Gao, 1991:95; He et al., 1991:117; Hun., 1992:1137; Liang et al., 1997, 24(3):193-198; Luo, 1982, (5):21-23; Ma et al., 1985:155; Shi et al., 1989-90:81; Sun, 1992:1102; Sun et Huang, 1992:597; 1996:180; Tao et al., 1968:29; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xiong et Dong, 1992:9-12; Xue et al., 1996, 1:150; Yang et al., 1989:116-121; Yang et al., 1990, 16(4):14-15; Zhang, 1987[ed.] 2:68; Zhang, 1998, 14(2):47)

Syrphus corellae Fabricius, 1794:306.

別 名：*條背食蚜虻*。

捕 食：稻田蚜蟲

Aphis craccivora Koch 豆蚜

Aphis glycines Matsumura 大豆蚜

Aphis gossypii Glover 棉蚜

Macrosiphum avenae (Fabricius) 麥長管蚜

Megoura japonica (M.) 豌豆修尾蚜

Myzur persicae (Sulzer) 桃蚜

Sinomegoura citricola (van der Goot) 樟修尾蚜

棉長管蚜

茶蚜

各種果樹、林木上的蚜蟲

葉蟬

薊馬

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、亞洲北部和東部、東洋區、馬來西亞、印度東部、伊朗、古北區、小亞細亞、北非、歐洲。

Metasyrphus flaviceps (Rondani) 黃斑後食蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:180; Xue et al., 1996, 1:150)

Syrphus flaviceps Rondani, 1857:133.

=*Syrphus braueri* Egger, 1858:

捕 食 性。

分 佈：西藏、新疆；高加索、波蘭、捷克、意大利、奧地利。

Metasyrphus flavofasciatus He 黃帶後食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:150)

Metasyrphus flavofasciatus He, 1987:189.

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Metasyrphus latifasciatus (Macquart) 寬條後食蚜蠅 (Sun, 1992:1103; Sun et Huang, 1996:180; Xue et al., 1996, 1:151)

Syrphus latifasciatus Macquart, 1829:242.

=*Syrphus affinis* Loew, 1840:

=*Scaeva abbreviattus* Zetterstedt, 1849:

=*Syrphus affinis* Palma, 1863:

=*Syrphus submaculatus* Frey, 1918:

捕 食 性。

分 佈：福建、雲南、西藏、四川、甘肅；東洋區、印度、阿富汗、蒙古、敘利亞、歐洲、新北區。

Metasyrphus latimacula (Peck) 半斑月斑後食蚜蠅 (Sun et Huang, 1996:181; Xue et al., 1996, 1:151)

Syrphus latimacula Peck, 1969:203.

捕 食 性。

分 佈：青海、新疆；蒙古、吉爾吉斯坦。

Metasyrphus luniger (Meigen) 月斑食蚜蠅 (Sun, 1992:1103; Sun et Huang, 1996:181; Xue et al., 1996, 1:151)

Syrphus luniger Meigen, 1822:300.

=*Syrphus nigrifemoratus* Macquart, 1829:

=*Syrphus bucculatus* Rondani, 1857:

=*Syrphus maricolor* Enderlein, 1938:

=*Syrphus azureus* Szilady, 1940:

=*Syrphus transcendens* Szilady, 1940:

捕 食 性。

分 佈：雲南、四川、甘肅、新疆；蒙古、日本、東洋區、印度、阿富汗、蘇聯、加拿利群島、北非、歐洲、新北區。

Metasyrphus motems Zetterstedt 凹帶食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:634; He et al., 1991:117; Li, 1981(1-2):84; Yunn., 1987:1183; Zhang, 1987[ed.] 2:68)

=*Syrphus nitens* (Zetterstedt)

捕 食：稻田蚜蟲

鱗翅目(幼蟲)

分 佈：江西、湖南、雲南、浙江、河南、陝西、河北、北京、甘肅、吉林；日本、歐洲。

Metasyrphus nitens (Zetterstedt) 凹帶食蚜蠅 (Ma et al., 1985:155; Sun, 1988:482; 1992:1103; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:151)

Scaeva nitens Zetterstedt, 1843:712.

=*Syrphus bisinuatus* Palma, 1863:

=*Metasyrphus frequens* Matsumura, 1917:

=*Syrphus abbreviatus* Kanervo, 1934:

=*Syrphus errans* Kanervo, 1934:

捕 食 性。

分 佈：福建、江西、雲南、西藏(墨脫)、四川、浙江、江蘇、河北、甘肅、吉林；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、阿富汗、歐洲、。

Metasyrphus sinuatus He 波後食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:151)

Metasyrphus sinuatus He, 1987:191.

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Metasyrphus taeniatus He 條後食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:151)

捕 食 性。

分 佈：西藏。

Paragus albifrons (Fallén) 白額小食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:130)

Pipiza albifrons Fallén, 1817:60.

=*Paragus lacerus* Loew, 1840:

=*Paragus lavendulae* Rondani, 1865:

=*Paragus macularis* Szilády, 1940:

捕 食 性。

分 佈：甘肅(河西走廊南部)；蒙古、蘇聯、阿富汗、伊朗、歐洲。

Paragus compeditus Weidemann 矩舌小蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:130)

Paragus compeditus Weidemann, 1830:89.

=*Paragus aegyptius* Macquart, 1850:

=*Paragus nitidissimus* Costa, 1878:

=*Paragus luteus* Brunetti, 1908:

捕 食 性。

分 佈：甘肅；阿富汗、伊朗、非洲北部、埃及。

Paragus crenulatus Thomson 鋸盾小食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:632; ASZI et al., 1978:227; Li et al.,:107; Xue et al., 1996, 1:130; Yunn., 1987:1178)

Paragus crenulatus Thomson, 1869:503.

捕 食：蚜蟲。

分 佈：廣東、廣西、雲南、四川；馬來西亞、印尼、東洋區，澳洲區。

Paragus gulangensis Li et Li 古浪小食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:130)

Paragus gulangensis Li et Li, 1990:15.

捕 食 性。

分 佈：甘肅(河西走廊南部)。

Paragus haemorrhous Meigen 擬刻點小蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:131)

Paragus haemorrhous Meigen, 1822:182.

=*Paragus sigillatus* Curtis, 1836:

=*Paragus trianguliferus* Zetterstedt, 1838:

=*Paragus pallipes* Matsumura, 1916:

=*Paragus coreanus* Shiraki, 1930:

捕 食 性。

分 佈：甘肅；朝鮮、日本、蒙古、蘇聯、阿富汗、北非、歐洲。

Paragus politus Wiedemann 灰色小蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:131)

Paragus politus Wiedemann, 1830:89.

捕 食 性。

分 佈：中國；菲律賓、日本。

Paragus quadrifasciatus Meigen 四條小食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:632; ASZI et al., 1978:227; Dai, 1995, 11(4):184; Dai et Zu, 1997, 19(2):49-54; Gao, 1990:90; Gao et al., 1993, 9(3):142; He et al., 1991:118; Ma et al., 1985:155; Shi, 1981:271; Wang et al., 1991:79-81; Xue et al., 1996, 1:131; Zhang, 1987[ed.] 2:68)

Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822:181.
=*Syrph concinnus* Wiedemann, 1822:
=*Syrph albifrons* Wiedemann, 1822:
=*Paragus bifasciatus* Macquart, 1834:
=*Paragus pulcherrimus* Strobl, 1893:
=*Paragus variofasciatus* Becker, 1907:
=*Paragus nohirae* Matsumura, 1916:

捕 食：稻田蚜蟲、麥田
Aphis glycines Matsumura 大豆蚜(大豆)
Aphis gossypii Glover 棉蚜(棉、大豆)
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) 蘿蔔蚜(大豆)
Melanaphis sacchari (Zehntner) 高梁蚜(大豆)
Rhopalosiphum maidis (Fitch) 玉米縊管蚜(大豆)
Rhopalosiphum padi Linnaeus 禾谷縊管蚜(大豆)
苜蓿蚜
茶蚜

分 佈：江西、廣東、廣西、貴州、雲南、湖北、河南、陝西、山東、河北、吉林；朝鮮、日本、蘇聯、阿富汗、伊朗、北非、歐洲中、南部。

Paragus serratus Fabricius 短刺食蚜蠅 (Tao et al., 1968:30; Xue et al., 1996, 1:131)

Mulio serratus Fabricius, 1805:186.

別 名：*絲小蚜蠅*。
捕 食：蚜蟲。
分 佈：臺灣、福建；印度、阿富汗。

Paragus tibialis (Fallén) 刻點小食蚜蠅 (ASZI, 1987, 2:633; ASZI et al., 1978:227; Cheng et Huang, 1997:1484; He et al., 1991:118; Hun., 1992:1142; Li et al., 1990:107; Ma et al., 1985:155; Shi, 1981:272; Sun et Huang, 1992:598; Xue et al., 1996, 1:131; Yunn., 1987:1179; Zong et al., 1986:119)

Pipiza tibialis Fallén, 1817:60.
=*Paragus aeneus* Meigen, 1822:
=*Paragus femoratus* Meigen, 1822:
=*Paragus obscurus* Meigen, 1822:
=*Paragus zonatus* Meigen, 1822:
=*Ascia analis* Macquart, 1839:
=*Paragus nigritus* Gimmerthal, 1842:
=*Paragus dispar* Schummel, 1843:
=*Paragus numida* Macquart, 1849:
=*Orthonevra varipes* Bigot, 1880:
=*Paragus ogasawarae* Matsumura, 1916:
=*Paragus mongolicus*Kanervo, 1938:

別 名：*刺背食蚜虻*。
捕 食：稻田蚜蟲
Aphis gossypii Glover 棉蚜(棉田)

豆蚜
竹蚜。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、湖北、陝西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古、吉林；蒙古、蘇聯、朝鮮、日本、東洋區、印度、斯里蘭卡、阿富汗、伊朗、亞洲北部、歐洲、北美、非洲中北部。

Parasyrphus annulatus (Zetterstedt) 環帶擬食蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:152)
Scaeva annulatus Zetterstedt, 1838:604.
=*Syrphus sinuatus* Palma, 1863:
=*Syrphus zetterstedti* Veerhoeff, 1819:
捕 食 性。
分 佈：新疆；日本、蒙古、蘇聯、歐洲。

Parasyrphus kirgizorum (Pack) 黑角食蚜蠅 (Sun, 1992:1103; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:152)
Syrphus kirgizorum Pack, 1969:201.
別 名：*黑角擬食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、甘肅(河西走廊南部)；蘇聯(基爾吉茲)。

Parasyrphus haemorrhous (Meigen) 擬刻點小食蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92)
捕 食 性。
分 佈：甘肅(河西走廊南部)。

Phalacrodira tarsata (Zetterstedt) 毛眼舌腹食蚜蠅 (Sun, 1992:1101; Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:152)
Scaeva tarsata Zetterstedt, 1838:601.
=*Syrphus distinctus* Kanervo, 1934:
=*Syrphus immaculatus* Kanervo, 1934:
=*Syrphus scutellatus* Kanervo, 1934:
別 名：*黑跗食蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、四川、甘肅(河西走廊南部)；蒙古、西伯利亞、歐洲、美洲北部。

Phytomia errans (Fabricius) 裸芒皺額蚜蠅 (Chen, 1996, 18(1):21; Cheng et Huang, 1997:1488; Sun et Huang, 1992:599)
Phytomia errans (Fabricius, 1787:)
捕 食 性。
分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇；日本、東南亞。

Phytomia zonata (Fabricius) 羽芒寬盾蚜蠅 (Cheng et Huang, 1997:1489; Sun et Huang, 1992:600)
Phytomia zonata (Fabricius, 1787:)
捕 食 性。

分 佈：福建、湖南、廣東、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、山東、河北、甘肅、遼寧；蘇聯、朝鮮、日本、印度、錫金。

Platycheirus albimanus (Fabricius) 迴毛扁足蚜蠅 (Cheng et Huang, 1997:1484; Sun, 1988:484; 1992:1107; Xue et al., 1996, 1:127)

Syrphus albimanus Fabricius, 1781:434.
=*Syrphus cyaneus* Walker, 1851:
=*Platycheirus pulchellus* Palma, 1863:
=*Platychirus femoratus* Kanervo, 1934:
別 名：*黑腹寬跗蚜蠅*。
捕 食 性。
分 佈：雲南、西藏(墨脫、波密)、四川、湖北、甘肅；蒙古、蘇聯、菲律賓、印度、尼泊爾，全北區。

Platycheirus ambiguus (Fallén) 卷毛寬跗蚜蠅 (Wang et al., 1996, 12(2):92; Xue et al., 1996, 1:127)

Scaeva ambiguus Fallén, 1817:47.
=*Syrphus monochaetus* Loew, 1871:
捕 食 性。
分 佈：甘肅(河西走廊南部)；日本、蒙古、阿富汗、東洋區、歐洲、新北區。

Platycheirus angustatus (Zetterstedt) 狹腹寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:127)

Scaeva angustatus Zetterstedt, 1843:762.
=*Platychirus major* Szilady, 1940:
捕 食 性。
分 佈：甘肅；日本、蒙古、蘇聯、歐洲、新北區。

Platycheirus clypeatus (Meigen) 短斑寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:127)

Syrphus clypeatus Meigen, 1822:335.
=*Syrphus dilatatus* Macquart, 1834:
捕 食 性。
分 佈：甘肅；日本、蒙古、蘇聯、阿富汗、歐洲、新北區。

Platycheirus fulviventris (Macquart) 黃腹寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Syrphus fulviventris Macquart, 1828:229.
=*Syrphus ferrugineus* Macquart, 1829:
=*Syrphus winthemi* Meigen, 1830:
捕 食 性。
分 佈：甘肅；蒙古、蘇聯、歐洲。

Platycheirus immarginatus (Zetterstedt) 無緣寬跗蚜蠅 (Xue et al., 1996, 1:128)

Scaeva immarginatus Zetterstedt, 1849:319.
捕 食 性。
分 佈：內蒙古；蘇聯、歐洲、新北區。